

津島市民病院採用医薬品集

2026.7

電子カルテオーダー	医薬品情報WEB検索システム	採用医薬品集	採用登録の種類
医薬品名称記号	表示記号	採用区分	
なし	採用	採用	本採用: 常時在庫医薬品(院外・院内ともに使用できる医薬品)
#	採用	採用	本採用: 必要時購入医薬品(原則として院内に在庫のない薬品。院内使用時には在庫の確認が必要です。)
△	なし	記載なし	採用中止医薬品(院内の在庫が無くなり次第、採用中止の医薬品。院外処方での使用はできません。)
「院外」	院外	院外	院外専用医薬品(院内では、使用できない医薬品です。)
※	限定 (文書作成登録分のみ)	限定 (文書作成登録分のみ)	患者限定緊急購入医薬品(本採用ではなく、特別な理由で使用している医薬品。院内に在庫のない場合があります。)
「院外」△	院外	院外	採用中止医薬品(院内の在庫が無くなり次第、院外専用医薬品となります。院内での使用はできません)
「院外」※	外+限 (文書作成登録分のみ)	外+限 (文書作成登録分のみ)	院外専用医薬品(院内処方箋では、処方できない薬品です。院内では患者限定緊急購入医薬品(採用薬品ではなく、特別な理由で使用している薬品。院内に在庫のない場合があります。))
「院外※」	院外限定 (文書作成登録分のみ)	院外限定 (文書作成登録分のみ)	院外のみで使用する患者限定緊急購入医薬品 (特別な理由で使用している医薬品。院内では処方できません。)

(文書作成登録分のみ)とは下記の患者限定購入医薬品の②③にあたります

患者限定緊急購入薬品

- ①一人限定…できるだけ使い切り、使用終了後電カルから削除します。
- ②年に数人使用…電子カルテの「文書作成」→「緊急薬品購入願」に各科ごとにフォルダを作ります。
医師の申し出により文書作成に医薬品名などを記入した緊急薬品購入願を登録します。
文書作成時には、医師、患者ID、患者名などが自動入力されます。申請理由の記載は必要です。
あらかじめ見積もりを取り、必要時速やかに薬剤室に納品されるように準備します。
毎年、年度末に使用量などを考慮し、採用・継続・削除を薬事委員会で審議していきます。
- ③使用頻度はまれな薬剤であるが、マスターに常に登録が必要な薬剤…
②と同様に登録します。

薬効目次

薬効	薬効分類名(2桁)	薬効分類名(3桁)
111	中枢神経系用薬	全身麻酔剤
112	中枢神経系用薬	催眠鎮静剤, 抗不安剤
113	中枢神経系用薬	抗てんかん剤
114	中枢神経系用薬	解熱鎮痛消炎剤
115	中枢神経系用薬	興奮剤, 覚せい剤
116	中枢神経系用薬	抗パーキンソン剤
117	中枢神経系用薬	精神神経用剤
118	中枢神経系用薬	総合感冒剤
119	中枢神経系用薬	その他の中枢神経系用薬
121	末梢神経系用薬	局所麻酔剤
122	末梢神経系用薬	骨格筋弛緩剤
123	末梢神経系用薬	自律神経剤
124	末梢神経系用薬	鎮けい剤
125	末梢神経系用薬	発汗剤, 止汗剤
129	末梢神経系用薬	その他の末梢神経系用薬
131	感覚器官用薬	眼科用剤
132	感覚器官用薬	耳鼻科用剤
133	感覚器官用薬	鎮暈剤
139	感覚器官用薬	その他の感覚器官用薬
190	その他の神経系及び感覚器官用医薬品	その他の神経系及び感覚器官用医薬品
211	循環器官用薬	強心剤
212	循環器官用薬	不整脈用剤
213	循環器官用薬	利尿剤
214	循環器官用薬	血圧降下剤
215	循環器官用薬	血管補強剤
216	循環器官用薬	血管収縮剤
217	循環器官用薬	血管拡張剤
218	循環器官用薬	高脂血症用剤
219	循環器官用薬	その他の循環器官用薬
221	呼吸器官用薬	呼吸促進剤
222	呼吸器官用薬	鎮咳剤
223	呼吸器官用薬	去たん剤
224	呼吸器官用薬	鎮咳去たん剤
225	呼吸器官用薬	気管支拡張剤
226	呼吸器官用薬	含嗽剤
229	呼吸器官用薬	その他の呼吸器官用薬
231	消化器官用薬	止しゃ剤, 整腸剤
232	消化器官用薬	消化性潰瘍用剤
233	消化器官用薬	健胃消化剤
234	消化器官用薬	制酸剤
235	消化器官用薬	下剤, 浣腸剤
236	消化器官用薬	利胆剤
237	消化器官用薬	複合胃腸剤
239	消化器官用薬	その他の消化器官用薬
241	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	脳下垂体ホルモン剤
242	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	唾液腺ホルモン剤
243	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤
244	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	たん白同化ステロイド剤
245	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	副腎ホルモン剤
246	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	男性ホルモン剤
247	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤

薬効目次

薬効	薬効分類名(2桁)	薬効分類名(3桁)
248	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	混合ホルモン剤
249	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
251	泌尿生殖器官及び肛門用薬	泌尿器官用剤
252	泌尿生殖器官及び肛門用薬	生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)
253	泌尿生殖器官及び肛門用薬	子宮収縮剤
254	泌尿生殖器官及び肛門用薬	避妊剤
255	泌尿生殖器官及び肛門用薬	痔疾用剤
259	泌尿生殖器官及び肛門用薬	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
261	外皮用薬	外皮用殺菌消毒剤
262	外皮用薬	創傷保護剤
263	外皮用薬	化膿性疾患用剤
264	外皮用薬	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
265	外皮用薬	寄生性皮膚疾患用剤
266	外皮用薬	皮ふ軟化剤(腐しよく剤を含む。)
267	外皮用薬	毛髪用剤(発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤)
268	外皮用薬	浴剤
269	外皮用薬	その他の外皮用薬
271	歯科口腔用薬	歯科用局所麻酔剤
272	歯科口腔用薬	歯髄失活剤
273	歯科口腔用薬	歯科用鎮痛鎮静剤(根管及び歯窩消毒剤を含む。)
274	歯科口腔用薬	歯髄乾屍剤(根管充填剤を含む。)
275	歯科口腔用薬	歯髄覆罩剤
276	歯科口腔用薬	歯科用抗生物質製剤
279	歯科口腔用薬	その他の歯科口腔用薬
290	その他の個々の器官系用医薬品	その他の個々の器官系用医薬品
311	ビタミン剤	ビタミンA及びD剤
312	ビタミン剤	ビタミンB1剤
313	ビタミン剤	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)
314	ビタミン剤	ビタミンC剤
315	ビタミン剤	ビタミンE剤
316	ビタミン剤	ビタミンK剤
317	ビタミン剤	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
319	ビタミン剤	その他のビタミン剤
321	滋養強壯薬	カルシウム剤
322	滋養強壯薬	無機質製剤
323	滋養強壯薬	糖類剤
324	滋養強壯薬	有機酸製剤
325	滋養強壯薬	たん白アミノ酸製剤
326	滋養強壯薬	臓器製剤
327	滋養強壯薬	乳幼児用剤
329	滋養強壯薬	その他の滋養強壯薬
331	血液・体液用薬	血液代用剤
332	血液・体液用薬	止血剤
333	血液・体液用薬	血液凝固阻止剤
339	血液・体液用薬	その他の血液・体液用薬
341	人工透析用薬	人工腎臓透析用剤
342	人工透析用薬	腹膜透析用剤
349	人工透析用薬	その他の人工透析用薬
391	その他の代謝性医薬品	肝臓疾患用剤
392	その他の代謝性医薬品	解毒剤
393	その他の代謝性医薬品	習慣性中毒用剤

薬効目次

薬効	薬効分類名(2桁)	薬効分類名(3桁)
394	その他の代謝性医薬品	痛風治療剤
395	その他の代謝性医薬品	酵素製剤
396	その他の代謝性医薬品	糖尿病用剤
397	その他の代謝性医薬品	総合代謝性製剤
399	その他の代謝性医薬品	他に分類されない代謝性医薬品
411	細胞賦活用薬	クロロフィル製剤
412	細胞賦活用薬	色素製剤
419	細胞賦活用薬	その他の細胞賦活用薬
421	腫瘍用薬	アルキル化剤
422	腫瘍用薬	代謝拮抗剤
423	腫瘍用薬	抗腫瘍性抗生物質製剤
424	腫瘍用薬	抗腫瘍性植物成分製剤
429	腫瘍用薬	その他の腫瘍用薬
430	放射性医薬品	放射性医薬品
441	アレルギー用薬	抗ヒスタミン剤
442	アレルギー用薬	刺激療法剤
443	アレルギー用薬	非特異性免疫原製剤
449	アレルギー用薬	その他のアレルギー用薬
490	その他の組織細胞機能用医薬品	その他の組織細胞機能用医薬品
510	生薬	生薬
520	漢方製剤	漢方製剤
590	その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品
611	抗生物質製剤	主としてグラム陽性菌に作用するもの
612	抗生物質製剤	主としてグラム陰性菌に作用するもの
613	抗生物質製剤	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
614	抗生物質製剤	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
615	抗生物質製剤	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの
616	抗生物質製剤	主として抗酸菌に作用するもの
617	抗生物質製剤	主としてカビに作用するもの
619	抗生物質製剤	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)
621	化学療法剤	サルファ剤
622	化学療法剤	抗結核剤
623	化学療法剤	抗ハンセン病剤
624	化学療法剤	合成抗菌剤
625	化学療法剤	抗ウイルス剤
629	化学療法剤	その他の化学療法剤
631	生物学的製剤	ワクチン類
632	生物学的製剤	毒素及びトキシノイド類
633	生物学的製剤	抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類
634	生物学的製剤	血液製剤類
635	生物学的製剤	生物学的試験用製剤類
636	生物学的製剤	混合生物学的製剤
639	生物学的製剤	その他の生物学的製剤
641	寄生動物用薬	抗寄生虫剤
642	寄生動物用薬	駆虫剤
649	寄生動物用薬	その他の寄生動物用薬
690	その他の病原生物に対する医薬品	その他の病原生物に対する医薬品
711	調剤用薬	賦形剤
712	調剤用薬	軟膏基剤
713	調剤用薬	溶解剤
714	調剤用薬	矯味, 矯臭, 着色剤

薬効目次

薬効	薬効分類名(2桁)	薬効分類名(3桁)
715	調剤用薬	乳化剤
719	調剤用薬	その他の調剤用薬
721	診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	X線造影剤
722	診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	機能検査用試薬
729	診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
731	公衆衛生用薬	防腐剤
732	公衆衛生用薬	防疫用殺菌消毒剤
733	公衆衛生用薬	防虫剤
734	公衆衛生用薬	殺虫剤
735	公衆衛生用薬	殺そ剤
739	公衆衛生用薬	その他の公衆衛生用薬
741	体外診断用医薬品	一般検査用試薬
742	体外診断用医薬品	血液検査用試薬
743	体外診断用医薬品	生化学的検査用試薬
744	体外診断用医薬品	免疫血清学的検査用試薬
745	体外診断用医薬品	細菌学的検査用薬
746	体外診断用医薬品	病理組織検査用薬
747	体外診断用医薬品	体外診断用放射性医薬品
749	体外診断用医薬品	その他の体外診断用医薬品
791	その他の治療を主目的としない医薬品	ばん創こう
799	その他の治療を主目的としない医薬品	他に分類されない治療を主目的としない医薬品
811	アルカロイド系麻薬(天然麻薬)	あへんアルカロイド系麻薬
812	アルカロイド系麻薬(天然麻薬)	コカアルカロイド系製剤
819	アルカロイド系麻薬(天然麻薬)	その他のアルカロイド系麻薬(天然麻薬)
821	非アルカロイド系麻薬	合成麻薬
829	非アルカロイド系麻薬	その他の非アルカロイド系麻薬
890	その他の麻薬	その他の麻薬

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク
1. 1. 1 全身麻酔剤	注射	採用	1%ディプリバン注-キット	500mg50mL	プロポフォール		劇	
1. 1. 1 全身麻酔剤	注射	採用	イソゾール注射用0. 5g	500mg1瓶(溶	チアミールナトリウム		劇	
1. 1. 1 全身麻酔剤	外用	採用	液化亜酸化窒素*(日本エア・リキ	1g	亜酸化窒素			
1. 1. 1 全身麻酔剤	注射	採用	ケタール筋注用500mg	500mg10mL	ケタミン塩酸塩		麻 劇	
1. 1. 1 全身麻酔剤	注射	採用	ケタール静注用200mg	200mg20mL	ケタミン塩酸塩		麻 劇	
1. 1. 1 全身麻酔剤	外用	採用	スープレン吸入麻酔液	1mL	デスフルラン		劇	
1. 1. 1 全身麻酔剤	外用	採用	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	1mL	セボフルラン	後発	劇	
1. 1. 1 全身麻酔剤	注射	採用	ドロレブタン注射液25mg	2. 5mg1mL(バ	ドロペリドール		劇	
1. 1. 1 全身麻酔剤	注射	採用	プロポフォール静注1%20mL「マル	200mg20mL	プロポフォール		劇	
1. 1. 1 全身麻酔剤	注射	採用	プロポフォール静注1%50mL「マル	500mg50mL	プロポフォール		劇	
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	内服	採用	アルブラゾラム錠0. 4mg「サワイ」	0. 4mg1錠	アルブラゾラム		精3	
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	外用	採用	エスクレ坐剤「250」	250mg1個	抱水クロラル			
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	外用	採用	エスクレ注腸用キット「500」	500mg1筒	抱水クロラル			
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	内服	採用	エスゾピクロン錠1mg「トーワ」	1mg1錠	エスゾピクロン	後発		
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	内服	院外	エスゾピクロン錠2mg「トーワ」	2mg1錠	エスゾピクロン	後発		
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	内服	採用	サイレース錠2mg	2mg1錠	フルニトラゼパム		精2	
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	注射	採用	サイレース静注2mg	2mg1管	フルニトラゼパム		精2	
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	内服	採用	ジアゼパム錠2「トーワ」	2mg1錠	ジアゼパム	後発	精3	
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	内服	院外	ジアゼパム錠5「トーワ」	5mg1錠	ジアゼパム	後発	精3	
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	注射	採用	ジアゼパム注射液10mg「NIG」	10mg1管	ジアゼパム		精3	
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	内服	採用	セディール錠10mg	10mg1錠	タンドスピロンクエン酸塩		劇	
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	内服	採用	セルシン散1%	1%1g	ジアゼパム		精3	
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	内服	採用	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「ト	5mg1錠	ゾルピデム酒石酸塩	後発	精3	
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	外用	採用	ダイアアップ坐剤10	10mg1個	ジアゼパム		精3	抗てんかん
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	外用	院外	ダイアアップ坐剤4	4mg1個	ジアゼパム		精3	抗てんかん
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	外用	採用	ダイアアップ坐剤6	6mg1個	ジアゼパム		精3	抗てんかん
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	注射	採用	デクスメトミジン静注液200μg/4	200μg50mL	デクスメトミジン塩酸塩	後発	劇	
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	内服	採用	トフィソパム錠50mg「トーワ」	50mg1錠	トフィソパム	後発		
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	内服	採用	ドラーレ錠15	15mg1錠	クアゼパム		精3	
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	内服	採用	トリアゾラム錠0. 25mg「日医工」	0. 25mg1錠	トリアゾラム	後発	精3	
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	内服	採用	トリクロリールシロップ10%	10%1mL	トリクロホスナトリウム		劇	
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	内服	外+限	フェノバル錠30mg	30mg1錠	フェノバルビタール		劇 精3	抗てんかん
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	注射	採用	フェノバル注射液100mg	10%1mL1管	フェノバルビタール		劇 精3	抗てんかん
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	内服	採用	フェノバルビタール散10%「ホエイ」	10%1g	フェノバルビタール		劇 精3	抗てんかん
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	内服	採用	プロチゾラムOD錠0. 25mg「テバ」	0. 25mg1錠	プロチゾラム		精3	
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	内服	採用	ベンザリン細粒1%	1%1g	ニトラゼパム		精3	抗てんかん
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	注射	採用	ミダゾラム注射液10mg「NIG」	10mg2mL1管	ミダゾラム		精3	
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	内服	院外	ユーロジン2mg錠	2mg1錠	エスタゾラム		精3	
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	外用	採用	ワコビタール坐剤50	50mg1個	フェノバルビタールナトリウム		劇 精3	抗てんかん
1. 1. 3 抗てんかん剤	内服	採用	アレビアチン散10%	10%1g	フェニトイン		劇	抗てんかん
1. 1. 3 抗てんかん剤	内服	採用	アレビアチン錠100mg	100mg1錠	フェニトイン			抗てんかん
1. 1. 3 抗てんかん剤	注射	採用	アレビアチン注250mg	5%5mL1管	フェニトインナトリウム		劇	抗てんかん
1. 1. 3 抗てんかん剤	内服	採用	エクセグラン散20%	20%1g	ゾニサミド		劇	抗てんかん
1. 1. 3 抗てんかん剤	内服	採用	エクセグラン錠100mg	100mg1錠	ゾニサミド		劇	抗てんかん
1. 1. 3 抗てんかん剤	内服	院外	エピレオプチマル散50%	50%1g	エトスクシミド			抗てんかん
1. 1. 3 抗てんかん剤	内服	採用	ガバペン錠200mg	200mg1錠	ガバペンチン			抗てんかん
1. 1. 3 抗てんかん剤	内服	院外	ガバペン錠400mg	400mg1錠	ガバペンチン			抗てんかん
1. 1. 3 抗てんかん剤	内服	採用	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	100mg1錠	カルバマゼピン			抗てんかん
1. 1. 3 抗てんかん剤	内服	採用	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	200mg1錠	カルバマゼピン			抗てんかん
1. 1. 3 抗てんかん剤	内服	採用	セレニカR顆粒40%	40%1g	バルプロ酸ナトリウム			抗てんかん
1. 1. 3 抗てんかん剤	内服	院外	セレニカR錠400mg	400mg1錠	バルプロ酸ナトリウム			抗てんかん

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク
1. 1. 3 抗てんかん剤	内服	院外	ディアコミットドライシロップ分包250	250mg1包	スチリペントール		劇	抗てんかん
1. 1. 3 抗てんかん剤	内服	院外	ディアコミットドライシロップ分包500	500mg1包	スチリペントール		劇	抗てんかん
1. 1. 3 抗てんかん剤	内服	採用	テグレート細粒50%	50%1g	カルバマゼピン			抗てんかん
1. 1. 3 抗てんかん剤	内服	院外	デパケンシロップ5%	5%1mL	バルプロ酸ナトリウム			抗てんかん
1. 1. 3 抗てんかん剤	内服	院外	トピナ錠10%	10%1g	トピラマート			抗てんかん
1. 1. 3 抗てんかん剤	内服	外+限	トピナ錠100mg	100mg1錠	トピラマート			抗てんかん
1. 1. 3 抗てんかん剤	内服	外+限	トピナ錠50mg	50mg1錠	トピラマート			抗てんかん
1. 1. 3 抗てんかん剤	注射	採用	ノーベルバル静注用250mg	250mg1瓶	フェノバルビタールナトリウム		劇 精3	抗てんかん
1. 1. 3 抗てんかん剤	内服	採用	バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ	5%1mL	バルプロ酸ナトリウム			抗てんかん
1. 1. 3 抗てんかん剤	内服	採用	バルプロ酸ナトリウム細粒20%「EM	20%1g	バルプロ酸ナトリウム			抗てんかん
1. 1. 3 抗てんかん剤	内服	採用	バルプロ酸ナトリウム錠200mg「DS	200mg1錠	バルプロ酸ナトリウム			抗てんかん
1. 1. 3 抗てんかん剤	内服	採用	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100r	100mg1錠	バルプロ酸ナトリウム			抗てんかん
1. 1. 3 抗てんかん剤	内服	採用	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200r	200mg1錠	バルプロ酸ナトリウム			抗てんかん
1. 1. 3 抗てんかん剤	内服	院外	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「E	5%1mL	バルプロ酸ナトリウム			抗てんかん
1. 1. 3 抗てんかん剤	内服	院外	ヒダントール配合錠	1錠	フェニトイン・フェノバルビタール配合剤		劇 精3	抗てんかん
1. 1. 3 抗てんかん剤	注射	採用	ビムバット点滴静注100mg	100mg10mL	ラコサミド		劇	抗てんかん
1. 1. 3 抗てんかん剤	内服	採用	フィコンパ錠2mg	2mg1錠	ペランパネル水和物			抗てんかん
1. 1. 3 抗てんかん剤	内服	院外	フィコンパ錠4mg	4mg1錠	ペランパネル水和物			抗てんかん
1. 1. 3 抗てんかん剤	注射	採用	フィコンパ点滴静注用2mg	2mg1瓶	ペランパネル水和物			抗てんかん
1. 1. 3 抗てんかん剤	内服	院外	ブリービアク錠25mg	25mg1錠	ブリーパラセタム			抗てんかん
1. 1. 3 抗てんかん剤	内服	院外	ブリービアク錠50mg	50mg1錠	ブリーパラセタム			抗てんかん
1. 1. 3 抗てんかん剤	注射	採用	ホスフェニトイン静注750mg	750mg10mL	ホスフェニトインナトリウム水和物		劇	抗てんかん
1. 1. 3 抗てんかん剤	内服	採用	マイスタン細粒1%	1%1g	クロバザム		精3	抗てんかん
1. 1. 3 抗てんかん剤	内服	採用	ラコサミド錠100mg「タカタ」	100mg1錠	ラコサミド	後発	劇	抗てんかん
1. 1. 3 抗てんかん剤	内服	採用	ラコサミド錠50mg「タカタ」	50mg1錠	ラコサミド	後発	劇	抗てんかん
1. 1. 3 抗てんかん剤	内服	外+限	ラミクタール錠100mg	100mg1錠	ラモトリギン		劇	抗てんかん
1. 1. 3 抗てんかん剤	内服	外+限	ラミクタール錠25mg	25mg1錠	ラモトリギン		劇	抗てんかん
1. 1. 3 抗てんかん剤	内服	院外	ラミクタール錠小児用2mg	2mg1錠	ラモトリギン		劇	抗てんかん
1. 1. 3 抗てんかん剤	内服	院外	ラミクタール錠小児用5mg	5mg1錠	ラモトリギン		劇	抗てんかん
1. 1. 3 抗てんかん剤	内服	採用	リボトリール細粒0. 1%	0. 1%1g	クロナゼパム		精3	抗てんかん
1. 1. 3 抗てんかん剤	内服	採用	リボトリール錠0. 5mg	0. 5mg1錠	クロナゼパム		精3	抗てんかん
1. 1. 3 抗てんかん剤	内服	採用	レベチラセタムDS50%「サワイ」	50%1g	レベチラセタム	後発		抗てんかん
1. 1. 3 抗てんかん剤	内服	採用	レベチラセタム錠250mg「サワイ」	250mg1錠	レベチラセタム	後発		抗てんかん
1. 1. 3 抗てんかん剤	内服	採用	レベチラセタム錠500mg「サワイ」	500mg1錠	レベチラセタム	後発		抗てんかん
1. 1. 3 抗てんかん剤	注射	採用	レベチラセタム点滴静注500mg「ア	500mg5mL1	レベチラセタム	後発		抗てんかん
1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤	内服	採用	アスピリン原末「マルイシ」	10g	アスピリン			血液凝固阻
1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤	内服	採用	アセトアミノフェン細粒20%「トーワ」	20%1g	アセトアミノフェン		劇	
1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤	注射	採用	アセリオ静注液1000mg「バッグ	1000mg100r	アセトアミノフェン		劇	
1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤	外用	採用	アルビニー坐剤100	100mg1個	アセトアミノフェン			
1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤	外用	採用	アルビニー坐剤200	200mg1個	アセトアミノフェン			
1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤	内服	採用	カロナール錠300	300mg1錠	アセトアミノフェン	後発		
1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤	内服	採用	カロナール錠500	500mg1錠	アセトアミノフェン	後発	劇	
1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤	外用	採用	ジクトルテープ75mg	75mg1枚	ジクロフェナクナトリウム			
1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤	内服	採用	ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」	25mg1錠	ジクロフェナクナトリウム	後発	劇	
1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤	外用	院外	ジクロフェナクナトリウム坐剤12. 5r	12. 5mg1個	ジクロフェナクナトリウム		劇	
1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤	外用	採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「	25mg1個	ジクロフェナクナトリウム		劇	
1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤	外用	採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「	50mg1個	ジクロフェナクナトリウム		劇	
1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤	内服	採用	セレコキシブ錠100mg「ケミファ」	100mg1錠	セレコキシブ	後発	劇	
1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤	注射	採用	ソセゴン注射液15mg	15mg1管	ペンタゾシン		劇 精2	
1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤	内服	院外	ソランタール錠100mg	100mg1錠	チアラミド塩酸塩			
1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤	内服	院外	ツートラム錠50mg	50mg1錠	トラマドール塩酸塩		劇	

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク
1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤	内服	採用	トアラセット配合錠「ケミファ」	1錠	トラマドール塩酸塩・アセ	後発	劇	
1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤	内服	採用	トラマールOD錠25mg	25mg1錠	トラマドール塩酸塩		劇	
1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤	注射	採用	トラマール注100	100mg1管	トラマドール塩酸塩		劇	
1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤	内服	採用	ノイロロビン錠4単位	4単位1錠	ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液			
1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤	注射	採用	ノイロロビン注射液3. 6単位	3mL1管	ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液			
1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤	内服	院外	ベオン錠80	80mg1錠	ザルトプロフェン		劇	
1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤	内服	採用	ポンタールシロップ3. 25%	3. 25%1mL	メフェナム酸			
1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤	内服	院外	モービック錠10mg	10mg1錠	メロキシカム			
1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤	注射	採用	レパタン注0. 3mg	0. 3mg1管	ブプレノルフィン塩酸塩		劇 精2	
1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤	内服	採用	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	60mg1錠	ロキソプロフェンナトリウム	後発		
1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤	注射	採用	ロピオン静注50mg	50mg5mL1管	フルルビプロフェン アキセチル		劇	
1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤	内服	院外	ロルカム錠4mg	4mg1錠	ロルノキシカム		劇	
1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤	内服	採用	ワントラム錠100mg	100mg1錠	トラマドール塩酸塩		劇	
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	内服	採用	アキネトン錠1mg	1mg1錠	ビペリデン塩酸塩			
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	注射	採用	アキネトン注射液5mg	0. 5%1mL1管	乳酸ビペリデン		劇	
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	内服	院外	アジレクト錠0. 5mg	0. 5mg1錠	ラサギリンメシル酸塩		劇	
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	内服	院外	アジレクト錠1mg	1mg1錠	ラサギリンメシル酸塩		劇	
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	内服	採用	アーテン錠(2mg)	2mg1錠	トリヘキシフェニジル塩酸塩			
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	内服	採用	アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワ	10%1g	アマンタジン塩酸塩	後発		
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	内服	採用	アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ	50mg1錠	アマンタジン塩酸塩	後発		
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	内服	外+限	エクフィナ錠50mg	50mg1錠	サフィナミドメシル酸塩		劇	
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	内服	採用	エフビーOD錠2. 5	2. 5mg1錠	セレギリン塩酸塩		劇	
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	内服	外+限	オンジェンティス錠25mg	25mg1錠	オビカポン		劇	
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	内服	院外	カバサル錠0. 25mg	0. 25mg1錠	カベルゴリン		劇	
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	内服	採用	カバサル錠1. 0mg	1mg1錠	カベルゴリン		劇	
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	内服	採用	コムタン錠100mg	100mg1錠	エンタカポン			
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	内服	院外	スタレボ配合錠L100	1錠	レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカポン			
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	内服	院外	スタレボ配合錠L50	1錠	レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカポン			
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	内服	採用	ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP	25mg1錠	ゾニサミド	後発	劇	
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	内服	院外	ゾニサミドOD錠50mgTRE「SMPP	50mg1錠	ゾニサミド	後発	劇	
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	内服	採用	ドパコール配合錠L100	1錠	レボドパ・カルビドパ水和物	後発		
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	内服	採用	ドパストン散98. 5%	98. 5%1g	レボドパ			
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	注射	採用	ドパストン静注50mg	0. 25%20mL	レボドパ			
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	内服	採用	ドブスOD錠100mg	100mg1錠	ドロキシドパ			
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	内服	採用	ドブスOD錠200mg	200mg1錠	ドロキシドパ			
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	外用	採用	ニュープロパッチ13. 5mg	13. 5mg1枚	ロチゴチン		劇	
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	外用	採用	ニュープロパッチ18mg	18mg1枚	ロチゴチン		劇	
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	外用	採用	ニュープロパッチ4. 5mg	4. 5mg1枚	ロチゴチン		劇	
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	外用	採用	ニュープロパッチ9mg	9mg1枚	ロチゴチン		劇	
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	内服	採用	ノウリアスト錠20mg	20mg1錠	イストラデフィリン			
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	外用	院外	ハルロピテプ16mg	16mg1枚	ロビニロール塩酸塩		劇	
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	外用	院外	ハルロピテプ24mg	24mg1枚	ロビニロール塩酸塩		劇	
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	外用	院外	ハルロピテプ32mg	32mg1枚	ロビニロール塩酸塩		劇	
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	外用	院外	ハルロピテプ40mg	40mg1枚	ロビニロール塩酸塩		劇	
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	外用	院外	ハルロピテプ8mg	8mg1枚	ロビニロール塩酸塩		劇	
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	内服	外+限	パーロデル錠2. 5mg	2. 5mg1錠	プロモクリブチンメシル酸塩		劇	
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	内服	採用	プラミペキソール塩酸塩OD錠0. 12	0. 125mg1錠	プラミペキソール塩酸塩	後発	劇	
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	内服	採用	プラミペキソール塩酸塩OD錠0. 5m	0. 5mg1錠	プラミペキソール塩酸塩	後発	劇	
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	内服	採用	マドパー配合錠L100	1錠	レボドパ・ベンセラジド塩酸塩			
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	内服	採用	ミラベックスLA錠0. 375mg	0. 375mg1錠	プラミペキソール塩酸塩水和物		劇	
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	内服	採用	ミラベックスLA錠1. 5mg	1. 5mg1錠	プラミペキソール塩酸塩水和物		劇	

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	内服	採用	レキップCR錠2mg	2mg1錠	ロビニロール塩酸塩		劇	
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	内服	院外	レキップCR錠8mg	8mg1錠	ロビニロール塩酸塩		劇	
1. 1. 7 精神神経用剤	内服	採用	アタラックスPカプセル25mg	25mg1カプセル	ヒドロキシジシバモ酸塩			精神神経
1. 1. 7 精神神経用剤	注射	採用	アタラックスP注射液(50mg/ml)	5%1mL1管	ヒドロキシジシバモ酸塩			精神神経
1. 1. 7 精神神経用剤	内服	院外	アタラックスPドライシロップ2. 5%	2. 5%1g	ヒドロキシジシバモ酸塩			精神神経
1. 1. 7 精神神経用剤	注射	限定	アナフラニール点滴静注液25mg	25mg1管	クロミプラミン塩酸塩		劇	精神神経
1. 1. 7 精神神経用剤	内服	採用	アリピプラゾールOD錠3mg「ニプロ	3mg1錠	アリピプラゾール	後発	劇	精神神経
1. 1. 7 精神神経用剤	内服	院外	インチュニブ錠1mg	1mg1錠	グアンファシン塩酸塩		劇	精神神経
1. 1. 7 精神神経用剤	内服	院外	インチュニブ錠3mg	3mg1錠	グアンファシン塩酸塩		劇	精神神経
1. 1. 7 精神神経用剤	内服	採用	エチゾラム錠0. 5mg「SW」	0. 5mg1錠	エチゾラム		精3	精神神経
1. 1. 7 精神神経用剤	内服	採用	クエチアピン錠100mg「DSEP」	100mg1錠	クエチアピソフルマ酸塩	後発	劇	精神神経
1. 1. 7 精神神経用剤	内服	採用	クエチアピン錠25mg「DSEP」	25mg1錠	クエチアピソフルマ酸塩	後発	劇	精神神経
1. 1. 7 精神神経用剤	内服	採用	クロチアゼパム錠5mg「トーフ」	5mg1錠	クロチアゼパム		精3	精神神経
1. 1. 7 精神神経用剤	内服	院外	コンサータ錠18mg	18mg1錠	メチルフェニデート塩酸塩		劇 精1	精神神経
1. 1. 7 精神神経用剤	内服	院外	コンサータ錠27mg	27mg1錠	メチルフェニデート塩酸塩		劇 精1	精神神経
1. 1. 7 精神神経用剤	内服	院外	コンサータ錠36mg	36mg1錠	メチルフェニデート塩酸塩		劇 精1	精神神経
1. 1. 7 精神神経用剤	注射	採用	コンミン筋注10mg	0. 5%2mL1管	クロルプロマジン塩酸塩		劇	精神神経
1. 1. 7 精神神経用剤	内服	採用	サインバルタカプセル20mg	20mg1カプセル	デロキサセチン塩酸塩		劇	精神神経
1. 1. 7 精神神経用剤	内服	採用	ジェイゾロフト錠50mg	50mg1錠	セルトラリン塩酸塩		劇	精神神経
1. 1. 7 精神神経用剤	内服	採用	ジプレキサザイデイス錠2. 5mg	2. 5mg1錠	オランザピン		劇	精神神経
1. 1. 7 精神神経用剤	内服	採用	ジプレキサザイデイス錠5mg	5mg1錠	オランザピン		劇	精神神経
1. 1. 7 精神神経用剤	内服	院外	ストラテラカプセル10mg	10mg1カプセル	アトモセチン塩酸塩		劇	精神神経
1. 1. 7 精神神経用剤	内服	院外	ストラテラカプセル25mg	25mg1カプセル	アトモセチン塩酸塩		劇	精神神経
1. 1. 7 精神神経用剤	内服	院外	ストラテラカプセル40mg	40mg1カプセル	アトモセチン塩酸塩		劇	精神神経
1. 1. 7 精神神経用剤	内服	院外	ストラテラカプセル5mg	5mg1カプセル	アトモセチン塩酸塩		劇	精神神経
1. 1. 7 精神神経用剤	内服	採用	テトラミド錠10mg	10mg1錠	ミアンセリン塩酸塩			精神神経
1. 1. 7 精神神経用剤	内服	院外	トフラニール錠10mg	10mg1錠	イミプラミン塩酸塩			精神神経
1. 1. 7 精神神経用剤	内服	採用	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	25mg1錠	トラゾドン塩酸塩		劇	精神神経
1. 1. 7 精神神経用剤	内服	採用	トリプタノール錠10	10mg1錠	アミトリプチリン塩酸塩			精神神経
1. 1. 7 精神神経用剤	注射	採用	ノバミン筋注5mg	0. 5%1mL1管	ブロクロルペラジンメシル酸塩			精神神経
1. 1. 7 精神神経用剤	内服	採用	ノバミン錠5mg	5mg1錠	ブロクロルペラジンマレイン酸塩			精神神経
1. 1. 7 精神神経用剤	内服	採用	パキシルCR錠12. 5mg	12. 5mg1錠	パロキセチン塩酸塩水和物		劇	精神神経
1. 1. 7 精神神経用剤	内服	採用	ハロペリドール錠1mg「タカタ」	1mg1錠	ハロペリドール	後発	劇	精神神経
1. 1. 7 精神神経用剤	注射	採用	ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」	0. 5%1mL1管	ハロペリドール	後発	劇	精神神経
1. 1. 7 精神神経用剤	内服	院外	ビバンセカプセル20mg	20mg1カプセル	リスデキサンフェタミンメシル酸塩		劇	精神神経
1. 1. 7 精神神経用剤	内服	院外	ビバンセカプセル30mg	30mg1カプセル	リスデキサンフェタミンメシル酸塩		劇	精神神経
1. 1. 7 精神神経用剤	内服	採用	ヒルナミン錠(25mg)	25mg1錠	レボメプロマジンマレイン酸塩			精神神経
1. 1. 7 精神神経用剤	内服	採用	ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」	15mg1錠	ミルタザピン	後発	劇	精神神経
1. 1. 7 精神神経用剤	内服	院外	リスパダール細粒1%	1%1g	リスペリドン		劇	精神神経
1. 1. 7 精神神経用剤	内服	採用	リスペリドンOD錠0. 5mg「サワイ」	0. 5mg1錠	リスペリドン		劇	精神神経
1. 1. 7 精神神経用剤	内服	採用	リスペリドンOD錠1mg「サワイ」	1mg1錠	リスペリドン		劇	精神神経
1. 1. 7 精神神経用剤	内服	院外	ルボックス錠25	25mg1錠	フルボキサミンマレイン酸塩			精神神経
1. 1. 7 精神神経用剤	内服	採用	レキサルティOD錠0. 5mg	0. 5mg1錠	ブレクスピプラゾール		劇	精神神経
1. 1. 7 精神神経用剤	内服	院外	レキサルティOD錠1mg	1mg1錠	ブレクスピプラゾール		劇	精神神経
1. 1. 7 精神神経用剤	内服	院外	レキサルティOD錠2mg	2mg1錠	ブレクスピプラゾール		劇	精神神経
1. 1. 7 精神神経用剤	内服	採用	レキサプロ錠10mg	10mg1錠	エスタシロプラムシュウ酸塩		劇	精神神経
1. 1. 7 精神神経用剤	外用	採用	ロナセンテープ20mg	20mg1枚	プロナセリン		劇	精神神経
1. 1. 8 総合感冒剤	内服	採用	PL配合顆粒	1g	非ピリソ系感冒剤		劇	
1. 1. 9 その他の中枢神経系用剤	外用	院外	アリドネパッチ27. 5mg	27. 5mg1枚	ドネペジル		劇	
1. 1. 9 その他の中枢神経系用剤	外用	院外	アリドネパッチ55mg	55mg1枚	ドネペジル		劇	
1. 1. 9 その他の中枢神経系用剤	注射	採用	エダラボン点滴静注液30mgバッグ	30mg100mL	エダラボン	後発		

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク
1. 1. 9 その他の中枢神経系用	注射 自注	採用	エムガルティ皮下注120mgオートイ	120mg1mL1	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)			
1. 1. 9 その他の中枢神経系用	内服	採用	ガラタミンOD錠12mg「ニプロ」	12mg1錠	ガラタミン臭化水素酸塩	後発	劇	
1. 1. 9 その他の中枢神経系用	内服	採用	ガラタミンOD錠4mg「ニプロ」	4mg1錠	ガラタミン臭化水素酸塩	後発	劇	
1. 1. 9 その他の中枢神経系用	内服	採用	ガラタミンOD錠8mg「ニプロ」	8mg1錠	ガラタミン臭化水素酸塩	後発	劇	
1. 1. 9 その他の中枢神経系用	内服	採用	クービック錠50mg	50mg1錠	ダリドレキサント塩酸塩			
1. 1. 9 その他の中枢神経系用	注射	採用	ケサンラ点滴静注液350mg	350mg20mL	ドナネマブ(遺伝子組換え)		劇	
1. 1. 9 その他の中枢神経系用	注射 自注	外+限	ケシンブタ皮下注20mgペン	20mg0. 4mL	オフアツムマブ(遺伝子組換え)		劇	
1. 1. 9 その他の中枢神経系用	内服	採用	タリージェOD錠10mg	10mg1錠	ミロガバリンベシル酸塩			
1. 1. 9 その他の中枢神経系用	内服	採用	タリージェOD錠15mg	15mg1錠	ミロガバリンベシル酸塩			
1. 1. 9 その他の中枢神経系用	内服	採用	タリージェOD錠2. 5mg	2. 5mg1錠	ミロガバリンベシル酸塩			
1. 1. 9 その他の中枢神経系用	内服	採用	タリージェOD錠5mg	5mg1錠	ミロガバリンベシル酸塩			
1. 1. 9 その他の中枢神経系用	内服	採用	タルチレリンOD錠5mg「日医工」	5mg1錠	タルチレリン水和物	後発		
1. 1. 9 その他の中枢神経系用	内服	採用	チアブリド錠50mg「サワイ」	50mg1錠	チアブリド塩酸塩	後発		
1. 1. 9 その他の中枢神経系用	内服	採用	デエビゴ錠5mg	5mg1錠	レンボレキサント			
1. 1. 9 その他の中枢神経系用	内服	採用	ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「明治」	10mg1錠	ドネペジル塩酸塩	後発	劇	
1. 1. 9 その他の中枢神経系用	内服	採用	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」	3mg1錠	ドネペジル塩酸塩	後発	劇	
1. 1. 9 その他の中枢神経系用	内服	採用	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」	5mg1錠	ドネペジル塩酸塩	後発	劇	
1. 1. 9 その他の中枢神経系用	内服	院外	ナルティークOD錠75mg	75mg1錠	リメゲパント硫酸塩水和物			
1. 1. 9 その他の中枢神経系用	内服	院外	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2. 5μg	2. 5μg1錠	ナルフラフィン塩酸塩	後発	劇	
1. 1. 9 その他の中枢神経系用	内服	採用	プレガバリンOD錠150mg「日医工」	150mg1錠	プレガバリン	後発		
1. 1. 9 その他の中枢神経系用	内服	採用	プレガバリンOD錠25mg「日医工」	25mg1錠	プレガバリン	後発		
1. 1. 9 その他の中枢神経系用	内服	採用	プレガバリンOD錠75mg「日医工」	75mg1錠	プレガバリン	後発		
1. 1. 9 その他の中枢神経系用	内服	採用	ベルソムラ錠15mg	15mg1錠	スボレキサント			
1. 1. 9 その他の中枢神経系用	内服	院外	ベルソムラ錠20mg	20mg1錠	スボレキサント			
1. 1. 9 その他の中枢神経系用	内服	院外	ボルズィ錠5mg	5mg1錠	ボルノレキサント水和物			
1. 1. 9 その他の中枢神経系用	内服	採用	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「明治」	20mg1錠	メマンチン塩酸塩	後発	劇	
1. 1. 9 その他の中枢神経系用	内服	採用	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「明治」	5mg1錠	メマンチン塩酸塩	後発	劇	
1. 1. 9 その他の中枢神経系用	内服	院外	メラトベル顆粒小児用0. 2%	0. 2%1g	メラトニン			
1. 1. 9 その他の中枢神経系用	外用	採用	リバスタッチパッチ13. 5mg	13. 5mg1枚	リバスチグミン		劇	
1. 1. 9 その他の中枢神経系用	外用	採用	リバスタッチパッチ18mg	18mg1枚	リバスチグミン		劇	
1. 1. 9 その他の中枢神経系用	外用	採用	リバスタッチパッチ4. 5mg	4. 5mg1枚	リバスチグミン		劇	
1. 1. 9 その他の中枢神経系用	外用	採用	リバスタッチパッチ9mg	9mg1枚	リバスチグミン		劇	
1. 1. 9 その他の中枢神経系用	内服	外+限	リルゾール錠50mg「AA」	50mg1錠	リルゾール	後発		
1. 1. 9 その他の中枢神経系用	注射	採用	レケンビ点滴静注200mg	200mg2mL1	レカネマブ(遺伝子組換え)		劇	
1. 1. 9 その他の中枢神経系用	注射	採用	レケンビ点滴静注500mg	500mg5mL1	レカネマブ(遺伝子組換え)		劇	
1. 1. 9 その他の中枢神経系用	内服	採用	ロゼレム錠8mg	8mg1錠	ラメルテオン			
1. 2. 1 局所麻酔剤	外用	採用	エムラクリーム	1g	リドカイン・プロピトカイン配合剤		劇	
1. 2. 1 局所麻酔剤	外用	採用	キシロカイン液「4%」	4%1mL	リドカイン塩酸塩			
1. 2. 1 局所麻酔剤	外用	採用	キシロカインゼリー2%	2%1mL	リドカイン塩酸塩			
1. 2. 1 局所麻酔剤	注射	採用	キシロカイン注射液「0. 5%」エピレ	0. 5%10mL	リドカイン塩酸塩・アドレナリン		劇	
1. 2. 1 局所麻酔剤	注射	採用	キシロカイン注射液「1%」エピレナミ	1%10mLバイ	リドカイン塩酸塩・アドレナリン		劇	
1. 2. 1 局所麻酔剤	注射	採用	キシロカイン注射液「2%」エピレナミ	2%10mLバイ	リドカイン塩酸塩・アドレナリン		劇	
1. 2. 1 局所麻酔剤	注射	採用	キシロカイン注ボリアンプ1%	1%10mL1管	リドカイン塩酸塩		劇	
1. 2. 1 局所麻酔剤	外用	採用	キシロカインポンプスプレー8%	1g	リドカイン		劇	
1. 2. 1 局所麻酔剤	外用	採用	ペンレステーブ18mg	(18mg)30. 5	リドカイン		劇	
1. 2. 1 局所麻酔剤	注射	採用	マーカイン注0. 25%	0. 25%10mL	ブピバカイン塩酸塩水和物		劇	
1. 2. 1 局所麻酔剤	注射	採用	マーカイン注0. 5%	0. 5%10mL	ブピバカイン塩酸塩水和物		劇	
1. 2. 1 局所麻酔剤	注射	採用	マーカイン注脊麻用0. 5%高比重	0. 5%4mL1管	ブピバカイン塩酸塩水和物		劇	
1. 2. 1 局所麻酔剤	注射	採用	マーカイン注脊麻用0. 5%等比重	0. 5%4mL1管	ブピバカイン塩酸塩水和物		劇	
1. 2. 1 局所麻酔剤	注射	採用	リドカイン塩酸塩注0. 5%「日新」	0. 5%10mL1	リドカイン塩酸塩	後発	劇	
1. 2. 1 局所麻酔剤	注射	採用	リドカイン塩酸塩注2%「日新」	2%5mL1管	リドカイン塩酸塩	後発	劇	

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク
1. 2. 1 局所麻酔剤	内服	採用	リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」	2%1mL	リドカイン塩酸塩	後発	劇	
1. 2. 1 局所麻酔剤	外用	採用	リドカインテープ18mg「YP」	(18mg)30. 5	リドカイン		劇	
1. 2. 1 局所麻酔剤	注射	限定	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」	1%200mL1袋	リドカイン	後発	劇	不整脈用特
1. 2. 1 局所麻酔剤	注射	採用	ロピバカイン塩酸塩0. 2%注バッグ20. 2%100mL	0. 2%100mL	ロピバカイン塩酸塩水和物	後発	劇	
1. 2. 1 局所麻酔剤	注射	採用	ロピバカイン塩酸塩0. 75%注150r	0. 75%20mL	ロピバカイン塩酸塩水和物	後発	劇	
1. 2. 2 骨格筋弛緩剤	注射	採用	スキサメニウム注100「マルイシ」	2%5mL1管	スキサメニウム塩化物水和物		毒	
1. 2. 2 骨格筋弛緩剤	内服	採用	ダントリウムカプセル25mg	25mg1カプセル	ダントロレンナトリウム水和物			
1. 2. 2 骨格筋弛緩剤	注射	採用	ダントリウム静注用20mg	20mg1瓶	ダントロレンナトリウム水和物			
1. 2. 2 骨格筋弛緩剤	注射	採用	ボトックス注用50単位	50単位1瓶	A型ボツリヌス毒素		毒	
1. 2. 2 骨格筋弛緩剤	内服	採用	リンラキサー錠250mg	250mg1錠	クロルフェネシカルバミン酸エステル			
1. 2. 2 骨格筋弛緩剤	注射	採用	ロクロニウム臭化物静注液50mg/	50mg5mL1瓶	ロクロニウム臭化物		毒	
1. 2. 3 自律神経剤	内服	採用	ウブレチド錠5mg	5mg1錠	ジステグミン臭化物		毒	
1. 2. 3 自律神経剤	注射	採用	オビソート注射用0. 1g	100mg1管(溶	アセチルコリン塩化物		劇	
1. 2. 3 自律神経剤	内服	採用	マイテラーゼ錠10mg	10mg1錠	アンベノニウム塩化物			
1. 2. 3 自律神経剤	内服	採用	メスチノン錠60mg	60mg1錠	ピリドステグミン臭化物		劇	
1. 2. 3 自律神経剤	注射	採用	ワゴスチグミン注0. 5mg	0. 05%1mL1	ネオスチグミンメチル硫酸塩		劇	
1. 2. 4 鎮けい剤	注射	採用	アトロピン注0. 05%シリンジ「テルモ」	0. 05%1mL1	アトロピン硫酸塩水和物		劇	不整脈用特
1. 2. 4 鎮けい剤	内服	採用	エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」	50mg1錠	エペリゾン塩酸塩	後発		
1. 2. 4 鎮けい剤	内服	外+限	ギャバロン錠5mg	5mg1錠	バクロフェン		劇	
1. 2. 4 鎮けい剤	内服	院外	ダクチル錠50mg	50mg1錠	ピペリドレート塩酸塩		劇	
1. 2. 4 鎮けい剤	内服	採用	チザニジン錠1mg「トーワ」	1mg1錠	チザニジン塩酸塩	後発		
1. 2. 4 鎮けい剤	注射	採用	パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」	4%1mL1管	パパベリン塩酸塩			
1. 2. 4 鎮けい剤	注射	採用	ブスコパン注20mg	2%1mL1管	ブチルスコポラミン臭化物		劇	
1. 2. 4 鎮けい剤	内服	採用	ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「	10mg1錠	ブチルスコポラミン臭化物	後発		
1. 2. 4 鎮けい剤	注射	採用	ブチルスコポラミン臭化物注20mg「	20mg1mL1管	ブチルスコポラミン臭化物	後発	劇	
1. 2. 4 鎮けい剤	注射	採用	硫酸Mg補正液1mEq/mL	0. 5モル20mL	硫酸マグネシウム水和物			
1. 2. 5 発汗剤、止汗剤	外用	院外	エクロックゲル5%	5%1g	ソフピロニウム臭化物			
1. 2. 9 その他の末梢神経系用	注射	採用	コルスバ静注透析用シリンジ17. 5/	17. 5μg0. 7r	ジフェリケファリン酢酸塩			
1. 2. 9 その他の末梢神経系用	注射	採用	コルスバ静注透析用シリンジ25. 0/	25μg0. 7mL	ジフェリケファリン酢酸塩			
1. 2. 9 その他の末梢神経系用	注射	採用	コルスバ静注透析用シリンジ35. 0/	35μg0. 7mL	ジフェリケファリン酢酸塩			
1. 2. 9 その他の末梢神経系用	内服	院外	ビンダケルカプセル20mg	20mg1カプセル	タファミジスメグルミン		劇	
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	PA・ヨード点眼・洗眼液	0. 2%1mL	ポリビニルアルコールヨウ素			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	アイオビジンUD点眼液1%	1%0. 1mL1個	アブラクロニン塩酸塩		劇	
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	アイベータ配合点眼液	1mL	ブリモニジン酒石酸塩・チモロールマレイン酸塩			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	アイラミド配合懸濁性点眼液	1mL	ブリモニジン酒石酸塩・プリンゾラミド			
1. 3. 1 眼科用剤	注射	採用	アイリーア8mg硝子体内注射用キッ	8mg0. 07mL	アフリベルセプト(遺伝子組換え)		劇	
1. 3. 1 眼科用剤	注射	採用	アイリーア硝子体内注射用キット40r	2mg0. 05mL	アフリベルセプト(遺伝子組換え)		劇	
1. 3. 1 眼科用剤	外用	院外	アジマイシン点眼液1%	1%1mL	アジスロマイシン水和物			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	アゾルガ配合懸濁性点眼液	1mL	プリンゾラミド・チモロールマレイン酸塩			
1. 3. 1 眼科用剤	内服	院外	アダブチノール錠5mg	5mg1錠	ヘレニエン			
1. 3. 1 眼科用剤	注射	採用	アフリベルセプトBS硝子体内注射用	2mg0. 05mL	アフリベルセプト(遺伝子	後発	劇	
1. 3. 1 眼科用剤	外用	院外	アレジオンLX点眼液0. 1%	0. 1%1mL	エピナスチン塩酸塩			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	院外	アレジオン眼瞼クリーム0. 5%	0. 5%1g	エピナスチン塩酸塩			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	院外	アレジオン点眼液0. 05%	0. 05%1mL	エピナスチン塩酸塩			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	院外	エイベリス点眼液0. 002%	0. 002%1mL	オミデネバグ イソプロピル		劇	
1. 3. 1 眼科用剤	外用	外+限	オフサロン点眼液	5mL1瓶	クロラムフェニコール・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	オロパタジン点眼液0. 1%「センジュ	0. 1%1mL	オロパタジン塩酸塩	後発		
1. 3. 1 眼科用剤	外用	院外	ガチフロ点眼液0. 3%	0. 3%1mL	ガチフロキサシン水和物			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%	2%1mL	カルテオロール塩酸塩	後発		
1. 3. 1 眼科用剤	外用	院外	グラアルファ配合点眼液	1mL	リバスジル塩酸塩水和物・ブリモニジン酒石酸塩			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	グラナテック点眼液0. 4%	0. 4%1mL	リバスジル塩酸塩水和物			

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	サイブレジン1%点眼液	1%1mL	シクロペントラート塩酸塩			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	サンドールP点眼液	1mL	トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	サンビロ点眼液2%	2%5mL1瓶	ピロカルピン塩酸塩		劇	
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	サンベタゾン眼耳鼻科用液0. 1%	0. 1%1mL	ベタメタゾンリン酸エステル	後発		
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	シアノコバラミン点眼液0. 02%「ニッ	0. 02%5mL1	シアノコバラミン	後発		
1. 3. 1 眼科用剤	外用	院外	ジクアスLX点眼液3%	3%5mL1瓶	ジクアホソルナトリウム			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	ジクアス点眼液3%	3%5mL1瓶	ジクアホソルナトリウム			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	スコピゾル眼科用液	1mL	ヒドロキシエチルセルロース・無機塩類配合剤			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	セタネオ点眼液0. 002%	0. 002%1mL	セベタプロスト			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	ゾビラックス眼軟膏3%	3%1g	アシクロビル			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	院外	タプコム配合点眼液	1mL	タフルプロスト・チモロールマレイン酸塩	後発	劇	
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	タプロス点眼液0. 0015%	0. 0015%1m	タフルプロスト		劇	
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	タリビッド眼軟膏0. 3%	0. 3%1g	オフロキサシン			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	院外	チモプトルXE点眼液0. 5%	0. 5%1mL	チモロールマレイン酸塩			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	院外	デタントール0. 01%点眼液	0. 01%1mL	ブナゾシン塩酸塩			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	院外	トブラシン点眼液0. 3%	3mg1mL	トブラマイシン		劇	
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	トラチモ配合点眼液「ニットー」	1mL	トラボプロスト・チモロー	後発		
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	トラボプロスト点眼液0. 004%「ニッ	0. 004%1mL	トラボプロスト	後発		
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	トルソプト点眼液1%	1%1mL	ドルゾラミド塩酸塩			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	ドルモロール配合点眼液「ニットー」	1mL	ドルゾラミド塩酸塩・チモ	後発		
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	トロピカミド点眼液0. 4%「日点」	0. 4%1mL	トロピカミド	後発		
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	日点アトロピン点眼液1%	1%5mL1瓶	アトロピン硫酸塩水和物		劇	
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	ネオシネジューフ5%点眼液	5%1mL	フェニレフリン塩酸塩			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	ネオメドロールEE軟膏	1g	フラジオマイシン硫酸塩・メチルプレドニゾン			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	院外	ネバナック懸濁性点眼液0. 1%	0. 1%1mL	ネパフェナク			
1. 3. 1 眼科用剤	注射	採用	パピースモ硝子体内注射用キット12	6mg0. 05mL	ファリシマブ(遺伝子組換え)		劇	
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	ヒアルロン酸Na0. 85眼粘弾剤1%	1%0. 85mL1	精製ヒアルロン酸ナトリウム			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	ヒアルロン酸Na点眼液0. 1%「ニッ	0. 1%5mL1瓶	精製ヒアルロン酸ナトリウム	後発		
1. 3. 1 眼科用剤	外用	院外	ヒアレインミニ点眼液0. 1%	0. 1%0. 4mL	精製ヒアルロン酸ナトリウム			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.	0. 46%20mL	オキシグルタチオン			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	ビスコート0. 5眼粘弾剤	0. 5mL1筒	精製ヒアルロン酸ナトリウム	後発		
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	ビマトプロスト点眼液0. 03%「SEC	0. 03%1mL	ビマトプロスト	後発		
1. 3. 1 眼科用剤	外用	外+限	ピマリシン点眼液5%「センジュ」	50mg1mL	ピマリシン			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	ピレノキシン懸濁性点眼液0. 005%	0. 005%5mL	ピレノキシン	後発		
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	ヒーロンV眼粘弾剤2. 3%シリンジ0	2. 3%0. 6mL	精製ヒアルロン酸ナトリウム			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	プラノプロフェン点眼液0. 1%「参天	0. 1%1mL	プラノプロフェン	後発		
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	プリモニジン酒石酸塩点眼液0. 1%	0. 1%1mL	プリモニジン酒石酸塩	後発		
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	プリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サン	1%1mL	プリンゾラミド	後発		
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	フルオロメロン点眼液0. 1%「NIT	0. 1%1mL	フルオロメロン	後発		
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	ブレドニン眼軟膏	0. 25%1g	ブレドニゾン酢酸エステル			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	フロムフェナクNa点眼液0. 1%「ニッ	0. 1%1mL	フロムフェナクナトリウム	後発		
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	ベストロン点眼用0. 5%	5mg1mL(溶解	セフメノキシム塩酸塩			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	ベノキシル点眼液0. 4%	0. 4%1mL	オキシブプロカイン塩酸塩			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	院外	ベルベゾロンF点眼・点鼻液	1mL	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸			
1. 3. 1 眼科用剤	注射	採用	マキューイド眼注用40mg	40mg1瓶	トリアムシノロンアセトニド			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	院外	ミオピン点眼液	5mL1瓶	ネオスチグミンメチル硫酸塩・無機塩類配合剤			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	院外	ミケルナ配合点眼液	1mL	カルテオロール塩酸塩・ラタノプロスト			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	モキシフロキサシン点眼液0. 5%「サ	0. 5%1mL	モキシフロキサシン塩酸塩	後発		
1. 3. 1 眼科用剤	外用	院外	ラクリミン点眼液0. 05%	0. 05%5mL1	オキシブプロカイン塩酸塩			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	ラタチモ配合点眼液「ニットー」	1mL	ラタノプロスト・チモロー	後発		
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	ラタノプロスト点眼液0. 005%「SEC	0. 005%1mL	ラタノプロスト	後発		

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク
1. 3. 1 眼科用剤	注射	採用	ラニビズマブBS硝子体内注射用キット	0. 5mg0. 05r	ラニビズマブ(遺伝子組換え)	後発	劇	
1. 3. 1 眼科用剤	外用	院外	リボスチン点眼液0. 025%	0. 025%1mL	レボカバステン塩酸塩			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	限定	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0. 1%	0. 1%1mL	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム			
1. 3. 1 眼科用剤	注射	採用	ルセンティス硝子体内注射用キット1	0. 5mg0. 05r	ラニビズマブ(遺伝子組換え)		劇	
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」	2%5mL1瓶	レバミピド	後発		
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	レボフロキサシン点眼液1. 5%「ニッ	1. 5%1mL	レボフロキサシン水和物	後発		
1. 3. 2 耳鼻科用剤	外用	院外	エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用	5. 6mg1瓶	デキサメタゾンシベシル酸エステル			
1. 3. 2 耳鼻科用剤	外用	院外	コールタイジン点鼻液	1mL	テトラヒドロゾリン塩酸塩・プレドニゾン			
1. 3. 2 耳鼻科用剤	外用	採用	ザジテン点鼻液0. 05%	6. 048mg8m	ケトチフェンフマル酸塩			
1. 3. 2 耳鼻科用剤	外用	採用	タリビッド耳科用液0. 3%	3mg1mL	オフロキサシン			
1. 3. 2 耳鼻科用剤	外用	採用	トラマゾリン点鼻液0. 118%「AFP」	0. 118%1mL	トラマゾリン塩酸塩		劇	
1. 3. 2 耳鼻科用剤	外用	採用	フルチカゾンフランカルボン酸エステ	3mg6g1キット	フルチカゾンフランカルボン酸塩	後発		
1. 3. 2 耳鼻科用剤	外用	採用	ホスミンS耳科用3%	30mg1mL(溶	ホスホマイシンナトリウム			
1. 3. 2 耳鼻科用剤	外用	採用	モメタゾン点鼻液50μg「ニットー」56	5mg10g1瓶	モメタゾンフランカルボン	後発		
1. 3. 2 耳鼻科用剤	外用	採用	リティンバ耳科用250μgセット	1セット	トラフェルミン(遺伝子組換え)			
1. 3. 2 耳鼻科用剤	外用	院外	リボスチン点鼻液0. 025mg112噴	0. 025%15m	レボカバステン塩酸塩			
1. 3. 3 鎮量剤	内服	採用	イソメニールカプセル7. 5mg	7. 5mg1カプセ	dl-イソプレナリン塩酸塩			
1. 3. 3 鎮量剤	内服	採用	セファドール錠25mg	25mg1錠	ジフェニドール塩酸塩			
1. 3. 3 鎮量剤	内服	採用	トラベルミン配合錠	1錠	ジフェニドール塩酸塩・ジプロフィリン			
1. 3. 3 鎮量剤	内服	院外	ドラマミン錠50mg	50mg1錠	ジメンヒドリナート			
1. 3. 3 鎮量剤	内服	採用	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トー	6mg1錠	ベタヒスチンメシル酸塩			
2. 1. 1 強心剤	注射	採用	イノバン注0. 3%シリンジ	0. 3%50mL1	ドバミン塩酸塩		劇	
2. 1. 1 強心剤	注射	採用	エホチール注10mg	1%1mL1管	エチレフリン塩酸塩		劇	
2. 1. 1 強心剤	内服	院外	ジゴシン散0. 1%	0. 1%1g	ジゴキシ		劇	ジギタリス
2. 1. 1 強心剤	注射	採用	ジゴシン注0. 25mg	0. 025%1mL	ジゴキシ		劇	ジギタリス
2. 1. 1 強心剤	注射	採用	ドバミン塩酸塩点滴静注液600mg「ト	0. 3%200mL	ドバミン塩酸塩	後発	劇	
2. 1. 1 強心剤	注射	採用	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「	0. 3%50mL1	ドブタミン塩酸塩	後発	劇	
2. 1. 1 強心剤	注射	採用	ネオフィリン注250mg	2. 5%10mL1	アミノフィリン水和物			テオフィリン
2. 1. 1 強心剤	内服	採用	ハーフジゴキシシンKY錠0. 125	0. 125mg1錠	ジゴキシ		劇	ジギタリス
2. 1. 1 強心剤	内服	採用	ピモベンダン錠1. 25mg「TE」	1. 25mg1錠	ピモベンダン	後発		
2. 1. 1 強心剤	注射	採用	プロタノールL注0. 2mg	0. 02%1mL1	l-イソプレナリン塩酸塩		劇	不整脈用剤
2. 1. 1 強心剤	注射	採用	ミルリノン静注液10mg「NIG」	10mg10mL1	ミルリノン	後発	劇	
2. 1. 1 強心剤	内服	採用	メチルジゴキシシン錠0. 1mg「NIG」	0. 1mg1錠	メチルジゴキシ	後発	劇	ジギタリス
2. 1. 2 不整脈用剤	内服	採用	アスペノンカプセル10	10mg1カプセル	アブリンジン塩酸塩		劇	不整脈用剤
2. 1. 2 不整脈用剤	注射	採用	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE	150mg3mL1	アミオダロン塩酸塩	後発	劇	不整脈用剤
2. 1. 2 不整脈用剤	内服	採用	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「	100mg1錠	アミオダロン塩酸塩		毒	不整脈用剤
2. 1. 2 不整脈用剤	内服	採用	アロチノロール塩酸塩錠10mg「DS	10mg1錠	アロチノロール塩酸塩			不整脈用剤
2. 1. 2 不整脈用剤	内服	採用	インデルール錠10mg	10mg1錠	プロプラノロール塩酸塩		劇	不整脈用剤
2. 1. 2 不整脈用剤	注射	採用	インデルール注射液2mg	0. 1%2mL1管	プロプラノロール塩酸塩		劇	不整脈用剤
2. 1. 2 不整脈用剤	注射	採用	コアベータ静注用12. 5mg	12. 5mg1瓶	ランジオロール塩酸塩		劇	不整脈用剤
2. 1. 2 不整脈用剤	注射	採用	サンリズム注射液50	50mg5mL1管	ピルシカイニド塩酸塩水和物		劇	不整脈用剤
2. 1. 2 不整脈用剤	内服	採用	ジソピラミド徐放錠150mg「VTRS」	150mg1錠	ジソピラミドリ	後発	劇	不整脈用剤
2. 1. 2 不整脈用剤	内服	採用	シベノール錠50mg	50mg1錠	シベンズリンコハク酸塩		劇	不整脈用剤
2. 1. 2 不整脈用剤	注射	採用	シベノール静注70mg	70mg5mL1管	シベンズリンコハク酸塩		劇	不整脈用剤
2. 1. 2 不整脈用剤	注射	採用	シンビット静注用50mg	50mg1瓶	ニフェカレント塩酸塩		劇	不整脈用剤
2. 1. 2 不整脈用剤	内服	院外	タンボコール錠50mg	50mg1錠	フレカイニド酢酸塩		劇	不整脈用剤
2. 1. 2 不整脈用剤	注射	採用	タンボコール静注50mg	50mg5mL1管	フレカイニド酢酸塩		劇	不整脈用剤
2. 1. 2 不整脈用剤	内服	採用	テノミン錠50	50mg1錠	アテノロール			不整脈用剤
2. 1. 2 不整脈用剤	内服	採用	ビソプロロールフマル酸塩錠0. 625	0. 625mg1錠	ビソプロロールフマル酸塩			不整脈用剤
2. 1. 2 不整脈用剤	内服	採用	ビソプロロールフマル酸塩錠2. 5mg	2. 5mg1錠	ビソプロロールフマル酸塩	後発		不整脈用剤
2. 1. 2 不整脈用剤	内服	採用	ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「ト	5mg1錠	ビソプロロールフマル酸塩	後発		不整脈用剤

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク
2. 1. 2 不整脈用剤	内服	採用	ピメノールカプセル50mg	50mg1カプセル	ピルメノール塩酸塩水和物		劇	不整脈用剤
2. 1. 2 不整脈用剤	内服	採用	ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg	25mg1カプセル	ビルシカイニド塩酸塩水和物	後発	劇	不整脈用剤
2. 1. 2 不整脈用剤	内服	採用	ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」	50mg1錠	ベプリジル塩酸塩水和物	後発	劇	不整脈用剤
2. 1. 2 不整脈用剤	内服	採用	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「	50mg1カプセル	メキシレチン塩酸塩	後発	劇	不整脈用剤
2. 1. 2 不整脈用剤	注射	採用	ランジオロール塩酸塩点滴静注用15	150mg1瓶	ランジオロール塩酸塩	後発	劇	不整脈用剤
2. 1. 2 不整脈用剤	注射	採用	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ	2%5mL1筒	リドカイン塩酸塩		劇	不整脈用剤
2. 1. 2 不整脈用剤	注射	採用	ワソラン静注5mg	0. 25%2mL1	ベラパミル塩酸塩		劇	不整脈用剤
2. 1. 3 利尿剤	内服	採用	アゾセミド錠30mg「JG」	30mg1錠	アゾセミド			
2. 1. 3 利尿剤	内服	採用	アゾセミド錠60mg「JG」	60mg1錠	アゾセミド	後発		
2. 1. 3 利尿剤	内服	採用	イソソルビド内服ゼリー70%分包30	70%30g1個	イソソルビド			
2. 1. 3 利尿剤	内服	採用	イソソルビド内用液70%「CEO」	70%1mL	イソソルビド			
2. 1. 3 利尿剤	注射	採用	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サ	200mg1瓶	カンレノ酸カリウム	後発	劇	
2. 1. 3 利尿剤	内服	限定	サムスカOD錠15mg	15mg1錠	トルバプタン		劇	
2. 1. 3 利尿剤	内服	限定	サムスカOD錠7. 5mg	7. 5mg1錠	トルバプタン		劇	
2. 1. 3 利尿剤	注射	採用	サムタス点滴静注用8mg	8mg1瓶	トルバプタンリン酸エステルナトリウム		劇	
2. 1. 3 利尿剤	内服	採用	スピロラクトン錠25mg「NP」	25mg1錠	スピロラクトン	後発		
2. 1. 3 利尿剤	内服	採用	ダイアモックス錠250mg	250mg1錠	アセタゾラミド			抗てんかん
2. 1. 3 利尿剤	注射	採用	ダイアモックス注射用500mg	500mg1瓶	アセタゾラミドナトリウム			抗てんかん
2. 1. 3 利尿剤	内服	採用	トラセミドOD錠4mg「TE」	4mg1錠	トラセミド	後発		
2. 1. 3 利尿剤	内服	採用	トリクロルメチアジド錠2mg「NIG」	2mg1錠	トリクロルメチアジド	後発		
2. 1. 3 利尿剤	内服	採用	トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」	15mg1錠	トルバプタン	後発	劇	
2. 1. 3 利尿剤	内服	採用	トルバプタンOD錠7. 5mg「オーツカ	7. 5mg1錠	トルバプタン	後発	劇	
2. 1. 3 利尿剤	内服	採用	フロセミド錠10mg「NP」	10mg1錠	フロセミド	後発		
2. 1. 3 利尿剤	内服	採用	フロセミド錠20mg「NP」	20mg1錠	フロセミド	後発		
2. 1. 3 利尿剤	内服	採用	フロセミド錠40mg「NP」	40mg1錠	フロセミド	後発		
2. 1. 3 利尿剤	注射	採用	フロセミド注20mg「NIG」	20mg1管	フロセミド	後発		
2. 1. 4 血圧降下剤	内服	院外	アジルサルタンOD錠10mg「ケミファ	10mg1錠	アジルサルタン	後発		
2. 1. 4 血圧降下剤	内服	採用	アジルサルタンOD錠20mg「ケミファ	20mg1錠	アジルサルタン	後発		
2. 1. 4 血圧降下剤	内服	採用	アゼルニジピン錠16mg「日医工」	16mg1錠	アゼルニジピン	後発		
2. 1. 4 血圧降下剤	内服	院外	アテディオ配合錠	1錠	バルサルタン・シルニジピン配合剤			
2. 1. 4 血圧降下剤	内服	採用	アムバロ配合錠「トーワ」	1錠	バルサルタン・アムロジピン	後発	劇	
2. 1. 4 血圧降下剤	内服	院外	アルドメット錠125	125mg1錠	メチルドパ水和物			
2. 1. 4 血圧降下剤	内服	採用	イミダプリル塩酸塩錠5mg「DSEP」	5mg1錠	イミダプリル塩酸塩	後発		
2. 1. 4 血圧降下剤	内服	採用	イルベサルタン配合錠HD「ケミファ」	1錠	イルベサルタン・アムロジピン	後発	劇	
2. 1. 4 血圧降下剤	内服	院外	イルベサルタン配合錠LD「ケミファ」	1錠	イルベサルタン・アムロジピン	後発	劇	
2. 1. 4 血圧降下剤	内服	院外	イルトラ配合錠HD	1錠	イルベサルタン・トリクロルメチアジド配合剤			
2. 1. 4 血圧降下剤	内服	院外	イルトラ配合錠LD	1錠	イルベサルタン・トリクロルメチアジド配合剤			
2. 1. 4 血圧降下剤	内服	院外	イルベサルタン錠100mg「トーワ」	100mg1錠	イルベサルタン	後発		
2. 1. 4 血圧降下剤	内服	採用	イルベサルタン錠50mg「トーワ」	50mg1錠	イルベサルタン	後発		
2. 1. 4 血圧降下剤	内服	院外	エナラプリルマレイン酸塩細粒1%「	1%1g	エナラプリルマレイン酸塩	後発		
2. 1. 4 血圧降下剤	内服	採用	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「オ	5mg1錠	エナラプリルマレイン酸塩			
2. 1. 4 血圧降下剤	内服	採用	エブランチルカプセル15mg	15mg1カプセル	ウラビジル			
2. 1. 4 血圧降下剤	内服	採用	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	20mg1錠	オルメサルタン メドキシ	後発		
2. 1. 4 血圧降下剤	内服	院外	カデチア配合錠HD「あすか」	1錠	カンデサルタン シレキセ	後発		
2. 1. 4 血圧降下剤	内服	院外	カムシア配合錠HD「あすか」	1錠	カンデサルタン シレキセ	後発	劇	
2. 1. 4 血圧降下剤	内服	採用	カルデナリンOD錠2mg	2mg1錠	ドキシザシンメシル酸塩			
2. 1. 4 血圧降下剤	内服	採用	カルベジロール錠10mg「トーワ」	10mg1錠	カルベジロール	後発		不整脈用剤
2. 1. 4 血圧降下剤	内服	採用	カルベジロール錠2. 5mg「トーワ」	2. 5mg1錠	カルベジロール			不整脈用剤
2. 1. 4 血圧降下剤	内服	採用	カンデサルタンOD錠8mg「サワイ」	8mg1錠	カンデサルタン シレキセ	後発		
2. 1. 4 血圧降下剤	内服	採用	シルニジピン錠10mg「サワイ」	10mg1錠	シルニジピン	後発		
2. 1. 4 血圧降下剤	内服	採用	ジルムロ配合錠HD「武田テバ」	1錠	アジルサルタン・アムロジ	後発	劇	

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク
2. 1. 4 血圧降下剤	内服	院外	ジルムロ配合錠LD「武田テバ」	1錠	アジルサルタン・アムロジ	後発	劇	
2. 1. 4 血圧降下剤	内服	院外	セララ錠25mg	25mg1錠	エブレレノン			
2. 1. 4 血圧降下剤	内服	採用	セララ錠50mg	50mg1錠	エブレレノン			
2. 1. 4 血圧降下剤	内服	採用	テラムロ配合錠AP「トーワ」	1錠	テルミサルタン・アムロジ	後発	劇	
2. 1. 4 血圧降下剤	内服	院外	テラムロ配合錠BP「トーワ」	1錠	テルミサルタン・アムロジ	後発	劇	
2. 1. 4 血圧降下剤	内服	院外	テルチア配合錠AP「DSEP」	1錠	テルミサルタン・ヒドロクロ	後発		
2. 1. 4 血圧降下剤	内服	院外	テルチア配合錠BP「DSEP」	1錠	テルミサルタン・ヒドロクロ	後発		
2. 1. 4 血圧降下剤	内服	採用	テルミサルタン錠40mg「ケミファ」	40mg1錠	テルミサルタン	後発		
2. 1. 4 血圧降下剤	内服	採用	ナトリックス錠1	1mg1錠	インダパミド			
2. 1. 4 血圧降下剤	注射	採用	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「E	10mg10mL1	ニカルジピン塩酸塩		劇	
2. 1. 4 血圧降下剤	注射	採用	ニトプロ持続静注液6mg	6mg2mL1管	ニトプロシドナトリウム水和物		毒	
2. 1. 4 血圧降下剤	内服	採用	バルサルタン錠80mg「ケミファ」	80mg1錠	バルサルタン	後発		
2. 1. 4 血圧降下剤	外用	採用	ビソノテープ2mg	2mg1枚	ビソプロロール			不整脈用薬
2. 1. 4 血圧降下剤	外用	採用	ビソノテープ4mg	4mg1枚	ビソプロロール			不整脈用薬
2. 1. 4 血圧降下剤	外用	採用	ビソノテープ8mg	8mg1枚	ビソプロロール			不整脈用薬
2. 1. 4 血圧降下剤	内服	院外	プレミネント配合錠HD	1錠	ロサルタンカリウム・ヒドロクロチアジド配合剤			
2. 1. 4 血圧降下剤	内服	院外	プレミネント配合錠LD	1錠	ロサルタンカリウム・ヒドロクロチアジド配合剤			
2. 1. 4 血圧降下剤	内服	限定	ペルジピン錠10mg	10mg1錠	ニカルジピン塩酸塩			
2. 1. 4 血圧降下剤	内服	院外	ミカトリオ配合錠	1錠	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸	劇		
2. 1. 4 血圧降下剤	内服	院外	ミネブロOD錠1. 25mg	1. 25mg1錠	エサキセレノン			
2. 1. 4 血圧降下剤	内服	採用	ミネブロOD錠2. 5mg	2. 5mg1錠	エサキセレノン			
2. 1. 4 血圧降下剤	内服	院外	ミネブロOD錠5mg	5mg1錠	エサキセレノン			
2. 1. 4 血圧降下剤	内服	院外	ラジレス錠150mg	150mg1錠	アリスキレンフマル酸塩			
2. 1. 4 血圧降下剤	内服	院外	レザルタス配合錠HD	1錠	オルメサルタン メドキシミル・アゼルニジピン配合剤			
2. 1. 4 血圧降下剤	内服	採用	ロサルタンK錠50mg「VTRS」	50mg1錠	ロサルタンカリウム	後発		
2. 1. 4 血圧降下剤	内服	院外	ロンゲス錠10mg	10mg1錠	リシノプリル水和物			
2. 1. 4 血圧降下剤	内服	院外	ロンゲス錠5mg	5mg1錠	リシノプリル水和物			
2. 1. 6 血管収縮剤	内服	採用	イミグラン錠50	50mg1錠	スマトリプタンコハク酸塩		劇	
2. 1. 6 血管収縮剤	外用	外＋限	イミグラン点鼻液20	20mg0. 1mL	スマトリプタン		劇	
2. 1. 6 血管収縮剤	注射	採用	ネオシネジンコーワ注1mg	0. 1%1mL1管	フェニレフリン塩酸塩		劇	不整脈用薬
2. 1. 6 血管収縮剤	内服	採用	マクサルトRPD錠10mg	10mg1錠	リザトリプタン安息香酸塩		劇	
2. 1. 6 血管収縮剤	内服	採用	ミドドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」	2mg1錠	ミドドリン塩酸塩	後発		
2. 1. 7 血管拡張剤	内服	採用	アムロジピンOD錠2. 5mg「明治」	2. 5mg1錠	アムロジピンベシル酸塩		劇	
2. 1. 7 血管拡張剤	内服	採用	アムロジピンOD錠5mg「明治」	5mg1錠	アムロジピンベシル酸塩		劇	
2. 1. 7 血管拡張剤	内服	採用	一硝酸イソソルビド錠20mg「トーワ」	20mg1錠	一硝酸イソソルビド			
2. 1. 7 血管拡張剤	内服	採用	コメリアンコーワ錠100	100mg1錠	ジラゼブ塩酸塩水和物			
2. 1. 7 血管拡張剤	内服	採用	コメリアンコーワ錠50	50mg1錠	ジラゼブ塩酸塩水和物			
2. 1. 7 血管拡張剤	内服	院外	ジピリダモール散12. 5%「JG」	12. 5%1g	ジピリダモール	後発		
2. 1. 7 血管拡張剤	内服	採用	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100	100mg1カプセ	ジルチアゼム塩酸塩	後発		
2. 1. 7 血管拡張剤	注射	採用	ジルチアゼム塩酸塩注射液50mg「	50mg1瓶	ジルチアゼム塩酸塩	後発	劇	不整脈用薬
2. 1. 7 血管拡張剤	内服	採用	ニコランジル錠5mg「トーワ」	5mg1錠	ニコランジル			
2. 1. 7 血管拡張剤	注射	採用	ニコランジル点滴静注用2mg「サワ	2mg1瓶	ニコランジル	後発		
2. 1. 7 血管拡張剤	注射	採用	ニコランジル点滴静注用48mg「サワ	48mg1瓶	ニコランジル	後発		
2. 1. 7 血管拡張剤	注射	採用	ニトログリセリン静注25mg／50mL	25mg50mL1	ニトログリセリン	後発	劇	
2. 1. 7 血管拡張剤	内服	採用	ニトロペン舌下錠0. 3mg	0. 3mg1錠	ニトログリセリン	後発	劇	
2. 1. 7 血管拡張剤	注射	採用	ニトロール注5mgシリンジ	5mg10mL1筒	硝酸イソソルビド			
2. 1. 7 血管拡張剤	注射	採用	ニトロール点滴静注100mg／バッグ	0. 05%200m	硝酸イソソルビド			
2. 1. 7 血管拡張剤	内服	採用	ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」	20mg1錠	ニフェジピン		劇	
2. 1. 7 血管拡張剤	注射	採用	ハンプ注射用1000	1000μg1瓶	カルベリチド(遺伝子組換え)		劇	
2. 1. 7 血管拡張剤	外用	採用	フランドルテープ40mg	40mg1枚	硝酸イソソルビド			
2. 1. 7 血管拡張剤	内服	採用	ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	4mg1錠	ベニジピン塩酸塩	後発	劇	

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク
2. 1. 7 血管拡張剤	内服	採用	ペルサンチン錠25mg	25mg1錠	ジピリダモール			血液凝固阻
2. 1. 7 血管拡張剤	外用	採用	ミオコールスプレー0. 3mg	0. 65%7. 2g	ニトログリセリン		劇	
2. 1. 7 血管拡張剤	内服	採用	ワソラン錠40mg	40mg1錠	ベラパミル塩酸塩			不整脈用
2. 1. 8 高脂血症用剤	内服	院外	アトーゼット配合錠HD	1錠	エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤			
2. 1. 8 高脂血症用剤	内服	院外	アトーゼット配合錠LD	1錠	エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤			
2. 1. 8 高脂血症用剤	内服	採用	アトルバスタチン錠10mg「サワイ」	10mg1錠	アトルバスタチンカルシウム	後発		
2. 1. 8 高脂血症用剤	内服	採用	エゼチミブOD錠10mg「トーワ」	10mg1錠	エゼチミブ	後発		
2. 1. 8 高脂血症用剤	内服	採用	エパデールEMカプセル2g	2g1包	イコサペント酸エチル			
2. 1. 8 高脂血症用剤	内服	採用	オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル	2g1包	オメガー3脂肪酸エチル	後発		
2. 1. 8 高脂血症用剤	内服	院外	シンバスタチン錠5mg「YD」	5mg1錠	シンバスタチン			
2. 1. 8 高脂血症用剤	内服	採用	ネクセトール錠180mg	180mg1錠	ベムベド酸			
2. 1. 8 高脂血症用剤	内服	採用	パルモディアXR錠0. 2mg	0. 2mg1錠	ペマフィブラート			
2. 1. 8 高脂血症用剤	内服	院外	パルモディアXR錠0. 4mg	0. 4mg1錠	ペマフィブラート			
2. 1. 8 高脂血症用剤	内服	採用	ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」	2mg1錠	ピタバスタチンカルシウム	後発		
2. 1. 8 高脂血症用剤	内服	採用	プラバスタチンNa錠10mg「Me」	10mg1錠	プラバスタチンナトリウム	後発		
2. 1. 8 高脂血症用剤	内服	採用	リバゼブ配合錠HD	1錠	ピタバスタチンカルシウム水和物・エゼチミブ配合剤			
2. 1. 8 高脂血症用剤	内服	院外	リバゼブ配合錠LD	1錠	ピタバスタチンカルシウム水和物・エゼチミブ配合剤			
2. 1. 8 高脂血症用剤	内服	採用	リピディル錠80mg	80mg1錠	フェノフィブラート			
2. 1. 8 高脂血症用剤	注射	採用	レクビオ皮下注300mgシリンジ	300mg1. 5m	インクリシランナトリウム			
2. 1. 8 高脂血症用剤	注射	自注	レパーサ皮下注140mgペン	140mg1mL1	エボロクマブ(遺伝子組換え)			
2. 1. 8 高脂血症用剤	内服	院外	ロスーゼット配合錠HD	1錠	エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤			
2. 1. 8 高脂血症用剤	内服	院外	ロスーゼット配合錠LD	1錠	エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤			
2. 1. 8 高脂血症用剤	内服	採用	ロスバスタチンOD錠2. 5mg「ケミフ」	2. 5mg1錠	ロスバスタチンカルシウム	後発		
2. 1. 8 高脂血症用剤	内服	採用	ロスバスタチンOD錠5mg「ケミファ」	5mg1錠	ロスバスタチンカルシウム	後発		
2. 1. 9 その他の循環器官用薬	内服	採用	アマルエット配合錠4番「トーワ」	1錠	アムロジピンベシル酸塩	後発	劇	
2. 1. 9 その他の循環器官用薬	注射	採用	アルガトロバンHI注10mg/2mL「フ」	10mg2mL1管	アルガトロバン水和物	後発		
2. 1. 9 その他の循環器官用薬	注射	採用	アルプロスタジルアルファデクス注射	20μg1瓶	アルプロスタジル アルブ	後発	劇	
2. 1. 9 その他の循環器官用薬	注射	採用	アルプロスタジル注10μgシリンジ「フ」	10μg2mL1管	アルプロスタジル	後発	劇	
2. 1. 9 その他の循環器官用薬	内服	採用	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「フ」	20mg1錠	イフェンプロジル酒石酸塩			
2. 1. 9 その他の循環器官用薬	内服	採用	エンレスト錠100mg	100mg1錠	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物			
2. 1. 9 その他の循環器官用薬	内服	採用	エンレスト錠200mg	200mg1錠	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物			
2. 1. 9 その他の循環器官用薬	内服	採用	エンレスト錠50mg	50mg1錠	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物			
2. 1. 9 その他の循環器官用薬	内服	院外	オプスミット錠10mg	10mg1錠	マシテンタン		劇	
2. 1. 9 その他の循環器官用薬	内服	採用	カリメート経口液20%	20%25g1包	ボリスチレンスルホン酸カルシウム			
2. 1. 9 その他の循環器官用薬	内服	外+限	カリメート散	1g	ボリスチレンスルホン酸カルシウム			
2. 1. 9 その他の循環器官用薬	内服	採用	キックリンカプセル250mg	250mg1カプセ	ビキサロマー			
2. 1. 9 その他の循環器官用薬	注射	採用	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	200mL1袋	濃グリセリン・果糖			
2. 1. 9 その他の循環器官用薬	内服	採用	ケレンディア錠10mg	10mg1錠	フィネレノン			
2. 1. 9 その他の循環器官用薬	内服	採用	ケレンディア錠20mg	20mg1錠	フィネレノン			
2. 1. 9 その他の循環器官用薬	内服	採用	コラン錠2. 5mg	2. 5mg1錠	イバブラジン塩酸塩		劇	
2. 1. 9 その他の循環器官用薬	内服	採用	コラン錠5mg	5mg1錠	イバブラジン塩酸塩		劇	
2. 1. 9 その他の循環器官用薬	内服	院外	コラン錠7. 5mg	7. 5mg1錠	イバブラジン塩酸塩		劇	
2. 1. 9 その他の循環器官用薬	内服	外+限	タダラフィル錠20mgAD「TE」	20mg1錠	タダラフィル	後発		
2. 1. 9 その他の循環器官用薬	内服	採用	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	500mg1錠	沈降炭酸カルシウム	後発		
2. 1. 9 その他の循環器官用薬	内服	採用	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル	100mg1カプセ	トコフェロールニコチン酸	後発		
2. 1. 9 その他の循環器官用薬	注射	採用	ニコリンH注射液0. 5g	25%2mL1管	シチコリン			
2. 1. 9 その他の循環器官用薬	内服	採用	ニセルゴリン錠5mg「トーワ」	5mg1錠	ニセルゴリン	後発		
2. 1. 9 その他の循環器官用薬	注射	採用	ビヴラッツ点滴静注液150mg	150mg6mL1	クラゾセンタンナトリウム		劇	
2. 1. 9 その他の循環器官用薬	内服	採用	ビートルチュアブル錠250mg	250mg1錠	スクロオキシ水酸化鉄			
2. 1. 9 その他の循環器官用薬	内服	院外	ビートルチュアブル錠500mg	500mg1錠	スクロオキシ水酸化鉄			
2. 1. 9 その他の循環器官用薬	内服	採用	ビルタサ懸濁用散分8. 4g	8. 4g1包	パチロマーソルビテクスカルシウム			

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク
2. 1. 9 その他の循環器官用薬	注射	採用	ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg	30. 8mg2mL	ファスジル塩酸塩水和物	後発	劇	
2. 1. 9 その他の循環器官用薬	内服	採用	フォスブロッグ錠250mg	250mg1錠	セベラマー塩酸塩			
2. 1. 9 その他の循環器官用薬	内服	採用	フォゼベル錠10mg	10mg1錠	テナパノル塩酸塩			
2. 1. 9 その他の循環器官用薬	内服	採用	フォゼベル錠20mg	20mg1錠	テナパノル塩酸塩			
2. 1. 9 その他の循環器官用薬	内服	採用	フォゼベル錠30mg	30mg1錠	テナパノル塩酸塩			
2. 1. 9 その他の循環器官用薬	内服	採用	フォゼベル錠5mg	5mg1錠	テナパノル塩酸塩			
2. 1. 9 その他の循環器官用薬	内服	採用	ベリキューボ錠10mg	10mg1錠	ベルイシグアト			
2. 1. 9 その他の循環器官用薬	内服	採用	ベリキューボ錠2. 5mg	2. 5mg1錠	ベルイシグアト			
2. 1. 9 その他の循環器官用薬	内服	院外	ベリキューボ錠5mg	5mg1錠	ベルイシグアト			
2. 1. 9 その他の循環器官用薬	内服	採用	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリ	20%25g1個	ポリスチレンスルホン酸カルシウム			
2. 1. 9 その他の循環器官用薬	内服	院外	ミグシス錠5mg	5mg1錠	ロメリジン塩酸塩			
2. 1. 9 その他の循環器官用薬	内服	採用	リオナ錠250mg	250mg1錠	クエン酸第二鉄水和物			
2. 1. 9 その他の循環器官用薬	内服	採用	リズミック錠10mg	10mg1錠	アメジニウムメチル硫酸塩			
2. 1. 9 その他の循環器官用薬	内服	採用	ロケルマ懸濁用散分包10g	10g1包	ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物			
2. 1. 9 その他の循環器官用薬	内服	採用	ロケルマ懸濁用散分包5g	5g1包	ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物			
2. 2. 1 呼吸促進剤	注射	採用	ナロキソン塩酸塩静注0. 2mg「AFF	0. 2mg1mL1	ナロキソン塩酸塩		劇	
2. 2. 1 呼吸促進剤	注射	採用	フルマゼニル静注液0. 5mg「テバ」	0. 5mg5mL1	フルマゼニル	後発	劇	
2. 2. 2 鎮咳剤	注射	採用	エフェドリン「ナガキ」注射液40mg	4%1mL1管	エフェドリン塩酸塩		劇	
2. 2. 2 鎮咳剤	内服	採用	デキストロメトルファン臭化水素酸塩	15mg1錠	デキストロメトルファン臭	後発		
2. 2. 2 鎮咳剤	内服	採用	ムコプロチン配合シロップ	1mL	鎮咳配合剤	後発		
2. 2. 3 去たん剤	内服	採用	アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「サ	15mg1錠	アンブロキシソール塩酸塩	後発		
2. 2. 3 去たん剤	内服	採用	カルボシステインDS50%「トーワ」	50%1g	Ｌーカルボシステイン			
2. 2. 3 去たん剤	内服	採用	カルボシステイン錠250mg「サワイ	250mg1錠	Ｌーカルボシステイン			
2. 2. 3 去たん剤	内服	院外	クリアナール錠200mg	200mg1錠	フドステイン			
2. 2. 3 去たん剤	内服	採用	小児用ムコソルバンDS1. 5%	1. 5%1g	アンブロキシソール塩酸塩			
2. 2. 3 去たん剤	内服	採用	セネガシロップ「メタル」	10mL	セネガ			
2. 2. 3 去たん剤	外用	採用	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0. 2%	0. 2%1mL	ブロムヘキシン塩酸塩	後発		
2. 2. 3 去たん剤	注射	採用	ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「	0. 2%2mL1管	ブロムヘキシン塩酸塩	後発		
2. 2. 3 去たん剤	外用	採用	ムコフィリン吸入液20%	17. 62%2mL	アセチルシステイン			
2. 2. 4 鎮咳去たん剤	内服	採用	アスベリン散10%	10%1g	チペピジンヒベンズ酸塩			
2. 2. 4 鎮咳去たん剤	内服	採用	アスベリン錠20	20mg1錠	チペピジンヒベンズ酸塩			
2. 2. 4 鎮咳去たん剤	内服	採用	コデインリン酸塩散1%「メタル」	1%1g	コデインリン酸塩水和物		劇	
2. 2. 4 鎮咳去たん剤	内服	採用	メジコン配合シロップ	10mL	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物・クレゾールスル			
2. 2. 4 鎮咳去たん剤	内服	採用	レスブレン錠30mg	30mg1錠	エブラジノン塩酸塩			
2. 2. 5 気管支拡張剤	外用	採用	アスブール液(0. 5%)	0. 5%1mL	dl-イソプレナリン塩酸塩			
2. 2. 5 気管支拡張剤	外用	院外	アノーロエリプタ30吸入用	30吸入1キット	ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩			
2. 2. 5 気管支拡張剤	外用	採用	アレバール吸入用溶解液0. 125%	0. 125%1mL	チロキサポール			
2. 2. 5 気管支拡張剤	外用	採用	ウルティプロ吸入用カプセル	1カプセル	インダカテロールマレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物			
2. 2. 5 気管支拡張剤	外用	院外	オンブレス吸入用カプセル150μg	150μg1カプセル	インダカテロールマレイン酸塩			
2. 2. 5 気管支拡張剤	外用	院外	キューバール100エアゾール	15mg8. 7g1冊	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル			
2. 2. 5 気管支拡張剤	外用	採用	クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ	1%2mL1管	クロモグリク酸ナトリウム			
2. 2. 5 気管支拡張剤	外用	採用	サルタノールインヘラー100μg	0. 16%13. 5r	サルブタモール硫酸塩			
2. 2. 5 気管支拡張剤	外用	採用	スピオルトレスピマツ60吸入	60吸入1キット	チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩			
2. 2. 5 気管支拡張剤	外用	採用	スピリーバ2. 5μgレスピマツ60吸	150μg1キット	チオトロピウム臭化物水和物			
2. 2. 5 気管支拡張剤	外用	院外	スピリーバ吸入用カプセル18μg	18μg1カプセル	チオトロピウム臭化物水和物			
2. 2. 5 気管支拡張剤	内服	院外	スピロベント錠10μg	10μg1錠	クレンブテロール塩酸塩			
2. 2. 5 気管支拡張剤	外用	院外	セレベント50ディスカス	50μg60ブリス	サルメテロールキシナホ酸塩			
2. 2. 5 気管支拡張剤	外用	採用	ツロブテロールテープ0. 5mg「久光	0. 5mg1枚	ツロブテロール	後発		
2. 2. 5 気管支拡張剤	外用	採用	ツロブテロールテープ1mg「久光」	1mg1枚	ツロブテロール	後発		
2. 2. 5 気管支拡張剤	外用	採用	ツロブテロールテープ2mg「久光」	2mg1枚	ツロブテロール	後発		
2. 2. 5 気管支拡張剤	内服	採用	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ	100mg1錠	テオフィリン			テオフィリン

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク
2. 2. 5 気管支拡張剤	外用	採用	ベネトリン吸入液0. 5%	0. 5%1mL	サルブタモール硫酸塩			
2. 2. 5 気管支拡張剤	外用	院外	ベロテックエロゾル100	20mg10mL1	フェノテロール臭化水素酸塩			
2. 2. 5 気管支拡張剤	外用	採用	メブチンエア―10μg吸入100回	0. 0143%5m	ブロカテロール塩酸塩水和物			
2. 2. 5 気管支拡張剤	外用	採用	メブチン吸入液ユニット0. 3mL	0. 01%0. 3m	ブロカテロール塩酸塩水和物			
2. 2. 5 気管支拡張剤	内服	採用	メブチンミニ錠25μg	0. 025mg1錠	ブロカテロール塩酸塩水和物			
2. 2. 6 含嗽剤	外用	採用	アズノールうがい液4%	4%1mL	アズレンスルホン酸ナトリウム後発			
2. 2. 6 含嗽剤	外用	採用	ポビドンヨードガーグル液7%「明治」	7%1mL	ポビドンヨード			
2. 2. 9 その他の呼吸器官用薬	外用	院外	アドエア100ディスカス60吸入用	60ブリスター1	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル			
2. 2. 9 その他の呼吸器官用薬	外用	採用	アドエア250エアゾール120吸入用	12. 0g1瓶	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル			
2. 2. 9 その他の呼吸器官用薬	外用	院外	アドエア250ディスカス60吸入用	60ブリスター1	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル			
2. 2. 9 その他の呼吸器官用薬	外用	院外	アドエア500ディスカス60吸入用	60ブリスター1	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル			
2. 2. 9 その他の呼吸器官用薬	外用	院外	アドエア50エアゾール120吸入用	12. 0g1瓶	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル			
2. 2. 9 その他の呼吸器官用薬	外用	院外	アニユイティ100μgエリプタ30吸入	30吸入1キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル			
2. 2. 9 その他の呼吸器官用薬	外用	院外	アニユイティ200μgエリプタ30吸入	30吸入1キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル			
2. 2. 9 その他の呼吸器官用薬	注射	採用	エキシデンサー皮下注100mgペン	100mg1mL1	デベモキマブ(遺伝子組換え)	劇		
2. 2. 9 その他の呼吸器官用薬	外用	院外	エナジア吸入用カプセル高用量	1カプセル	インダカテロール酢酸塩・グリコピロニウム臭化物・モメタゾン			
2. 2. 9 その他の呼吸器官用薬	外用	院外	エナジア吸入用カプセル中用量	1カプセル	インダカテロール酢酸塩・グリコピロニウム臭化物・モメタゾン			
2. 2. 9 その他の呼吸器官用薬	外用	院外	オルベスコ100μgインヘラー56吸	5. 6mg3. 3g1	シクレソニド			
2. 2. 9 その他の呼吸器官用薬	外用	採用	オルベスコ200μgインヘラー56吸	11. 2mg3. 3g	シクレソニド			
2. 2. 9 その他の呼吸器官用薬	外用	採用	シムビコートタービューヘラー60吸入	60吸入1キット	ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物			
2. 2. 9 その他の呼吸器官用薬	注射 自注	採用	ゾレア皮下注150mgペン	150mg1mL1	オマリズマブ(遺伝子組換え)	劇		
2. 2. 9 その他の呼吸器官用薬	注射 自注	採用	ゾレア皮下注300mgペン	300mg2mL1	オマリズマブ(遺伝子組換え)	劇		
2. 2. 9 その他の呼吸器官用薬	外用	採用	テリルジー100エリプタ30吸入用	30吸入1キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物			
2. 2. 9 その他の呼吸器官用薬	外用	採用	テリルジー200エリプタ30吸入用	30吸入1キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物			
2. 2. 9 その他の呼吸器官用薬	外用	採用	パルミコート200μgタービューヘラー	22. 4mg1瓶(4	ブデソニド			
2. 2. 9 その他の呼吸器官用薬	外用	採用	パルミコート吸入液0. 25mg	0. 25mg2mL	ブデソニド			
2. 2. 9 その他の呼吸器官用薬	外用	採用	ビレーズトリエアロスフィア120吸入	120吸入1キッ	ブデソニド・グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸塩			
2. 2. 9 その他の呼吸器官用薬	外用	院外	フルタイド100ディスカス	100μg60ブリ	フルチカゾンプロピオン酸エステル			
2. 2. 9 その他の呼吸器官用薬	外用	外+限	フルタイド50μgエアゾール120吸入	8. 83mg10. 6	フルチカゾンプロピオン酸エステル			
2. 2. 9 その他の呼吸器官用薬	外用	採用	フルティフォーム125エアゾール120吸入	120吸入1瓶	フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩			
2. 2. 9 その他の呼吸器官用薬	外用	採用	レルベア100エリプタ30吸入用	30吸入1キット	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル			
2. 2. 9 その他の呼吸器官用薬	外用	採用	レルベア200エリプタ30吸入用	30吸入1キット	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル			
2. 3. 1 止しゃ剤, 整腸剤	内服	採用	ガスコン錠40mg	40mg1錠	ジメチコン			
2. 3. 1 止しゃ剤, 整腸剤	内服	採用	ガスコンドロップ内用液2%	2%1mL	ジメチコン			
2. 3. 1 止しゃ剤, 整腸剤	内服	採用	タンニン酸アルブミン「ケンエー」	1g	タンニン酸アルブミン			
2. 3. 1 止しゃ剤, 整腸剤	内服	採用	ビオフェルミンR散	1g	耐性乳酸菌製剤	後発		
2. 3. 1 止しゃ剤, 整腸剤	内服	採用	ミヤBM錠	1錠	酪酸菌製剤			
2. 3. 1 止しゃ剤, 整腸剤	内服	採用	薬用炭	1g	薬用炭			
2. 3. 1 止しゃ剤, 整腸剤	内服	採用	ラックビー微粒N	1%1g	ビフィズス菌製剤			
2. 3. 1 止しゃ剤, 整腸剤	内服	採用	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」	1mg1カプセル	ロペラミド塩酸塩	後発		
2. 3. 2 消化性潰瘍用剤	内服	院外	アルサルミン細粒90%	90%1g	スクラルファート水和物			
2. 3. 2 消化性潰瘍用剤	内服	採用	アルロイドG内用液5%	10mL	アルギン酸ナトリウム			
2. 3. 2 消化性潰瘍用剤	内服	採用	エソメプラゾールカプセル20mg「トー	20mg1カプセル	エソメプラゾールマグネシウム塩	後発		
2. 3. 2 消化性潰瘍用剤	内服	院外	サイトテック錠200	200μg1錠	ミソプロストール		劇	
2. 3. 2 消化性潰瘍用剤	内服	採用	スルピリド錠50mg「サワイ」	50mg1錠	スルピリド	後発		精神神経系
2. 3. 2 消化性潰瘍用剤	内服	採用	タケキャブ錠10mg	10mg1錠	ボノプラザンフマル酸塩			
2. 3. 2 消化性潰瘍用剤	内服	院外	タケキャブ錠20mg	20mg1錠	ボノプラザンフマル酸塩			
2. 3. 2 消化性潰瘍用剤	注射	採用	タケブロン静注用30mg	30mg1瓶	ランソプラゾール			
2. 3. 2 消化性潰瘍用剤	内服	採用	ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	20mg1包	エソメプラゾールマグネシウム水和物			
2. 3. 2 消化性潰瘍用剤	内服	採用	ファモチジンD錠10mg「サワイ」	10mg1錠	ファモチジン			
2. 3. 2 消化性潰瘍用剤	内服	採用	ファモチジンD錠20mg「サワイ」	20mg1錠	ファモチジン			

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク
2. 3. 2 消化性潰瘍用剤	注射	採用	ファモチジン静注液20mg「日医工」	20mg20mL1	ファモチジン	後発		
2. 3. 2 消化性潰瘍用剤	内服	採用	プロテカジンOD錠10	10mg1錠	ラフチジン			
2. 3. 2 消化性潰瘍用剤	内服	採用	ボラブレジンクOD錠75mg「サワイ」	75mg1錠	ボラブレジンク			
2. 3. 2 消化性潰瘍用剤	内服	採用	マーズレンS配合顆粒	1g	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン			
2. 3. 2 消化性潰瘍用剤	内服	採用	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「タケダ」	10mg1錠	ラベプラゾールナトリウム	後発		
2. 3. 2 消化性潰瘍用剤	内服	院外	ラベプラゾールナトリウム錠5mg「ケミファ」	5mg1錠	ラベプラゾールナトリウム	後発		
2. 3. 2 消化性潰瘍用剤	内服	採用	ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」	15mg1錠	ランソプラゾール	後発		
2. 3. 2 消化性潰瘍用剤	内服	採用	レバミピド錠100mg「オーツカ」	100mg1錠	レバミピド			
2. 3. 3 健胃消化剤	内服	院外	ガランターゼ散50%	50%1g	β-ガラクトシダーゼ(アスペルギルス)			
2. 3. 3 健胃消化剤	内服	採用	つくしA・M配合散	1g	カンゾウ配合剤			
2. 3. 3 健胃消化剤	内服	採用	ベリチーM配合顆粒	1g	脾臓性消化酵素配合剤			
2. 3. 3 健胃消化剤	内服	採用	リパクレオンカプセル150mg	150mg1カプセル	パンクレリパーゼ			
2. 3. 4 制酸剤	内服	採用	重質酸化マグネシウム「ケンエー」	10g	酸化マグネシウム			
2. 3. 4 制酸剤	内服	採用	炭酸水素ナトリウム「ケンエー」	10g	炭酸水素ナトリウム			
2. 3. 4 制酸剤	内服	採用	炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTR」	500mg1錠	炭酸水素ナトリウム	後発		
2. 3. 4 制酸剤	内服	採用	マグミット錠330mg	330mg1錠	酸化マグネシウム	後発		
2. 3. 4 制酸剤	内服	採用	マグミット錠500mg	500mg1錠	酸化マグネシウム	後発		
2. 3. 5 下剤, 浣腸剤	内服	採用	アミティーザカプセル12μg	12μg1カプセル	ルビプロストン			
2. 3. 5 下剤, 浣腸剤	内服	院外	アミティーザカプセル24μg	24μg1カプセル	ルビプロストン			
2. 3. 5 下剤, 浣腸剤	内服	採用	アローゼン顆粒	1g	センナ・センナ実			
2. 3. 5 下剤, 浣腸剤	内服	採用	ゲーフィス錠5mg	5mg1錠	エロピキシバット水和物			
2. 3. 5 下剤, 浣腸剤	外用	採用	グリセリン浣腸「オヲタ」120	50%120mL1	グリセリン			
2. 3. 5 下剤, 浣腸剤	外用	採用	グリセリン浣腸「オヲタ」60	50%60mL1個	グリセリン			
2. 3. 5 下剤, 浣腸剤	外用	採用	グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30	50%30mL1個	グリセリン			
2. 3. 5 下剤, 浣腸剤	外用	採用	グリセリン「ケンエー」	10mL	グリセリン			
2. 3. 5 下剤, 浣腸剤	外用	採用	新レシカルボン坐剤	1個	炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム			
2. 3. 5 下剤, 浣腸剤	内服	採用	スインブロイク錠0. 2mg	0. 2mg1錠	ナルデメジントシル酸塩			
2. 3. 5 下剤, 浣腸剤	内服	採用	センノシド錠12mg「サワイ」	12mg1錠	センノシド	後発		
2. 3. 5 下剤, 浣腸剤	外用	院外	テレミンソフト坐薬10mg	10mg1個	ピサコジル			
2. 3. 5 下剤, 浣腸剤	外用	院外	テレミンソフト坐薬2mg	2mg1個	ピサコジル			
2. 3. 5 下剤, 浣腸剤	内服	院外	ピコスルファートNa錠2. 5mg「サワイ」	2. 5mg1錠	ピコスルファートナトリウム水和物			
2. 3. 5 下剤, 浣腸剤	内服	採用	ピコスルファートNa内用液0. 75%「サワイ」	0. 75%1mL	ピコスルファートナトリウム	後発		
2. 3. 5 下剤, 浣腸剤	内服	採用	モビコール配合内用剤HD	13. 7046g1包	マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カルシウム			
2. 3. 5 下剤, 浣腸剤	内服	院外	モビコール配合内用剤LD	6. 8523g1包	マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カルシウム			
2. 3. 6 利胆剤	内服	採用	ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」	100mg1錠	ウルソデオキシコール酸			
2. 3. 6 利胆剤	内服	採用	スパカール錠40mg	40mg1錠	トレピブトン			
2. 3. 9 その他の消化器官用薬	外用	採用	SPTローチ0. 25mg「明治」	0. 25mg1錠	デカリニウム塩化物	後発		
2. 3. 9 その他の消化器官用薬	内服	採用	アコファイド錠100mg	100mg1錠	アコチアミド塩酸塩水和物			
2. 3. 9 その他の消化器官用薬	外用	院外	アフタッチ口腔用貼付剤25μg	25μg1錠	トリアムシノロンアセトニド			
2. 3. 9 その他の消化器官用薬	内服	採用	アプレビタントカプセル125mg「サワイ」	125mg1カプセル	アプレビタント	後発		
2. 3. 9 その他の消化器官用薬	内服	採用	アプレビタントカプセル80mg「サワイ」	80mg1カプセル	アプレビタント	後発		
2. 3. 9 その他の消化器官用薬	注射	採用	アロカリス点滴静注235mg	235mg10mL	ホスネツピタント塩化物塩酸塩		劇	
2. 3. 9 その他の消化器官用薬	内服	院外	イリボーOD錠2. 5μg	2. 5μg1錠	ラモセトロン塩酸塩		劇	
2. 3. 9 その他の消化器官用薬	内服	院外	イリボーOD錠5μg	5μg1錠	ラモセトロン塩酸塩		劇	
2. 3. 9 その他の消化器官用薬	注射	採用	インフリキシマブBS点滴静注用100mg	100mg1瓶	インフリキシマブ(遺伝子組換え)	後発	劇	免疫抑制剤
2. 3. 9 その他の消化器官用薬	注射	採用	エンタイビオ点滴静注用300mg	300mg1瓶	ベドリズマブ(遺伝子組換え)		劇	
2. 3. 9 その他の消化器官用薬	注射	採用	エンタイビオ皮下注108mgペン	108mg0. 68mL1	ベドリズマブ(遺伝子組換え)		劇	
2. 3. 9 その他の消化器官用薬	注射	採用	オンダンセトロン注4mgシリンジ「マダカ」	4mg2mL1筒	オンダンセトロン塩酸塩	後発	劇	
2. 3. 9 その他の消化器官用薬	内服	院外	カログラ錠120mg	120mg1錠	カロテグラストメチル		劇	
2. 3. 9 その他の消化器官用薬	注射	採用	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg	3mg100mL1	グラニセトロン塩酸塩		劇	
2. 3. 9 その他の消化器官用薬	内服	外+限	グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」	2mg1包	グラニセトロン塩酸塩	後発	劇	

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク
2. 3. 9 その他の消化器官用薬	内服	院外	コレチメント錠9mg	9mg1錠	ブデソニド			免疫抑制薬
2. 3. 9 その他の消化器官用薬	内服	採用	サラジェン顆粒0. 5%	5mg1包	ピロカルピン塩酸塩		劇	
2. 3. 9 その他の消化器官用薬	内服	院外	サリグレンカプセル30mg	30mg1カプセル	セビメリン塩酸塩水和物			
2. 3. 9 その他の消化器官用薬	外用	採用	サリベートエアゾール	50g1個	リン酸ニカリウム・無機塩類配合剤			
2. 3. 9 その他の消化器官用薬	内服	院外	ゼボジアカプセル0. 92mg	0. 92mg1カプセル	オザニモド塩酸塩		劇	
2. 3. 9 その他の消化器官用薬	内服	院外	ゼボジアカプセルスターパック	1カプセル	オザニモド塩酸塩		劇	
2. 3. 9 その他の消化器官用薬	内服	院外	ゼンタコートカプセル3mg	3mg1カプセル	ブデソニド			免疫抑制薬
2. 3. 9 その他の消化器官用薬	外用	採用	デキサメタゾン口腔用軟膏0. 1%「N」	0. 1%1g	デキサメタゾン	後発		
2. 3. 9 その他の消化器官用薬	内服	採用	ナウゼリンOD錠10	10mg1錠	ドンペリドン			
2. 3. 9 その他の消化器官用薬	外用	院外	ナウゼリン坐剤10	10mg1個	ドンペリドン			
2. 3. 9 その他の消化器官用薬	外用	採用	ナウゼリン坐剤30	30mg1個	ドンペリドン			
2. 3. 9 その他の消化器官用薬	外用	採用	ナウゼリン坐剤60	60mg1個	ドンペリドン			
2. 3. 9 その他の消化器官用薬	内服	採用	ナウゼリンドライシロップ1%	1%1g	ドンペリドン			
2. 3. 9 その他の消化器官用薬	内服	外+限	ナゼアOD錠0. 1mg	0. 1mg1錠	ラモセトロン塩酸塩		劇	
2. 3. 9 その他の消化器官用薬	注射	採用	パロノセトロン点滴静注バッグ0. 75	0. 75mg50mL	パロノセトロン塩酸塩	後発	劇	
2. 3. 9 その他の消化器官用薬	外用	採用	複方ヨード・グリセリン	10mL	複方ヨード・グリセリン			
2. 3. 9 その他の消化器官用薬	注射	採用	プリンペラン注射液10mg	0. 5%2mL1管	塩酸メクロプラミド			
2. 3. 9 その他の消化器官用薬	注射	限定	プロイメンド点滴静注用150mg	150mg1瓶	ホスアプレピタントメグルミン			
2. 3. 9 その他の消化器官用薬	内服	採用	ペンタサ顆粒94%	94%1g	メサラジン			
2. 3. 9 その他の消化器官用薬	外用	院外	ペンタサ坐剤1g	1g1個	メサラジン			
2. 3. 9 その他の消化器官用薬	外用	院外	ペンタサ注腸1g	1g1個	メサラジン			
2. 3. 9 その他の消化器官用薬	内服	採用	ポリフル細粒83. 3%	83. 3%1g	ポリカルボフィルカルシウム			
2. 3. 9 その他の消化器官用薬	内服	採用	メサラジン錠500mg「ケミファ」	500mg1錠	メサラジン	後発		
2. 3. 9 その他の消化器官用薬	内服	採用	メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	400mg1錠	メサラジン	後発		
2. 3. 9 その他の消化器官用薬	内服	採用	メクロプラミド錠5mg「NIG」	5mg1錠	メクロプラミド	後発		
2. 3. 9 その他の消化器官用薬	内服	採用	モサブリドクエン酸塩錠5mg「ケミファ」	5mg1錠	モサブリドクエン酸塩水和物			
2. 3. 9 その他の消化器官用薬	内服	採用	リアルダ錠1200mg	1200mg1錠	メサラジン			
2. 3. 9 その他の消化器官用薬	内服	採用	リンゼス錠0. 25mg	0. 25mg1錠	リナクロチド			
2. 3. 9 その他の消化器官用薬	外用	院外	レクタブル2mg注腸フォーム14回	48mg30. 8g1	ブデソニド			免疫抑制薬
2. 3. 9 その他の消化器官用薬	注射	限定	レミケード点滴静注用100	100mg1瓶	インフリキシマブ(遺伝子組換え)		劇	免疫抑制薬
2. 4. 1 脳下垂体ホルモン剤	注射 自注	採用	HMG注用75単位「あすか」	75単位1瓶(溶)	ヒト下垂体性腺刺激ホルモン			
2. 4. 1 脳下垂体ホルモン剤	注射 自注	採用	uFSH注用75単位「あすか」	75単位1瓶(溶)	精製下垂体性腺刺激ホルモン			
2. 4. 1 脳下垂体ホルモン剤	注射	限定	コートロシンZ筋注0. 5mg	0. 5mg1瓶	テトラコサクチド酢酸塩			抗てんかん薬
2. 4. 1 脳下垂体ホルモン剤	注射	採用	コートロシン注射用0. 25mg	0. 25mg1瓶(3)	テトラコサクチド酢酸塩			
2. 4. 1 脳下垂体ホルモン剤	注射 自注	限定	ゴナトロピン注用5000単位	5000単位1瓶	ヒト絨毛性腺刺激ホルモン			
2. 4. 1 脳下垂体ホルモン剤	注射 自注	限定	ゴナールエフ皮下注ペン450	450国際単位0	ホリトロピン アルファ(遺伝子組換え)			
2. 4. 1 脳下垂体ホルモン剤	注射 自注	限定	ゴナールエフ皮下注ペン900	900国際単位1	ホリトロピン アルファ(遺伝子組換え)			
2. 4. 1 脳下垂体ホルモン剤	注射 自注	院外	ジェトロピンゴークイック注用12mg	12mg1キット	ソマトロピン(遺伝子組換え)			
2. 4. 1 脳下垂体ホルモン剤	注射 自注	院外	ジェトロピンゴークイック注用5. 3m	5. 33mg1キッ	ソマトロピン(遺伝子組換え)			
2. 4. 1 脳下垂体ホルモン剤	注射 自注	院外	ソグルーヤ皮下注10mg	10mg1. 5mL	ソマブタン(遺伝子組換え)			
2. 4. 1 脳下垂体ホルモン剤	注射 自注	院外	ソグルーヤ皮下注15mg	15mg1. 5mL	ソマブタン(遺伝子組換え)			
2. 4. 1 脳下垂体ホルモン剤	注射 自注	院外	ソグルーヤ皮下注5mg	5mg1. 5mL1	ソマブタン(遺伝子組換え)			
2. 4. 1 脳下垂体ホルモン剤	注射 自注	採用	注射用HCG5000単位「F」	5000単位1管	ヒト絨毛性腺刺激ホルモン			
2. 4. 1 脳下垂体ホルモン剤	外用	採用	デスモプレシン点鼻スプレー2. 5μg	125μg1瓶	デスモプレシン酢酸塩水和物		劇	
2. 4. 1 脳下垂体ホルモン剤	注射	限定	ビトレシン注射液20	20単位1管	バソプレシン			
2. 4. 1 脳下垂体ホルモン剤	内服	外+限	ミニリンメルトOD錠120μg	120μg1錠	デスモプレシン酢酸塩水和物		劇	
2. 4. 1 脳下垂体ホルモン剤	内服	院外	ミニリンメルトOD錠25μg	25μg1錠	デスモプレシン酢酸塩水和物		劇	
2. 4. 1 脳下垂体ホルモン剤	内服	院外	ミニリンメルトOD錠50μg	50μg1錠	デスモプレシン酢酸塩水和物		劇	
2. 4. 1 脳下垂体ホルモン剤	内服	採用	ミニリンメルトOD錠60μg	60μg1錠	デスモプレシン酢酸塩水和物		劇	
2. 4. 3 甲状腺、副甲状腺ホルモン	注射 自注	院外	オスタバロ皮下注カートリッジ1. 5m	1. 5mg0. 75r	アパロパラチド酢酸塩			
2. 4. 3 甲状腺、副甲状腺ホルモン	内服	採用	チウラジール錠50mg	50mg1錠	プロピルチオウラシル			

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク
2. 4. 3 甲状腺, 副甲状腺ホルモン	注射	限定	チラーゼンS静注液200 μ g	200 μ g1mL1	レボチロキシナトリウム水和物		劇	
2. 4. 3 甲状腺, 副甲状腺ホルモン	注射 自注	外+限	テリパラチドBS皮下注キット600 μ g	600 μ g1キット	テリパラチド(遺伝子組換え)	後発		
2. 4. 3 甲状腺, 副甲状腺ホルモン	注射 自注	院外	テリボン皮下注28. 2 μ gオートイン	28. 2 μ g1キット	テリパラチド酢酸塩			
2. 4. 3 甲状腺, 副甲状腺ホルモン	注射	限定	テリボン皮下注用56. 5 μ g	56. 5 μ g1瓶	テリパラチド酢酸塩			
2. 4. 3 甲状腺, 副甲状腺ホルモン	内服	採用	メルカゾール錠5mg	5mg1錠	チアマゾール			
2. 4. 3 甲状腺, 副甲状腺ホルモン	注射	限定	メルカゾール注10mg	10mg1管	チアマゾール			
2. 4. 3 甲状腺, 副甲状腺ホルモン	内服	採用	レボチロキシナ錠25 μ g「サンド」	25 μ g1錠	レボチロキシナトリウム水和物		劇	
2. 4. 3 甲状腺, 副甲状腺ホルモン	内服	採用	レボチロキシナ錠50 μ g「サンド」	50 μ g1錠	レボチロキシナトリウム水和物		劇	
2. 4. 4 たん白同化ステロイド剤	内服	採用	プリモラン錠5mg	5mg1錠	メテロン酢酸エステル			
2. 4. 5 副腎ホルモン剤	注射	採用	アドレナリン注0. 1%シリンジ「テルモ」	0. 1%1mL1筒	アドレナリン		劇	
2. 4. 5 副腎ホルモン剤	注射 自注	院外	エピベン注射液0. 15mg	0. 15mg1筒	アドレナリン		劇	
2. 4. 5 副腎ホルモン剤	注射 自注	外+限	エピベン注射液0. 3mg	0. 3mg1筒	アドレナリン		劇	
2. 4. 5 副腎ホルモン剤	注射	採用	ケナコルトーA筋注用関節腔内用水	40mg1mL1瓶	トリウムシノロンアセトニド			免疫抑制剤
2. 4. 5 副腎ホルモン剤	注射	採用	ケナコルトーA皮内用関節腔内用水	10mg1mL1バイ	トリウムシノロンアセトニド			免疫抑制剤
2. 4. 5 副腎ホルモン剤	内服	採用	コートリル錠10mg	10mg1錠	ヒドロコルチゾン			免疫抑制剤
2. 4. 5 副腎ホルモン剤	注射	採用	水溶性ハイドロコートン注射液100n	100mg2mL1	ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム			免疫抑制剤
2. 4. 5 副腎ホルモン剤	注射	採用	水溶性プレドニン20mg	20mg1管	プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム			免疫抑制剤
2. 4. 5 副腎ホルモン剤	内服	院外	セレスタミン配合錠	1錠	ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩			免疫抑制剤
2. 4. 5 副腎ホルモン剤	注射 自注	採用	ソル・コーテフ注射用100mg	100mg1瓶(溶	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム			免疫抑制剤
2. 4. 5 副腎ホルモン剤	注射	採用	ソル・メドロール静注用125mg	125mg1瓶(溶	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム			免疫抑制剤
2. 4. 5 副腎ホルモン剤	注射	採用	ソル・メドロール静注用40mg	40mg1瓶(溶	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム			免疫抑制剤
2. 4. 5 副腎ホルモン剤	注射	採用	ソル・メドロール静注用500mg	500mg1瓶(溶	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム			免疫抑制剤
2. 4. 5 副腎ホルモン剤	内服	採用	デカドロン錠0. 5mg	0. 5mg1錠	デキサメタゾン			免疫抑制剤
2. 4. 5 副腎ホルモン剤	内服	採用	デカドロン錠4mg	4mg1錠	デキサメタゾン			免疫抑制剤
2. 4. 5 副腎ホルモン剤	注射	採用	デキサート注射液1. 65mg	1. 65mg0. 5r	デキサメタゾンリン酸エス	後発		免疫抑制剤
2. 4. 5 副腎ホルモン剤	注射	採用	デキサート注射液6. 6mg	6. 6mg2mL1	デキサメタゾンリン酸エス	後発		免疫抑制剤
2. 4. 5 副腎ホルモン剤	注射	採用	ノルアドレナリン注1mg	0. 1%1mL1管	ノルアドレナリン		劇	
2. 4. 5 副腎ホルモン剤	内服	採用	プレドニゾン散「タケダ」1%	1%1g	プレドニゾン			免疫抑制剤
2. 4. 5 副腎ホルモン剤	内服	採用	プレドニゾン錠1mg(旭化成)	1mg1錠	プレドニゾン			免疫抑制剤
2. 4. 5 副腎ホルモン剤	内服	採用	プレドニン錠5mg	5mg1錠	プレドニゾン			免疫抑制剤
2. 4. 5 副腎ホルモン剤	内服	採用	フロリネフ錠0. 1mg	0. 1mg1錠	フルドコルチゾン酢酸エステル		劇	免疫抑制剤
2. 4. 5 副腎ホルモン剤	外用	採用	ボスミン外用液0. 1%	0. 1%1mL	アドレナリン			
2. 4. 5 副腎ホルモン剤	注射	採用	ボスミン注1mg	0. 1%1mL1管	アドレナリン		劇	
2. 4. 5 副腎ホルモン剤	内服	採用	メドロール錠4mg	4mg1錠	メチルプレドニゾン			免疫抑制剤
2. 4. 5 副腎ホルモン剤	注射	採用	リメタゾン静注2. 5mg	2. 5mg1mL1	デキサメタゾンバルミチン酸エステル		劇	免疫抑制剤
2. 4. 5 副腎ホルモン剤	外用	院外	リンデロン坐剤0. 5mg	0. 5mg1個	ベタメタゾン			免疫抑制剤
2. 4. 5 副腎ホルモン剤	内服	採用	リンデロン錠0. 5mg	0. 5mg1錠	ベタメタゾン			免疫抑制剤
2. 4. 5 副腎ホルモン剤	内服	院外	リンデロンシロップ0. 01%	0. 01%1mL	ベタメタゾン			免疫抑制剤
2. 4. 5 副腎ホルモン剤	注射	採用	リンデロン注4mg(0. 4%)	4mg1管	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム			免疫抑制剤
2. 4. 6 男性ホルモン剤	注射	採用	テストノンデポー筋注用250mg	250mg1mL1	テストステロンエナント酸エステル			
2. 4. 7 卵胞ホルモン及び黄体	外用	院外	エストラーナテープ0. 72mg	(0. 72mg)9平	エストラジオール			
2. 4. 7 卵胞ホルモン及び黄体	内服	院外	エストリオール錠1mg「F」	1mg1錠	エストリオール			
2. 4. 7 卵胞ホルモン及び黄体	内服	院外	デュファストン錠5mg	5mg1錠	ジドロゲステロン			
2. 4. 7 卵胞ホルモン及び黄体	内服	院外	ノアルテン錠(5mg)	5mg1錠	ノルエチステロン			
2. 4. 7 卵胞ホルモン及び黄体	内服	外+限	ヒスロンH錠200mg	200mg1錠	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル			抗悪性腫瘍
2. 4. 7 卵胞ホルモン及び黄体	内服	院外	ブレマリン錠0. 625mg	0. 625mg1錠	結合型エストロゲン			
2. 4. 7 卵胞ホルモン及び黄体	内服	採用	プロスター錠25	25mg1錠	クロルマジノン酢酸エステル			抗悪性腫瘍
2. 4. 7 卵胞ホルモン及び黄体	内服	院外	プロベラ錠2. 5mg	2. 5mg1錠	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル			
2. 4. 8 混合ホルモン剤	内服	院外	ジェミーナ配合錠	1錠	レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール			
2. 4. 8 混合ホルモン剤	内服	院外	プラノバル配合錠	1錠	ノルゲストレル・エチニルエストラジオール			
2. 4. 8 混合ホルモン剤	外用	院外	メノエイドコンビパッチ	1枚	エストラジオール・酢酸ノルエチステロン			

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク
2. 4. 8 混合ホルモン剤	内服	院外	ヤーズ配合錠	1錠	ドロスピレノン・エチニルエストラジオール	ベータデクス		
2. 4. 8 混合ホルモン剤	内服	院外	ヤーズフレックス配合錠	1錠	ドロスピレノン・エチニルエストラジオール	ベータデクス		
2. 4. 8 混合ホルモン剤	内服	院外	ルナベル配合錠LD	1錠	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール			
2. 4. 8 混合ホルモン剤	内服	院外	ルナベル配合錠ULD	1錠	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール			
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗)	注射 自注	採用	アウイクリ注 フレックスタッチ 総量300単位	300単位1キッ	インスリン イコデク(遺伝子組換え)		劇	臓臓ホルマ
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗)	注射 自注	院外	アウイクリ注 フレックスタッチ 総量700単位	700単位1キッ	インスリン イコデク(遺伝子組換え)		劇	臓臓ホルマ
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗)	注射 自注	院外	アピドラ注ソロスター	300単位1キッ	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)		劇	臓臓ホルマ
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗)	注射 自注	採用	インスリン アスパルトBS注ソロスター	300単位1キッ	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	後発	劇	臓臓ホルマ
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗)	注射 自注	採用	インスリン グラルギンBS注ミリオペン	300単位1キッ	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)		劇	臓臓ホルマ
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗)	注射 自注	採用	インスリン リスプロBS注100単位	100単位1mL	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	後発	劇	臓臓ホルマ
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗)	注射 自注	採用	インスリン リスプロBS注ソロスター	300単位1キッ	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	後発	劇	臓臓ホルマ
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗)	注射 自注	採用	ウゴービ皮下注0. 25mg SD	0. 25mg0. 5r	セマグルチド(遺伝子組換え)		劇	糖尿病用薬
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗)	注射 自注	採用	ウゴービ皮下注0. 5mg SD	0. 5mg0. 5m	セマグルチド(遺伝子組換え)		劇	糖尿病用薬
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗)	注射 自注	採用	ウゴービ皮下注1. 0mg SD	1mg0. 5mL1	セマグルチド(遺伝子組換え)		劇	糖尿病用薬
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗)	注射 自注	採用	ウゴービ皮下注1. 7mg SD	1. 7mg0. 75r	セマグルチド(遺伝子組換え)		劇	糖尿病用薬
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗)	注射 自注	採用	ウゴービ皮下注2. 4mg SD	2. 4mg0. 75r	セマグルチド(遺伝子組換え)		劇	糖尿病用薬
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗)	注射 自注	採用	オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg	100μg1mL1	オクトレオチド酢酸塩	後発	劇	
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗)	注射 自注	採用	オゼンピック皮下注2mg	2mg1. 5mL1	セマグルチド(遺伝子組換え)		劇	糖尿病用薬
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗)	内服	採用	カリジノゲナーゼ錠50単位「NIG」	50単位1錠	カリジノゲナーゼ	後発		
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗)	内服	院外	クロミッド錠50mg	50mg1錠	クロミフェンクエン酸塩			
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗)	注射	採用	ゴナックス皮下注用120mg	120mg1瓶(溶	デガレリクス酢酸塩		劇	抗悪性腫瘍
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗)	注射	採用	ゴナックス皮下注用240mg	240mg1瓶(溶	デガレリクス酢酸塩		劇	抗悪性腫瘍
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗)	注射	採用	ゴナックス皮下注用80mg	80mg1瓶(溶剤	デガレリクス酢酸塩		劇	抗悪性腫瘍
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗)	注射	採用	サンドスタチンLAR筋注用キット20r	20mg1キット(	オクトレオチド酢酸塩		劇	抗悪性腫瘍
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗)	注射	限定	サンドスタチンLAR筋注用キット30r	30mg1キット(	オクトレオチド酢酸塩		劇	抗悪性腫瘍
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗)	内服	院外	ジェノゲスト錠0. 5mg「モチダ」	0. 5mg1錠	ジェノゲスト	後発		
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗)	内服	院外	ジェノゲスト錠1mg「モチダ」	1mg1錠	ジェノゲスト	後発		
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗)	注射 自注	院外	ゼップバウンド皮下注10mgアテオス	10mg0. 5mL	チルゼパチド		劇	糖尿病用薬
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗)	注射 自注	院外	ゼップバウンド皮下注12. 5mgアテ	12. 5mg0. 5r	チルゼパチド		劇	糖尿病用薬
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗)	注射 自注	院外	ゼップバウンド皮下注15mgアテオス	15mg0. 5mL	チルゼパチド		劇	糖尿病用薬
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗)	注射 自注	院外	ゼップバウンド皮下注2. 5mgアテオ	2. 5mg0. 5m	チルゼパチド		劇	糖尿病用薬
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗)	注射 自注	院外	ゼップバウンド皮下注5mgアテオス	5mg0. 5mL1	チルゼパチド		劇	糖尿病用薬
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗)	注射 自注	院外	ゼップバウンド皮下注7. 5mgアテオ	7. 5mg0. 5m	チルゼパチド		劇	糖尿病用薬
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗)	注射	採用	ゾラデックス1. 8mgデポ	1. 8mg1筒(ゴ	ゴセレリン酢酸塩		劇	
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗)	注射	採用	ゾラデックス3. 6mgデポ	3. 6mg1筒(ゴ	ゴセレリン酢酸塩		劇	抗悪性腫瘍
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗)	注射	採用	ゾラデックスLA10. 8mgデポ	10. 8mg1筒(ゴ	ゴセレリン酢酸塩		劇	抗悪性腫瘍
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗)	内服	採用	デュタステリド錠0. 5mgAV「DSEP	0. 5mg1錠	デュタステリド	後発	劇	
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗)	注射 自注	採用	トルリシティ皮下注0. 75mgアテオス	0. 75mg0. 5r	デュラグルチド(遺伝子組換え)		劇	糖尿病用薬
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗)	注射 自注	採用	トレシーバ注 フレックスタッチ	300単位1キッ	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)		劇	臓臓ホルマ
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗)	外用	院外	ナサニール点鼻液0. 2%	10mg5mL1瓶	ナファレリン酢酸塩水和物		劇	
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗)	注射 自注	採用	ノボラピッド30ミックス注 フレックスヘ	300単位1キッ	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)		劇	臓臓ホルマ
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗)	注射 自注	採用	ノボリンR注フレックスペン	300単位1キッ	インスリン ヒト(遺伝子組換え)		劇	臓臓ホルマ
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗)	外用	院外	バクスマー一点鼻粉末剤3mg	3mg1瓶	グルカゴン		劇	
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗)	注射 自注	採用	ヒューマリンR注100単位/mL	100単位1mL	インスリン ヒト(遺伝子組換え)		劇	臓臓ホルマ
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗)	注射 自注	院外	ヒューマログミックス25注ミリオペン	300単位1キッ	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)		劇	臓臓ホルマ
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗)	注射 自注	採用	ヒューマログミックス50注ミリオペン	300単位1キッ	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)		劇	臓臓ホルマ
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗)	注射	採用	プロスタルモン・F注射液1000	1mg1mL1管	ジノプロスト		劇	
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗)	内服	院外	プロベシア錠0. 2mg	0. 2mg1錠	フィナステリド		劇	
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗)	内服	院外	プロベシア錠1mg	1mg1錠	フィナステリド		劇	
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗)	注射 自注	採用	マンジャロ皮下注10mgアテオス	10mg0. 5mL	チルゼパチド		劇	糖尿病用薬
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗)	注射 自注	採用	マンジャロ皮下注12. 5mgアテオス	12. 5mg0. 5r	チルゼパチド		劇	糖尿病用薬

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗注射)	自注採用		マンジャロ皮下注15mgアテオス	15mg0. 5mL	チルゼパチド		劇	糖尿病用薬
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗注射)	自注採用		マンジャロ皮下注2. 5mgアテオス	2. 5mg0. 5ml	チルゼパチド		劇	糖尿病用薬
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗注射)	自注採用		マンジャロ皮下注5mgアテオス	5mg0. 5mL1	チルゼパチド		劇	糖尿病用薬
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗注射)	自注採用		マンジャロ皮下注7. 5mgアテオス	7. 5mg0. 5ml	チルゼパチド		劇	糖尿病用薬
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗注射)	自注院外		ライゾデグ配合注 フレックスタッチ	300単位1キット	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)		劇	膵臓ホルモ
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗注射)	自注採用		ランタスXR注ソロスター	450単位1キット	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)		劇	膵臓ホルモ
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗注射)	自注採用		ランタス注100単位／mL	100単位1mL	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)		劇	膵臓ホルモ
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗内服)	外+限		リベルサス錠14mg	14mg1錠	セマグルチド(遺伝子組換え)		劇	糖尿病用薬
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗内服)	採用		リベルサス錠3mg	3mg1錠	セマグルチド(遺伝子組換え)		劇	糖尿病用薬
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗内服)	採用		リベルサス錠7mg	7mg1錠	セマグルチド(遺伝子組換え)		劇	糖尿病用薬
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗注射)	採用		リューブリンPRO注射用キット22. 5	22. 5mg1筒	リュープロレリン酢酸塩		劇	抗悪性腫瘍
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗注射)	採用		リューブリン注射用1. 88mg	1. 88mg1瓶(希釈)	リュープロレリン酢酸塩		劇	
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗注射)	採用		リュープロレリン酢酸塩SR注射用キ	11. 25mg1筒	リュープロレリン酢酸塩	後発	劇	抗悪性腫瘍
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗注射)	採用		リュープロレリン酢酸塩注射用キット	1. 88mg1筒	リュープロレリン酢酸塩	後発	劇	
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗注射)	採用		リュープロレリン酢酸塩注射用キット	3. 75mg1筒	リュープロレリン酢酸塩	後発	劇	抗悪性腫瘍
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗注射)	自注採用		ルムジェブ注ミリオペン	300単位1キット	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)		劇	膵臓ホルモ
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗注射)	自注院外		レベミル注 フレックスペン	300単位1キット	インスリン デテミル(遺伝子組換え)		劇	膵臓ホルモ
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗内服)	院外		レルミナ錠40mg	40mg1錠	レルゴリクス		劇	
2. 5. 1 泌尿器官用剤	外用	採用	ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%	3%3L1袋	D-ソルビトール			
2. 5. 2 生殖器官用剤(性病予防)	外用	採用	エストリール錠0. 5mg	0. 5mg1錠	エストリオール			
2. 5. 2 生殖器官用剤(性病予防)	外用	採用	オキナゾール錠600mg	600mg1錠	オキシコナゾール硝酸塩			
2. 5. 2 生殖器官用剤(性病予防)	外用	採用	クロマイ錠100mg	100mg1錠	クロラムフェニコール			
2. 5. 2 生殖器官用剤(性病予防)	外用	採用	フラジール錠250mg	250mg1錠	メトロニダゾール			
2. 5. 2 生殖器官用剤(性病予防)	外用	採用	ミレーナ52mg	1個	レボノルゲストレル			
2. 5. 3 子宮収縮剤	内服	院外	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠0. 125mg	0. 125mg1錠	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩		劇	
2. 5. 4 避妊剤	内服	院外	スリンダ錠28	(28日分)1組	ドロスピレノン			
2. 5. 4 避妊剤	内服	院外	トリキュラー錠28	(28日分)1組	レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール			
2. 5. 4 避妊剤	内服	採用	ノルレボ錠1. 5mg	1. 5mg1錠	レボノルゲストレル			
2. 5. 5 痔疾用剤	注射	採用	ジオン注無痛化剤付	10mL1瓶(希釈)	硫酸アルミニウムカリウム水和物・タンニン		劇	
2. 5. 5 痔疾用剤	外用	院外	プロクトセディル坐薬	1個	ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤			
2. 5. 5 痔疾用剤	外用	採用	ヘモポリゾン軟膏	1g	大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン	後発		
2. 5. 9 その他の泌尿生殖器官	内服	院外	ウテメリン錠5mg	5mg1錠	リトドリン塩酸塩			
2. 5. 9 その他の泌尿生殖器官	内服	採用	ウロカルン錠225mg	225mg1錠	ウラジロガシエキス			
2. 5. 9 その他の泌尿生殖器官	内服	院外	エビプロスタット配合錠DB	1錠	オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤			
2. 5. 9 その他の泌尿生殖器官	内服	採用	シロドシンOD錠4mg「ケミファ」	4mg1錠	シロドシン	後発	劇	
2. 5. 9 その他の泌尿生殖器官	内服	採用	ステープラOD錠0. 1mg	0. 1mg1錠	イミダフェナシン			
2. 5. 9 その他の泌尿生殖器官	内服	院外	セルニルトン錠	1錠	セルニチンボーレンエキス			
2. 5. 9 その他の泌尿生殖器官	内服	採用	タダラフィル錠5mgZA「サワイ」	5mg1錠	タダラフィル	後発		
2. 5. 9 その他の泌尿生殖器官	内服	採用	タムスロシン塩酸塩OD錠0. 2mg「E	0. 2mg1錠	タムスロシン塩酸塩			
2. 5. 9 その他の泌尿生殖器官	内服	採用	トビエース錠4mg	4mg1錠	フェソテロジンフマル酸塩			
2. 5. 9 その他の泌尿生殖器官	内服	採用	ナフトピジルOD錠25mg「トーワ」	25mg1錠	ナフトピジル	後発		
2. 5. 9 その他の泌尿生殖器官	内服	採用	ナフトピジルOD錠75mg「トーワ」	75mg1錠	ナフトピジル	後発		
2. 5. 9 その他の泌尿生殖器官	外用	院外	ネオキシテープ73. 5mg	73. 5mg1枚	オキシプチニン塩酸塩			
2. 5. 9 その他の泌尿生殖器官	内服	採用	フラボキサート塩酸塩錠200mg「サ	200mg1錠	フラボキサート塩酸塩			
2. 5. 9 その他の泌尿生殖器官	内服	採用	ベオーバ錠50mg	50mg1錠	ビベグロン			
2. 5. 9 その他の泌尿生殖器官	内服	外+限	ベシケアOD錠2. 5mg	2. 5mg1錠	コハク酸ソリフェナシン			
2. 5. 9 その他の泌尿生殖器官	内服	採用	ベシケアOD錠5mg	5mg1錠	コハク酸ソリフェナシン			
2. 5. 9 その他の泌尿生殖器官	内服	採用	ベタニス錠50mg	50mg1錠	ミラベグロン		劇	
2. 6. 1 外皮用殺菌消毒剤	外用	採用	イソジンゲル10%	10%10g	ポビドンヨード			
2. 6. 1 外皮用殺菌消毒剤	外用	採用	液状フェノール「ケンエー」	10mL	フェノール		劇	
2. 6. 1 外皮用殺菌消毒剤	外用	採用	エコ消エタ消毒液	10mL	エタノール			

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク
2. 6. 1 外皮用殺菌消毒剤	外用	採用	オキシドール「東海」	10mL	オキシドール			
2. 6. 1 外皮用殺菌消毒剤	外用	採用	逆性石ケン液0. 05「ヨシダ」	0. 05%10mL	ベンザルコニウム塩化物			
2. 6. 1 外皮用殺菌消毒剤	外用	採用	逆性石ケン液10「ヨシダ」	10%10mL	ベンザルコニウム塩化物			
2. 6. 1 外皮用殺菌消毒剤	外用	採用	ステリクロンR液0. 1	0. 1%10mL	クロルヘキシジングルコン酸塩			
2. 6. 1 外皮用殺菌消毒剤	外用	採用	ハイポエタノール液2%「ヨシダ」	10mL	チオ硫酸ナトリウム水和物	後発		
2. 6. 1 外皮用殺菌消毒剤	外用	採用	ヒビスコール液A1%	1%10mL	クロルヘキシジングルコン酸塩			
2. 6. 1 外皮用殺菌消毒剤	外用	採用	ヘキサックAL液1%	1%10mL	クロルヘキシジングルコン酸塩			
2. 6. 1 外皮用殺菌消毒剤	外用	採用	ポビドンヨード液10%「メタル」	10%10mL	ポビドンヨード	後発		
2. 6. 1 外皮用殺菌消毒剤	外用	採用	ポビドンヨードスクラブ液7. 5%「明治」	7. 5%10mL	ポビドンヨード	後発		
2. 6. 1 外皮用殺菌消毒剤	外用	採用	ホルマリン「ケンエー」	10mL	ホルマリン		劇	
2. 6. 1 外皮用殺菌消毒剤	外用	採用	無水エタノール「東海」	10mL	無水エタノール			
2. 6. 1 外皮用殺菌消毒剤	外用	採用	リナバス消毒液0. 2%	0. 2%10mL	ベンザルコニウム塩化物			
2. 6. 3 化膿性疾患用剤	外用	採用	アクアチムクリーム1%	1%1g	ナジフロキサシン			
2. 6. 3 化膿性疾患用剤	外用	採用	ゲーベンクリーム1%	1%1g	スルファジアジン銀			
2. 6. 3 化膿性疾患用剤	外用	採用	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0. 1%「イ」	1mg1g	ゲンタマイシン硫酸塩			
2. 6. 3 化膿性疾患用剤	外用	院外	ゼビアクスローション2%	2%1g	オゼノキサシン			
2. 6. 3 化膿性疾患用剤	外用	採用	ソフラチュール貼付剤10cm	(10. 8mg) 10	フラジオマイシン硫酸塩			
2. 6. 3 化膿性疾患用剤	外用	採用	ダラシンTゲル1%	1%1g	クリンダマイシンリン酸エステル			
2. 6. 3 化膿性疾患用剤	外用	採用	バラマイシン軟膏	(BTRC250単位)	バシトラシン・フラジオマイシン硫酸塩			
2. 6. 4 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎	外用	採用	亜鉛華デンブ「コザカイ・M」	10g	亜鉛華デンブ			
2. 6. 4 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎	外用	採用	亜鉛華軟膏「ヨシダ」	10g	亜鉛華			
2. 6. 4 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎	外用	採用	アズノール軟膏0. 033%	0. 033%10g	ジメチルイソプロピルアズレン			
2. 6. 4 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎	外用	採用	アドフィードパップ40mg	10cm×14cm	フルルビプロフェン			
2. 6. 4 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎	外用	採用	インテバンクリーム1%	1%1g	インドメタシン			
2. 6. 4 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎	外用	採用	エキザルベ	1g	混合死菌製剤			
2. 6. 4 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎	外用	採用	エクラープラスター20μg/cm ²	(1. 5mg) 7. 5	デブロンプロピオン酸エステル			
2. 6. 4 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎	外用	採用	オイラックスHクリーム	1g	ヒドロコルチゾン・クロタミトン			
2. 6. 4 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎	外用	採用	オイラックスクリーム10%	10%10g	クロタミトン			
2. 6. 4 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎	外用	院外	クロベタゾールプロピオン酸エステル	0. 05%1g	クロベタゾールプロピオン	後発	劇	
2. 6. 4 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎	外用	採用	クロベタゾールプロピオン酸エステル	0. 05%1g	クロベタゾールプロピオン	後発	劇	
2. 6. 4 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎	外用	採用	クロベタゾールプロピオン酸エステル	0. 05%1g	クロベタゾールプロピオン	後発	劇	
2. 6. 4 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎	外用	院外	ケトプロフェン(30mg) 10cm×14cm	10cm×14cm	ケトプロフェン			
2. 6. 4 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎	外用	院外	コムクロシャンブー0. 05%	0. 05%1g	クロベタゾールプロピオン酸エステル		劇	
2. 6. 4 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎	外用	採用	コンベッククリーム5%	5%1g	ウフェナマート			
2. 6. 4 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎	外用	採用	ザーネ軟膏0. 5%	5000単位1g	ビタミンA油			
2. 6. 4 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎	外用	院外	セルタッチパップ70	10cm×14cm	フェルビナク			
2. 6. 4 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎	外用	採用	テラ・コートリル軟膏	1g	オキシテトラサイクリン塩酸塩・ヒドロコルチゾン			
2. 6. 4 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎	外用	採用	デルモゾールGクリーム	1g	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩			
2. 6. 4 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎	外用	採用	デルモゾールG軟膏	1g	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩			
2. 6. 4 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎	外用	採用	デルモゾールGローション	1mL	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩			
2. 6. 4 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎	外用	採用	ナボールゲル1%	1%1g	ジクロフェナクナトリウム			
2. 6. 4 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎	外用	採用	ネリゾナユニバーサルクリーム0. 1%	0. 1%1g	ジフルコルトロン吉草酸エステル		劇	
2. 6. 4 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎	外用	採用	フエナゾール軟膏5%	5%1g	ウフェナマート			
2. 6. 4 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎	外用	外+限	フェノール・亜鉛華リニメント	10g	フェノール・亜鉛華リニメント			
2. 6. 4 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎	外用	採用	フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」	3%1g	フェルビナク			
2. 6. 4 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎	外用	院外	フェルビナクローション3%「ラクール」	3%1mL	フェルビナク	後発		
2. 6. 4 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎	外用	採用	フルオシノニドクリーム0. 05%「テイ」	0. 05%1g	フルオシノニド	後発	劇	
2. 6. 4 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎	外用	採用	ブレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル	0. 3%1g	ブレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル			
2. 6. 4 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎	外用	採用	ブレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル	0. 3%1g	ブレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル			
2. 6. 4 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎	外用	院外	ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム	0. 12%1g	ベタメタゾン吉草酸エステル	後発		
2. 6. 4 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎	外用	院外	ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0. 1%	0. 12%1g	ベタメタゾン吉草酸エステル	後発		

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク
2. 6. 4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎	外用	採用	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン	0. 05%1g	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン	酸劇		
2. 6. 4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎	外用	採用	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン	0. 05%1g	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン	酸劇		
2. 6. 4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎	外用	採用	ボア軟膏0. 12%	0. 12%1g	デキサメタゾン吉草酸エステル			
2. 6. 4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎	外用	採用	ボチシート20%	5g	亜鉛華	後発		
2. 6. 4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎	外用	院外	メサデルムクリーム0. 1%	0. 1%1g	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	劇		
2. 6. 4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎	外用	院外	ヤクバンテープ60mg	15cm×14cm	フルルビプロフェン			
2. 6. 4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎	外用	採用	ユベラ軟膏	1g	トコフェロール・ビタミンA油			
2. 6. 4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎	外用	院外	ラクティオンパップ70mg	10cm×14cm	インドメタシン			
2. 6. 4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎	外用	院外	リドメックスコーワローション0. 3%	0. 3%1g	ブレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル			
2. 6. 4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎	外用	採用	レスタミンコーワクリーム1%	1%10g	ジフェニヒドラミン			
2. 6. 4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎	外用	採用	ロキソプロフェンナトリウムテープ10	10cm×14cm	ロキソプロフェンナトリウム水和物			
2. 6. 4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎	外用	採用	ロキソプロフェンナトリウムテープ50	7cm×10cm1	ロキソプロフェンナトリウム水和物			
2. 6. 4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎	外用	採用	ロコアテープ	10cm×14cm	エスフルルビプロフェン・ハッカ油	劇		
2. 6. 4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎	外用	採用	ロコイドクリーム0. 1%	0. 1%1g	ヒドロコルチゾン酪酸エステル			
2. 6. 4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎	外用	採用	ロコイド軟膏0. 1%	0. 1%1g	ヒドロコルチゾン酪酸エステル			
2. 6. 5 寄生性皮膚疾患用剤	外用	採用	5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	5%10g	サリチル酸	後発		
2. 6. 5 寄生性皮膚疾患用剤	外用	採用	アトラン外用液1%	1%1mL	ネチコナゾール塩酸塩			
2. 6. 5 寄生性皮膚疾患用剤	外用	採用	アトラン軟膏1%	1%1g	ネチコナゾール塩酸塩			
2. 6. 5 寄生性皮膚疾患用剤	外用	採用	サリチル酸「ケンエー」	10g	サリチル酸			
2. 6. 5 寄生性皮膚疾患用剤	外用	採用	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サ	1%1g	テルビナフィン塩酸塩	後発		
2. 6. 5 寄生性皮膚疾患用剤	外用	院外	ニゾラルクリーム2%	2%1g	ケトコナゾール			
2. 6. 5 寄生性皮膚疾患用剤	外用	採用	ニゾラルローション2%	2%1g	ケトコナゾール			
2. 6. 5 寄生性皮膚疾患用剤	外用	採用	ルリコナクリーム1%	1%1g	ルリコナゾール			
2. 6. 6 皮膚軟化剤(腐しよく剤を	外用	採用	硝酸銀「VTRS」原末	1g	硝酸銀		劇	
2. 6. 6 皮膚軟化剤(腐しよく剤を	外用	採用	スピール膏M	25平方cm1枚	サリチル酸			
2. 6. 6 皮膚軟化剤(腐しよく剤を	外用	採用	尿素クリーム20%「SUN」	20%1g	尿素	後発		
2. 6. 7 毛髪用剤(脱毛剤, 脱毛	外用	院外	フロジン外用液5%	5%1mL	カルプロニウム塩化物水	後発		
2. 6. 9 その他の外用薬	外用	採用	アクトシン軟膏3%	3%1g	ブクラデシンナトリウム		劇	
2. 6. 9 その他の外用薬	外用	採用	オキサロール軟膏25μg/g	0. 0025%1g	マキサカルシトール			
2. 6. 9 その他の外用薬	外用	採用	オルセノン軟膏0. 25%	0. 25%1g	トレチノイン トコフェリル			
2. 6. 9 その他の外用薬	外用	採用	カデックス軟膏0. 9%	0. 9%1g	ヨウ素			
2. 6. 9 その他の外用薬	外用	院外	コレクチム軟膏0. 5%	0. 5%1g	デルゴシチニブ			
2. 6. 9 その他の外用薬	外用	院外	ディフェリンゲル0. 1%	0. 1%1g	アダパレン		劇	
2. 6. 9 その他の外用薬	外用	院外	ドボベツゲル	1g	カルシボトリオール水和物・ベタメタゾン	劇		
2. 6. 9 その他の外用薬	外用	採用	ドボベツ軟膏	1g	カルシボトリオール水和物・ベタメタゾン	劇		
2. 6. 9 その他の外用薬	外用	院外	ドボベツフォーム	1g	カルシボトリオール水和物・ベタメタゾン	劇		
2. 6. 9 その他の外用薬	外用	院外	バイタマクリーム1%	1%1g	タビナロフ			
2. 6. 9 その他の外用薬	外用	院外	フィブラストスプレー250	250μg1瓶(溶	トラフェルミン(遺伝子組換え)			
2. 6. 9 その他の外用薬	外用	採用	フィブラストスプレー500	500μg1瓶(溶	トラフェルミン(遺伝子組換え)			
2. 6. 9 その他の外用薬	外用	採用	フロスタンディン軟膏0. 003%	0. 003%1g	アルプロスタジール アルファデクス	劇		
2. 6. 9 その他の外用薬	外用	院外	プロトピック軟膏0. 03%小児用	0. 03%1g	タクロリムス水和物		劇	
2. 6. 9 その他の外用薬	外用	採用	プロトピック軟膏0. 1%	0. 1%1g	タクロリムス水和物		劇	
2. 6. 9 その他の外用薬	外用	院外	ベピオウオッシュジェル5%	5%1g	過酸化ベンゾイル			
2. 6. 9 その他の外用薬	外用	院外	ベピオゲル2. 5%	2. 5%1g	過酸化ベンゾイル			
2. 6. 9 その他の外用薬	外用	院外	ベピオローション2. 5%	2. 5%1g	過酸化ベンゾイル			
2. 6. 9 その他の外用薬	外用	採用	ボビシュガーバスタ軟膏	1g	精製白糖・ポビドンヨード	後発		
2. 6. 9 その他の外用薬	外用	院外	ボンアルファ軟膏2μg/g	0. 0002%1g	タカルシトール水和物		劇	
2. 6. 9 その他の外用薬	外用	院外	ボンアルファハイ軟膏20μg/g	0. 002%1g	タカルシトール水和物		劇	
2. 6. 9 その他の外用薬	外用	院外	ボンアルファハイローション20μg/g	0. 002%1g	タカルシトール水和物		劇	
2. 6. 9 その他の外用薬	外用	院外	マーデュオックス軟膏	1g	マキサカルシトール・ベタメタゾン酪酸	劇		
2. 6. 9 その他の外用薬	外用	院外	モイゼルト軟膏1%	1%1g	ジファミラスト			

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク
2. 6. 9 その他の外皮用薬	内服	院外	レクチゾール錠25mg	25mg1錠	ジアフェニルスルホン			
2. 6. 9 その他の外皮用薬	外用	採用	ロゼックスゲル0. 75%	0. 75%1g	メトロナゾール			
2. 7. 1 歯科用局所麻酔剤	外用 注射	採用	オーラ注歯科用カートリッジ1. 0mL	1mL1管	リドカイン塩酸塩・アドレナリン塩酸塩	後発	劇	
2. 7. 1 歯科用局所麻酔剤	外用 注射	採用	オーラ注歯科用カートリッジ1. 8mL	1. 8mL1管	リドカイン塩酸塩・アドレナリン塩酸塩	後発	劇	
2. 7. 1 歯科用局所麻酔剤	外用 注射	採用	歯科用シタネストール・オクタプレシナール	1. 8mL1管	プロピトカイン塩酸塩・フェリプレシン		劇	
2. 7. 3 歯科用鎮痛鎮静剤(根管)	外用	採用	歯科用ホルムクレゾール「村上」	1mL	ホルマリン・クレゾール		劇	
2. 7. 3 歯科用鎮痛鎮静剤(根管)	外用	採用	ペリオドン		パラホルムアルデヒド・ジブカイン塩酸塩		劇	
2. 7. 3 歯科用鎮痛鎮静剤(根管)	外用	採用	ホルマリン・グアヤコールFG「ネオ」		ホルマリン・グアヤコール		劇	
2. 7. 6 歯科用抗生物質製剤	外用	採用	テトラサイクリン・プレステロン歯科用	1g	エビジヒドロコレステリン・テトラサイクリン塩酸塩			
2. 7. 6 歯科用抗生物質製剤	外用	採用	ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%	10mg0. 5g1シ	ミノサイクリン塩酸塩	後発		
2. 7. 9 その他の歯科口腔用薬	外用	採用	ネオステリングリーンうがい液0. 2%	1mL	ベンゼトニウム塩化物			
2. 7. 9 その他の歯科口腔用薬	外用	採用	フルオール・ゼリー歯科用2%	2%1g	フッ化ナトリウム			
2. 9. 0 その他の個々の器官系	内服	院外	セファランチン末1%	1%1g	セファランチン			
3. 1. 1 ビタミンA及びD剤	内服	採用	アルファカルシドール錠0. 25μg「ア	0. 25μg1錠	アルファカルシドール	後発	劇	
3. 1. 1 ビタミンA及びD剤	内服	採用	アルファカルシドール錠0. 5μg「ア	0. 5μg1錠	アルファカルシドール	後発	劇	
3. 1. 1 ビタミンA及びD剤	内服	採用	アルファカルシドール錠1. 0μg「ア	1μg1錠	アルファカルシドール	後発	劇	
3. 1. 1 ビタミンA及びD剤	内服	採用	エルデカルシトールカプセル0. 75μ	0. 75μg1カプ	エルデカルシトール	後発	劇	
3. 1. 1 ビタミンA及びD剤	注射	採用	カルシトリオール静注液0. 5μg「F」	0. 5μg1mL1	カルシトリオール	後発	劇	
3. 1. 1 ビタミンA及びD剤	注射	採用	カルシトリオール静注液1μg「F」	1μg1mL1管	カルシトリオール	後発	劇	
3. 1. 1 ビタミンA及びD剤	内服	採用	チガソナカプセル10	10mg1カプセル	エトレチナート		劇	
3. 1. 1 ビタミンA及びD剤	内服	採用	ロカルトロールカプセル0. 25	0. 25μg1カプ	カルシトリオール		劇	
3. 1. 2 ビタミンB1剤	内服	採用	25mgアリナミンF糖衣錠	25mg1錠	フルスルチアミン			
3. 1. 2 ビタミンB1剤	注射	採用	チアミン塩化物塩酸塩注50mg「フ	50mg1管	チアミン塩化物塩酸塩			
3. 1. 3 ビタミンB剤(ビタミンB1)	内服	院外	ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	10%1g	ニコチン酸アミド			
3. 1. 3 ビタミンB剤(ビタミンB1)	内服	採用	パンテチン散20%「NIG」	20%1g	パンテチン	後発		
3. 1. 3 ビタミンB剤(ビタミンB1)	内服	採用	パントシン錠200	200mg1錠	パンテチン			
3. 1. 3 ビタミンB剤(ビタミンB1)	注射	採用	パントシン注5%	100mg1管	パンテチン			
3. 1. 3 ビタミンB剤(ビタミンB1)	内服	採用	ピロキサル錠10mg	10mg1錠	ピロキサルリン酸エステル水和物			
3. 1. 3 ビタミンB剤(ビタミンB1)	内服	採用	フォリアミン錠	5mg1錠	葉酸			
3. 1. 3 ビタミンB剤(ビタミンB1)	注射	採用	メコバラミン注500μg「NP」	0. 5mg1管	メコバラミン	後発		
3. 1. 3 ビタミンB剤(ビタミンB1)	内服	採用	メコバラミン錠500μg	0. 5mg1錠	メコバラミン	後発		
3. 1. 4 ビタミンC剤	注射	採用	アスコルビン酸注500mg「イセイ」	500mg1管	アスコルビン酸			
3. 1. 5 ビタミンE剤	内服	採用	ユベラ錠50mg	50mg1錠	トコフェロール酢酸エステル			
3. 1. 6 ビタミンK剤	注射	採用	ケイツーN静注10mg	10mg1管	メナテトレン			
3. 1. 7 混合ビタミン剤(ビタミンA	注射	採用	オーツカMV注	1瓶1管1組	高カロリー輸液用総合ビタミン剤			
3. 1. 7 混合ビタミン剤(ビタミンA	内服	採用	シナール配合錠	1錠	アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム			
3. 1. 7 混合ビタミン剤(ビタミンA	内服	採用	調剤用パンビタン末	1g	レチノール・カルシフェロール配合剤			
3. 1. 7 混合ビタミン剤(ビタミンA	内服	採用	ノイロビタン配合錠	1錠	オクトチアミン・B2・B6・B12配合剤			
3. 1. 7 混合ビタミン剤(ビタミンA	注射	採用	ビタメジン静注用	1瓶	リン酸チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤			
3. 2. 1 カルシウム剤	注射	採用	カルチコール注射液8. 5%5mL	8. 5%5mL1管	グルコン酸カルシウム水和物			
3. 2. 1 カルシウム剤	内服	採用	デノタスチュアブル配合錠	1錠	沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム			
3. 2. 1 カルシウム剤	内服	採用	乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原	10g	乳酸カルシウム水和物			
3. 2. 2 無機質製剤	内服	採用	アスパラカリウム散50%	50%1g	L-アスパラギン酸カリウム			
3. 2. 2 無機質製剤	内服	採用	アスパラカリウム錠300mg	300mg1錠	L-アスパラギン酸カリウム			
3. 2. 2 無機質製剤	内服	採用	インクレミンシロップ5%	1mL	溶性ピロリン酸第二鉄	後発		
3. 2. 2 無機質製剤	内服	採用	塩化カリウム	10g	塩化カリウム			
3. 2. 2 無機質製剤	内服	採用	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ	鉄50mg1錠	クエン酸第一鉄ナトリウム			
3. 2. 2 無機質製剤	内服	院外	クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8. 3%	1g	クエン酸第一鉄ナトリウム			
3. 2. 2 無機質製剤	内服	採用	ジントス錠50mg	50mg1錠	ヒスチジン亜鉛水和物		劇	
3. 2. 2 無機質製剤	内服	外+限	ソリターT配合顆粒3号	4g1包	ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤			
3. 2. 2 無機質製剤	注射	採用	フェジン静注40mg	40mg2mL1管	含糖酸化鉄			

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク
3. 2. 2 無機質製剤	内服	採用	ホスリボン配合顆粒	100mg1包(リ)	リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウ			
3. 2. 2 無機質製剤	注射	採用	ミネラミック注	2mL1管	塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤			
3. 2. 2 無機質製剤	注射	採用	モノヴァー静注500mg	500mg5mL1	デルイソマルトース第二鉄			
3. 2. 2 無機質製剤	内服	院外	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	50mg1丸	ヨウ化カリウム			
3. 2. 2 無機質製剤	内服	採用	ヨウ化カリウム「コザカイ・M」	1g	ヨウ化カリウム		劇	
3. 2. 3 糖類剤	注射	採用	大塚糖液10%	10%500mL1	精製ブドウ糖			
3. 2. 3 糖類剤	注射	採用	大塚糖液5%	5%100mL1瓶	精製ブドウ糖			
3. 2. 3 糖類剤	注射	採用	大塚糖液5%	5%250mL1袋	精製ブドウ糖			
3. 2. 3 糖類剤	注射	採用	大塚糖液5%	5%50mL1瓶	精製ブドウ糖			
3. 2. 3 糖類剤	注射	採用	大塚糖液50%	50%200mL1	精製ブドウ糖			
3. 2. 3 糖類剤	注射	採用	テルモ糖注5%	5%500mL1袋	精製ブドウ糖			
3. 2. 3 糖類剤	注射	採用	ハイカリックRF輸液	500mL1袋	高カロリー輸液用基本液			
3. 2. 3 糖類剤	内服	採用	ブドウ糖	10g	ブドウ糖			
3. 2. 3 糖類剤	注射	採用	ブドウ糖注5%PL「フソー」	5%20mL1管	精製ブドウ糖			
3. 2. 3 糖類剤	注射	採用	ブドウ糖注50%PL「フソー」	50%20mL1管	精製ブドウ糖			
3. 2. 3 糖類剤	注射	採用	マンニトールS注射液	300mL1袋	D-ソルビトール・D-マンニトール			
3. 2. 5 たん白アミノ酸製剤	内服	採用	アミノレバンEN配合散	10g	肝不全用成分栄養剤			
3. 2. 5 たん白アミノ酸製剤	注射	採用	アミノレバン点滴静注	500mL1袋	肝不全用アミノ酸製剤			
3. 2. 5 たん白アミノ酸製剤	注射	採用	アミパレン輸液	200mL1袋	高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤			
3. 2. 5 たん白アミノ酸製剤	内服	採用	イノソリッド配合経腸用半固形剤	10g	経腸成分栄養剤			
3. 2. 5 たん白アミノ酸製剤	内服	採用	イノラス配合経腸用液	10mL	経腸成分栄養剤			
3. 2. 5 たん白アミノ酸製剤	注射	採用	エルネオパNF1号輸液	1000mL1キッ	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン			
3. 2. 5 たん白アミノ酸製剤	注射	採用	エルネオパNF1号輸液	1500mL1キッ	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン			
3. 2. 5 たん白アミノ酸製剤	注射	採用	エルネオパNF2号輸液	1000mL1キッ	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン			
3. 2. 5 たん白アミノ酸製剤	注射	採用	エルネオパNF2号輸液	1500mL1キッ	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン			
3. 2. 5 たん白アミノ酸製剤	内服	採用	エレンタール配合内用剤	10g	経腸成分栄養剤			
3. 2. 5 たん白アミノ酸製剤	内服	採用	エンシュア・H	10mL	経腸成分栄養剤			
3. 2. 5 たん白アミノ酸製剤	注射	採用	キドミン輸液	200mL1袋	腎不全用アミノ酸製剤			
3. 2. 5 たん白アミノ酸製剤	注射	採用	ビーフリード輸液	500mL1キッ	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン			
3. 2. 5 たん白アミノ酸製剤	内服	採用	ラコールNF配合経腸用液	10mL	経腸成分栄養剤			
3. 2. 5 たん白アミノ酸製剤	内服	採用	リーバクト配合顆粒	4. 15g1包	イソロイシン・ロイシン・バリン			
3. 2. 5 たん白アミノ酸製剤	内服	採用	リーバクト配合経口ゼリー	20g1個	イソロイシン・ロイシン・バリン			
3. 2. 9 その他の滋養強壮薬	注射	採用	イントラリボス輸液20%	20%100mL1	ダイズ油			
3. 3. 1 血液代用剤	注射	採用	KCL注20mEqキット「テルモ」	1モル20mL1	塩化カリウム			カリウム製
3. 3. 1 血液代用剤	注射	採用	塩化ナトリウム注10%「フソー」	10%20mL1管	塩化ナトリウム			
3. 3. 1 血液代用剤	注射	採用	大塚生食注	20mL1管	生理食塩液			
3. 3. 1 血液代用剤	注射	採用	大塚生食注	100mL1瓶	生理食塩液			
3. 3. 1 血液代用剤	注射	採用	大塚生食注	500mL1瓶	生理食塩液			
3. 3. 1 血液代用剤	注射	採用	大塚生食注	1L1瓶	生理食塩液			
3. 3. 1 血液代用剤	注射	採用	大塚生食注	500mL1袋	生理食塩液			
3. 3. 1 血液代用剤	注射	採用	大塚生食注	50mL1瓶	生理食塩液			
3. 3. 1 血液代用剤	注射	採用	大塚生食注	250mL1袋	生理食塩液			
3. 3. 1 血液代用剤	注射	採用	大塚生食注2ポート100mL	100mL1キッ	生理食塩液			
3. 3. 1 血液代用剤	注射	採用	大塚生食注2ポート50mL	50mL1キッ	生理食塩液			
3. 3. 1 血液代用剤	注射	採用	生食注シリンジ「NP」	20mL1筒	生理食塩液			
3. 3. 1 血液代用剤	注射	採用	生食注シリンジ「オーツカ」10mL	10mL1筒	生理食塩液			
3. 3. 1 血液代用剤	注射	採用	生理食塩液	20mL1管	生理食塩液			
3. 3. 1 血液代用剤	注射	採用	生理食塩液	500mL1袋	生理食塩液			
3. 3. 1 血液代用剤	注射	採用	生理食塩液「NP」	5mL1管	生理食塩液			
3. 3. 1 血液代用剤	注射	採用	生理食塩液PL「フソー」	1L1瓶	生理食塩液			
3. 3. 1 血液代用剤	注射	採用	生理食塩液PL「フソー」	2L1袋	生理食塩液			

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク
3. 3. 1 血液代用剤	注射	採用	生理食塩液バッグ「フソー」	1L1袋	生理食塩液			
3. 3. 1 血液代用剤	注射	採用	ソリターT1号輸液	500mL1袋	開始液			
3. 3. 1 血液代用剤	注射	採用	ソリターT1号輸液	200mL1袋	開始液			
3. 3. 1 血液代用剤	注射	採用	ソリターT3号輸液	500mL1袋	維持液			
3. 3. 1 血液代用剤	注射	採用	ソリターT3号輸液	200mL1袋	維持液			
3. 3. 1 血液代用剤	注射	採用	低分子デキストランL注	250mL1袋	乳酸リンゲル液(デキストラン40加)			
3. 3. 1 血液代用剤	注射	採用	ピカナイト輸液	500mL1袋	重炭酸リンゲル液			
3. 3. 1 血液代用剤	注射	採用	フィジオ140輸液	500mL1袋	酢酸リンゲル液(ブドウ糖加)			
3. 3. 1 血液代用剤	注射	採用	フィジオ35輸液	500mL1袋	維持液(ブドウ糖加)			
3. 3. 1 血液代用剤	注射	採用	ボルペン輸液6%	6%500mL1袋	ヒドロキシエチルデンプン130000			
3. 3. 1 血液代用剤	注射	採用	ラクテック注	500mL1袋	乳酸リンゲル液			
3. 3. 1 血液代用剤	注射	採用	リン酸Na補正液0. 5mmol/mL	0. 5モル20mL	リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリウム水和物			
3. 3. 2 止血剤	注射	採用	エトキシスクレロール1%注射液	1%30mL1瓶	ポリリドカノール		劇	
3. 3. 2 止血剤	注射	採用	オルダミン注射用1g	10%10g1瓶	モノエタノールアミノレイン酸塩		劇	
3. 3. 2 止血剤	内服	採用	カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg	30mg1錠	カルバゾクロムスルホン酸Na錠	後発		
3. 3. 2 止血剤	注射	採用	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム	0. 5%10mL1	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物			
3. 3. 2 止血剤	外用	採用	ゼルフォーム	2cm×6cm×0. 3cm	ゼラチン			
3. 3. 2 止血剤	内服	採用	トラネキサム酸錠250mg「日医工」	250mg1錠	トラネキサム酸	後発		
3. 3. 2 止血剤	注射	採用	トラネキサム酸注射液1000mg「NI」	10%10mL1管	トラネキサム酸	後発		
3. 3. 2 止血剤	内服	院外	トランサミン散50%	50%1g	トラネキサム酸			
3. 3. 2 止血剤	外用	採用	トロンビン液モチダ ソフトボトル5千	5000単位5mL	トロンビン			
3. 3. 2 止血剤	注射	採用	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	1%10mLバイ	プロタミン硫酸塩			
3. 3. 3 血液凝固阻止剤	注射	採用	アリクストラ皮下注1. 5mg	1. 5mg0. 3mL	フォンダバリンナトリウム			
3. 3. 3 血液凝固阻止剤	内服	採用	イグザレルト錠2. 5mg	2. 5mg1錠	リバーロキサバン			血液凝固阻止剤
3. 3. 3 血液凝固阻止剤	内服	採用	エリキュース錠2. 5mg	2. 5mg1錠	アビキサバン			血液凝固阻止剤
3. 3. 3 血液凝固阻止剤	内服	採用	エリキュース錠5mg	5mg1錠	アビキサバン			血液凝固阻止剤
3. 3. 3 血液凝固阻止剤	注射	採用	クレキサパン皮下注キット2000IU	2000低分子ヘ	エノキサパリンナトリウム		劇	
3. 3. 3 血液凝固阻止剤	注射	採用	ダルテパリンNa静注4000単位/10mL	4000低分子ヘ	ダルテパリンナトリウム	後発		
3. 3. 3 血液凝固阻止剤	外用	採用	ヒルドイドクリーム0. 3%	1g	ヘパリン類似物質			
3. 3. 3 血液凝固阻止剤	外用	外+限	ヒルドイドソフト軟膏0. 3%	1g	ヘパリン類似物質			
3. 3. 3 血液凝固阻止剤	外用	院外	ヒルドイドローション0. 3%	1g	ヘパリン類似物質			
3. 3. 3 血液凝固阻止剤	内服	採用	ブラザキサカプセル110mg	110mg1カプセル	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩			血液凝固阻止剤
3. 3. 3 血液凝固阻止剤	内服	採用	ブラザキサカプセル75mg	75mg1カプセル	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩			血液凝固阻止剤
3. 3. 3 血液凝固阻止剤	注射	採用	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	5000単位5mL	ヘパリンナトリウム			
3. 3. 3 血液凝固阻止剤	注射	採用	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ	5000単位20mL	ヘパリンナトリウム			
3. 3. 3 血液凝固阻止剤	外用	院外	ヘパリン類似物質外用スプレー0. 3%	1g	ヘパリン類似物質	後発		
3. 3. 3 血液凝固阻止剤	外用	採用	ヘパリン類似物質油性クリーム0. 3%	1g	ヘパリン類似物質	後発		
3. 3. 3 血液凝固阻止剤	外用	採用	ヘパリン類似物質ローション0. 3%「ヒルティ」	1g	ヘパリン類似物質	後発		
3. 3. 3 血液凝固阻止剤	内服	採用	リクシアナOD錠15mg	15mg1錠	エドキサバントシル酸塩水和物			血液凝固阻止剤
3. 3. 3 血液凝固阻止剤	内服	院外	リクシアナOD錠30mg	30mg1錠	エドキサバントシル酸塩水和物			血液凝固阻止剤
3. 3. 3 血液凝固阻止剤	内服	採用	リクシアナOD錠60mg	60mg1錠	エドキサバントシル酸塩水和物			血液凝固阻止剤
3. 3. 3 血液凝固阻止剤	注射	採用	リコモジュリン点滴静注用12800	12800単位1瓶	トロンボモデュリン アルファ(遺伝子組換え)			
3. 3. 3 血液凝固阻止剤	内服	採用	リバーロキサパンOD錠10mg「バイエル」	10mg1錠	リバーロキサパン	後発		血液凝固阻止剤
3. 3. 3 血液凝固阻止剤	内服	採用	リバーロキサパンOD錠15mg「バイエル」	15mg1錠	リバーロキサパン	後発		血液凝固阻止剤
3. 3. 3 血液凝固阻止剤	内服	採用	ワーファリン錠0. 5mg	0. 5mg1錠	ワルファリンカリウム			血液凝固阻止剤
3. 3. 3 血液凝固阻止剤	内服	採用	ワーファリン錠1mg	1mg1錠	ワルファリンカリウム			血液凝固阻止剤
3. 3. 3 血液凝固阻止剤	内服	院外	ワーファリン錠5mg	5mg1錠	ワルファリンカリウム			血液凝固阻止剤
3. 3. 9 その他の血液・体液用薬	注射	採用	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	500mL1キット	ブドウ糖・無機塩類配合剤			
3. 3. 9 その他の血液・体液用薬	内服	採用	エフィエント錠2. 5mg	2. 5mg1錠	プラスグレル塩酸塩			血液凝固阻止剤
3. 3. 9 その他の血液・体液用薬	内服	採用	エフィエント錠3. 75mg	3. 75mg1錠	プラスグレル塩酸塩			血液凝固阻止剤
3. 3. 9 その他の血液・体液用薬	内服	採用	キャピリン配合錠	1錠	アスピリン・ボノブラザンフマル酸塩配合剤			血液凝固阻止剤

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク
3. 3. 9 その他の血液・体液用薬	内服	採用	クロピドグレル錠75mg「SANIK」	75mg1錠	クロピドグレル硫酸塩	後発		血液凝固阻
3. 3. 9 その他の血液・体液用薬	内服	院外	コンブラビン配合錠	1錠	クロピドグレル硫酸塩・アスピリン			血液凝固阻
3. 3. 9 その他の血液・体液用薬	内服	採用	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「	100mg1錠	サルボグレラート塩酸塩	後発		
3. 3. 9 その他の血液・体液用薬	注射	採用	ジースタ皮下注3. 6mgボディーボ	3. 6mg0. 36r	ペグフィングラスチム(遺伝子組換え)			
3. 3. 9 その他の血液・体液用薬	内服	採用	シロスタゾールOD錠100mg「トーワ	100mg1錠	シロスタゾール	後発		血液凝固阻
3. 3. 9 その他の血液・体液用薬	内服	院外	タケルダ配合錠	1錠	アスピリン・ランソプラゾール配合剤			血液凝固阻
3. 3. 9 その他の血液・体液用薬	内服	採用	バイアスピリン錠100mg	100mg1錠	アスピリン	後発		血液凝固阻
3. 3. 9 その他の血液・体液用薬	注射 自注	採用	フィングラスチムBS注75μgシリンジ	75μg0. 3mL	フィングラスチム(遺伝子組換え)	後発		
3. 3. 9 その他の血液・体液用薬	内服	採用	プラスグレルOD錠20mg「DSEP」	20mg1錠	プラスグレル塩酸塩	後発		血液凝固阻
3. 3. 9 その他の血液・体液用薬	注射	採用	ブリズバインド静注液2. 5g	2. 5g50mL1瓶	イダルシズマブ(遺伝子組換え)			
3. 3. 9 その他の血液・体液用薬	内服	採用	ブリリント錠60mg	60mg1錠	チカグレロル			血液凝固阻
3. 3. 9 その他の血液・体液用薬	内服	採用	ブリリント錠90mg	90mg1錠	チカグレロル			血液凝固阻
3. 3. 9 その他の血液・体液用薬	注射	採用	ペグフィングラスチムBS皮下注3. 6	3. 6mg0. 36r	ペグフィングラスチム(遺伝子組換え)	後発		
3. 3. 9 その他の血液・体液用薬	内服	採用	ペラプロストNa錠20μg「オーハラ」	20μg1錠	ペラプロストナトリウム	後発	劇	
3. 3. 9 その他の血液・体液用薬	内服	採用	リマプロストアルファデクス錠5μg「	5μg1錠	リマプロスト アルファデクス	後発		
3. 4. 1 人工腎臓透析用剤	注射	採用	DDライ透析剤3. 0S	2瓶1組	人工透析液			
3. 4. 1 人工腎臓透析用剤	注射	採用	カーボスター透析剤・L	6L1瓶(炭酸水)	人工透析液			
3. 4. 1 人工腎臓透析用剤	注射	採用	キンダリー透析剤2E	2袋1組	人工透析液			
3. 4. 1 人工腎臓透析用剤	注射	採用	キンダリー透析剤AF2号	6L1瓶(炭酸水)	人工透析液			
3. 4. 1 人工腎臓透析用剤	注射	採用	サブラッド血液ろ過用補充液BSG	2020mL1キット	人工透析液			
3. 4. 2 腹膜透析用剤	注射	限定	ペリセート360NL腹膜透析液	1L1袋(排液用)	腹膜透析液			
3. 4. 2 腹膜透析用剤	注射	限定	ペリセート360NL腹膜透析液	1. 5L1袋(排液用)	腹膜透析液			
3. 4. 2 腹膜透析用剤	注射	限定	ペリセート360NL腹膜透析液	2L1袋	腹膜透析液			
3. 4. 2 腹膜透析用剤	注射	限定	ペリセート360NL腹膜透析液	2L1袋(排液用)	腹膜透析液			
3. 4. 2 腹膜透析用剤	注射	限定	ペリセート360NL腹膜透析液	3L1袋	腹膜透析液			
3. 4. 2 腹膜透析用剤	注射	限定	ペリセート360NL腹膜透析液	2L1袋	腹膜透析液			
3. 4. 2 腹膜透析用剤	注射	限定	ペリセート360NL腹膜透析液	1L1袋(排液用)	腹膜透析液			
3. 4. 2 腹膜透析用剤	注射	限定	ペリセート360NL腹膜透析液	1. 5L1袋(排液用)	腹膜透析液			
3. 4. 2 腹膜透析用剤	注射	限定	ペリセート360NL腹膜透析液	2L1袋(排液用)	腹膜透析液			
3. 4. 2 腹膜透析用剤	注射	限定	ペリセート360NL腹膜透析液	3L1袋	腹膜透析液			
3. 4. 2 腹膜透析用剤	注射	限定	ペリセート360NL腹膜透析液	3L1袋	腹膜透析液			
3. 4. 2 腹膜透析用剤	注射	限定	ペリセート400NL腹膜透析液	1L1袋(排液用)	腹膜透析液			
3. 4. 2 腹膜透析用剤	注射	限定	ペリセート400NL腹膜透析液	1. 5L1袋(排液用)	腹膜透析液			
3. 4. 2 腹膜透析用剤	注射	限定	ペリセート400NL腹膜透析液	2L1袋	腹膜透析液			
3. 4. 2 腹膜透析用剤	注射	限定	ペリセート400NL腹膜透析液	2L1袋(排液用)	腹膜透析液			
3. 4. 2 腹膜透析用剤	注射	限定	ペリセート400NL腹膜透析液	3L1袋	腹膜透析液			
3. 4. 2 腹膜透析用剤	注射	限定	ペリセート400NL腹膜透析液	2L1袋	腹膜透析液			
3. 4. 2 腹膜透析用剤	注射	限定	ペリセート400NL腹膜透析液	1L1袋(排液用)	腹膜透析液			
3. 4. 2 腹膜透析用剤	注射	限定	ペリセート400NL腹膜透析液	1. 5L1袋(排液用)	腹膜透析液			
3. 4. 2 腹膜透析用剤	注射	限定	ペリセート400NL腹膜透析液	2L1袋(排液用)	腹膜透析液			
3. 4. 2 腹膜透析用剤	注射	限定	ペリセート400NL腹膜透析液	3L1袋	腹膜透析液			
3. 9. 1 肝臓疾患用剤	内服	採用	グリチロン配合錠	1錠	グリチルリチン・グリシン・DL-メチオニン配合剤			
3. 9. 1 肝臓疾患用剤	注射 自注	採用	ネオファーゲン静注20mL	20mL1管	グリチルリチン・グリシン	後発		
3. 9. 2 解毒剤	内服	院外	ジャドニユ顆粒分包360mg	360mg1包	デフェランロクス		劇	
3. 9. 2 解毒剤	内服	院外	ジャドニユ顆粒分包90mg	90mg1包	デフェランロクス		劇	
3. 9. 2 解毒剤	注射	採用	スガマデクス静注液200mg「マルイ	200mg2mL1瓶	スガマデクスナトリウム	後発		
3. 9. 2 解毒剤	注射	採用	炭酸水素Na静注1. 26%バッグ「フ	1. 26%1L1袋	炭酸水素ナトリウム			
3. 9. 2 解毒剤	注射	採用	パム静注500mg	2. 5%20mL1管	ブラリドキシムヨウ化物			
3. 9. 2 解毒剤	注射	採用	メイロン静注7%	7%20mL1管	炭酸水素ナトリウム			
3. 9. 2 解毒剤	注射	採用	メイロン静注7%	7%250mL1袋	炭酸水素ナトリウム			
3. 9. 2 解毒剤	内服	院外	ユーゼル錠25mg	25mg1錠	ホリナートカルシウム水和物			抗悪性腫瘍
3. 9. 2 解毒剤	注射	採用	レボホリナート点滴静注用100mg「	100mg1瓶	レボホリナートカルシウム水和物			抗悪性腫瘍

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク
3. 9. 2 解毒剤	注射	採用	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤ	25mg1瓶	レボホリナートカルシウム水和物			抗悪性腫瘍
3. 9. 3 習慣性中毒用剤	内服	院外	ノックピン原末	1g	ジスルフィラム		劇	
3. 9. 4 痛風治療剤	内服	採用	アロプリノール錠100mg「ケミファ」	100mg1錠	アロプリノール	後発		
3. 9. 4 痛風治療剤	内服	採用	ウリアデック錠40mg	40mg1錠	トピロキソスタット			
3. 9. 4 痛風治療剤	内服	採用	クエンメット配合錠	1錠	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物			
3. 9. 4 痛風治療剤	内服	採用	コルヒチン錠0. 5mg「タカタ」	0. 5mg1錠	コルヒチン		劇	
3. 9. 4 痛風治療剤	内服	採用	フェブキソスタット錠20mg「トーワ」	20mg1錠	フェブキソスタット	後発		
3. 9. 4 痛風治療剤	内服	採用	ユリス錠1mg	1mg1錠	ドチヌラド			
3. 9. 4 痛風治療剤	内服	院外	ユリノーム錠50mg	50mg1錠	ベンズプロマロン		劇	
3. 9. 5 酵素製剤	注射	採用	ウロナーゼ静注用6万単位	60000単位1瓶	ウロキナーゼ			
3. 9. 5 酵素製剤	注射	採用	グルトバ注600万	600万国際単位	アルテブラーゼ(遺伝子組換え)			
3. 9. 5 酵素製剤	注射	採用	デフィブラーゼ点滴静注液10単位	10単位1管	バトロキソピン		劇	
3. 9. 5 酵素製剤	外用	採用	プロメライン軟膏5万単位/g*(ジェ	50000単位1g	プロメライン			
3. 9. 6 糖尿病用剤	内服	院外	イニシク配合錠	1錠	アログリブチン安息香酸塩・メホルミン		劇	糖尿病用剤
3. 9. 6 糖尿病用剤	内服	院外	エクア錠50mg	50mg1錠	ビルダグリブチン			糖尿病用剤
3. 9. 6 糖尿病用剤	内服	院外	エクメット配合錠HD	1錠	ビルダグリブチン・メホルミン塩酸塩		劇	糖尿病用剤
3. 9. 6 糖尿病用剤	内服	院外	エクメット配合錠LD	1錠	ビルダグリブチン・メホルミン塩酸塩		劇	糖尿病用剤
3. 9. 6 糖尿病用剤	内服	院外	オイグルコン錠1. 25mg	1. 25mg1錠	グリベンクラミド		劇	糖尿病用剤
3. 9. 6 糖尿病用剤	内服	院外	カナグル錠100mg	100mg1錠	カナグリフロジン水和物			糖尿病用剤
3. 9. 6 糖尿病用剤	内服	院外	カナリア配合OD錠	1錠	テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物・カナグリフ			糖尿病用剤
3. 9. 6 糖尿病用剤	内服	採用	グリミクロン錠40mg	40mg1錠	グリクラジド		劇	糖尿病用剤
3. 9. 6 糖尿病用剤	内服	採用	グリメピリド錠1mg「Me」	1mg1錠	グリメピリド		劇	糖尿病用剤
3. 9. 6 糖尿病用剤	内服	採用	グルベス配合錠	1錠	ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース配合			糖尿病用剤
3. 9. 6 糖尿病用剤	内服	院外	ザファテック錠100mg	100mg1錠	トレラグリブチンコハク酸塩			糖尿病用剤
3. 9. 6 糖尿病用剤	内服	採用	ジャディアンス錠10mg	10mg1錠	エンパグリフロジン			糖尿病用剤
3. 9. 6 糖尿病用剤	内服	採用	ジャディアンス錠25mg	25mg1錠	エンパグリフロジン			糖尿病用剤
3. 9. 6 糖尿病用剤	内服	採用	ジャズビア錠50mg	50mg1錠	シタグリブチンリン酸塩水和物			糖尿病用剤
3. 9. 6 糖尿病用剤	内服	採用	スーグラ錠50mg	50mg1錠	イブラグリフロジン L-プロリン			糖尿病用剤
3. 9. 6 糖尿病用剤	内服	院外	スージャ配合錠	1錠	シタグリブチンリン酸塩水和物・イブラグリフロジン			糖尿病用剤
3. 9. 6 糖尿病用剤	注射 自注	院外	ソリクア配合注ソロスター	1キット	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)		劇	糖尿病用剤
3. 9. 6 糖尿病用剤	内服	採用	ダバグリフロジン錠5mg「サワイ」	5mg1錠	ダバグリフロジンプロピレ	後発		糖尿病用剤
3. 9. 6 糖尿病用剤	内服	採用	ツイミグ錠500mg	500mg1錠	イメグリミン塩酸塩			糖尿病用剤
3. 9. 6 糖尿病用剤	内服	採用	テネリアOD錠20mg	20mg1錠	テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物			糖尿病用剤
3. 9. 6 糖尿病用剤	内服	院外	デベルザ錠20mg	20mg1錠	トホグリフロジン水和物			糖尿病用剤
3. 9. 6 糖尿病用剤	内服	採用	トラゼンタ錠5mg	5mg1錠	リナグリブチン			糖尿病用剤
3. 9. 6 糖尿病用剤	内服	院外	トラディアンス配合錠AP	1錠	エンパグリフロジン・リナグリブチン配合剤			糖尿病用剤
3. 9. 6 糖尿病用剤	内服	院外	トラディアンス配合錠BP	1錠	エンパグリフロジン・リナグリブチン配合剤			糖尿病用剤
3. 9. 6 糖尿病用剤	内服	採用	ネシーナ錠12. 5mg	12. 5mg1錠	アログリブチン安息香酸塩			糖尿病用剤
3. 9. 6 糖尿病用剤	内服	院外	ネシーナ錠25mg	25mg1錠	アログリブチン安息香酸塩			糖尿病用剤
3. 9. 6 糖尿病用剤	内服	採用	ピオグリタゾンOD錠30mg「ケミファ」	30mg1錠	ピオグリタゾン塩酸塩	後発		糖尿病用剤
3. 9. 6 糖尿病用剤	内服	採用	フォシーガ錠10mg	10mg1錠	ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物			糖尿病用剤
3. 9. 6 糖尿病用剤	内服	院外	フォシーガ錠5mg	5mg1錠	ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物			糖尿病用剤
3. 9. 6 糖尿病用剤	内服	採用	ボグリボースOD錠0. 3mg「武田テ	0. 3mg1錠	ボグリボース	後発		糖尿病用剤
3. 9. 6 糖尿病用剤	内服	採用	ミグリトールOD錠50mg「サワイ」	50mg1錠	ミグリトール	後発		糖尿病用剤
3. 9. 6 糖尿病用剤	内服	採用	ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」	10mg1錠	ミチグリニドカルシウム水	後発		糖尿病用剤
3. 9. 6 糖尿病用剤	内服	採用	メホルミン塩酸塩錠250mgMT「D	250mg1錠	メホルミン塩酸塩		劇	糖尿病用剤
3. 9. 6 糖尿病用剤	内服	院外	ルセフィ錠2. 5mg	2. 5mg1錠	ルセオグリフロジン水和物			糖尿病用剤
3. 9. 6 糖尿病用剤	内服	採用	レパグリニド錠0. 25mg「サワイ」	0. 25mg1錠	レパグリニド	後発	劇	糖尿病用剤
3. 9. 6 糖尿病用剤	内服	院外	レパグリニド錠0. 5mg「サワイ」	0. 5mg1錠	レパグリニド	後発	劇	糖尿病用剤
3. 9. 9 他に分類されない代謝性	注射	採用	ATP注20mg「イセイ」	20mg1管	アデノシン三リン酸二ナ	後発		
3. 9. 9 他に分類されない代謝性	内服	採用	アザニン錠50mg	50mg1錠	アザチオプリン			免疫抑制剤

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク	
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	注射 自注	採用	アダリムマブBS皮下注40mgペン0	40mg0. 4mL	アダリムマブ(遺伝子組換え)	後発	劇	免疫抑制薬
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	注射 自注	採用	アダリムマブBS皮下注80mgペン0	80mg0. 8mL	アダリムマブ(遺伝子組換え)	後発	劇	免疫抑制薬
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	内服	採用	アデホスコウ顆粒10%	10%1g	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物			
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	内服	採用	アデホスコウ腸溶錠60	60mg1錠	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物			
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	注射	採用	アルツディスポ関節注25mg	1%2. 5mL1筒	精製ヒアルロン酸ナトリウム			
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	注射	採用	イバンドロン酸静注1mgシリンジ「V	1mg1mL1筒	イバンドロン酸ナトリウム	後発	劇	
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	注射	採用	イベニティ皮下注105mgシリンジ	105mg1. 17r	ロモソズマブ(遺伝子組換え)			
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	注射	採用	ウパシタ静注透析用25 μgシリンジ	25 μg1mL1筒	ウパシカルセトナトリウム水和物		劇	
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	注射	採用	ウパシタ静注透析用50 μgシリンジ	50 μg1mL1筒	ウパシカルセトナトリウム水和物		劇	
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	注射	限定	エスポー皮下用24000シリンジ	24000国際単位	エポエチン アルファ(遺伝子組換え)		劇	
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	内服	外＋限	エドリス錠50mg	50mg1錠	アナモレリン塩酸塩		劇	
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	内服	採用	エナロイ錠2mg	2mg1錠	エナロデュスタット		劇	
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	内服	採用	エナロイ錠4mg	4mg1錠	エナロデュスタット		劇	
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	内服	採用	エパルレスタット錠50mg「VTRS」	50mg1錠	エパルレスタット	後発		
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	内服	採用	エビスタ錠60mg	60mg1錠	ラロキシフェン塩酸塩			
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	内服	院外	エベレンゾ錠100mg	100mg1錠	ロキサデュスタット		劇	
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	内服	採用	エベレンゾ錠20mg	20mg1錠	ロキサデュスタット		劇	
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	内服	採用	エベレンゾ錠50mg	50mg1錠	ロキサデュスタット		劇	
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	注射	採用	エポエチンアルファBS注1500シリン	1500国際単位	エポエチン カップ(遺伝子組換え)	後発	劇	
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	注射	採用	エポエチンアルファBS注3000シリン	3000国際単位	エポエチン カップ(遺伝子組換え)	後発	劇	
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	内服	院外	エルカルチンFF錠100mg	100mg1錠	レボカルニチン			
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	内服	院外	エルカルチンFF錠250mg	250mg1錠	レボカルニチン			
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	注射	採用	エルカルチンFF静注1000mgシリン	1000mg5mL	レボカルニチン			
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	内服	外＋限	エルカルチンFF内用液10%	10%1mL	レボカルニチン			
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	内服	院外	エルカルチンFF内用液10%分包10	10%10mL1包	レボカルニチン			
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	内服	院外	エルカルチンFF内用液10%分包5m	10%5mL1包	レボカルニチン			
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	注射	採用	エルシトニン注20Sディスポ	20エルカトニン	エルカトニン		劇	
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	注射	採用	エルシトニン注40単位	40エルカトニン	エルカトニン		劇	
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	注射 自注	院外	エンブレル皮下注25mgシリンジ0.	25mg0. 5mL	エタネルセプト(遺伝子組換え)		劇	免疫抑制薬
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	注射 自注	院外	エンブレル皮下注50mgペン1. 0m	50mg1mL1キ	エタネルセプト(遺伝子組換え)		劇	免疫抑制薬
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	注射	採用	オザグレルNa点滴静注液80mg「ケ	80mg4mL1管	オザグレルナトリウム	後発		
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	内服	院外	オテズラ錠10mg	10mg1錠	アプレミラスト		劇	
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	内服	院外	オテズラ錠20mg	20mg1錠	アプレミラスト		劇	
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	内服	院外	オテズラ錠30mg	30mg1錠	アプレミラスト		劇	
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	内服	採用	オルケディア錠1mg	1mg1錠	エボカルセト		劇	
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	内服	採用	オルケディア錠2mg	2mg1錠	エボカルセト		劇	
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	内服	採用	オルケディア錠4mg	4mg1錠	エボカルセト		劇	
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	内服	採用	オルミエント錠2mg	2mg1錠	バリシチニブ		劇	免疫抑制薬
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	内服	採用	オルミエント錠4mg	4mg1錠	バリシチニブ		劇	免疫抑制薬
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	注射	限定	オレンシア点滴静注用250mg	250mg1瓶	アバタセプト(遺伝子組換え)		劇	免疫抑制薬
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	注射 自注	限定	オレンシア皮下注125mgオートイン	125mg1mL1	アバタセプト(遺伝子組換え)		劇	免疫抑制薬
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	注射	採用	ガベキサートメシル酸塩注射用500	500mg1瓶	ガベキサートメシル酸塩		劇	
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	内服	採用	カモスタットメシル酸塩錠100mg「サ	100mg1錠	カモスタットメシル酸塩			
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	内服	採用	ケアラム錠25mg	25mg1錠	イグラチモド		劇	免疫抑制薬
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	内服	院外	ジセラカ錠100mg	100mg1錠	フィルゴチニブマレイン酸塩		劇	免疫抑制薬
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	内服	院外	ジセラカ錠200mg	200mg1錠	フィルゴチニブマレイン酸塩		劇	免疫抑制薬
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	内服	院外	ジレニアカプセル0. 5mg	0. 5mg1カプセ	フィンゴリモド塩酸塩		劇	
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	注射 自注	採用	シンボニー皮下注50mgオートインシ	50mg0. 5mL	ゴリムマブ(遺伝子組換え)		劇	免疫抑制薬
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	注射	採用	ゾレドロン酸点滴静注4mg／100m	4mg100mL1	ゾレドロン酸水和物	後発	劇	抗悪性腫瘍薬
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	内服	採用	タクロリムス錠1mg「あゆみ」	1mg1錠	タクロリムス水和物	後発	劇	免疫抑制薬
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	内服	院外	ダーブロック錠1mg	1mg1錠	ダブロデュスタット		劇	

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	内服	採用	ダーブロック錠2mg	2mg1錠	ダブロデスタット		
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	内服	採用	ダーブロック錠4mg	4mg1錠	ダブロデスタット		
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	注射	採用	ダルベポエチン アルファ注10 μ gシ	10 μ g0. 5mL	ダルベポエチン アルファ	後発	
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	注射	採用	ダルベポエチン アルファ注120 μ gシ	120 μ g0. 5m	ダルベポエチン アルファ	後発	
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	注射	採用	ダルベポエチン アルファ注15 μ gシ	15 μ g0. 5mL	ダルベポエチン アルファ	後発	
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	注射	採用	ダルベポエチン アルファ注180 μ gシ	180 μ g0. 5m	ダルベポエチン アルファ	後発	
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	注射	採用	ダルベポエチン アルファ注20 μ gシ	20 μ g0. 5mL	ダルベポエチン アルファ	後発	
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	注射	採用	ダルベポエチン アルファ注30 μ gシ	30 μ g0. 5mL	ダルベポエチン アルファ	後発	
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	注射	採用	ダルベポエチン アルファ注40 μ gシ	40 μ g0. 5mL	ダルベポエチン アルファ	後発	
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	注射	採用	ダルベポエチン アルファ注5 μ gシリ	5 μ g0. 5mL1	ダルベポエチン アルファ	後発	
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	注射	採用	ダルベポエチン アルファ注60 μ gシ	60 μ g0. 5mL	ダルベポエチン アルファ	後発	
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	注射	限定	注射用エラスポール100	100mg1瓶	シベレスタットナトリウム水和物		
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	注射	採用	ナファモスタットメシル酸塩注射用10	10mg1瓶	ナファモスタットメシル酸塩		
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	注射	採用	ナファモスタットメシル酸塩注射用15	150mg1瓶	ナファモスタットメシル酸塩		
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	内服	採用	ネオーラル10mgカプセル	10mg1カプセル	シクロスポリン		免疫抑制薬
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	内服	院外	ネオーラル25mgカプセル	25mg1カプセル	シクロスポリン		免疫抑制薬
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	内服	採用	ネオーラル50mgカプセル	50mg1カプセル	シクロスポリン		免疫抑制薬
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	内服	院外	バフセオ錠150mg	150mg1錠	バダデュスタット		
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	内服	院外	バフセオ錠300mg	300mg1錠	バダデュスタット		
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	内服	採用	ビビアント錠20mg	20mg1錠	バゼドキシフェン酢酸塩		
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	注射	自注 限定	ヒュミラ皮下注40mgペン0. 4mL	40mg0. 4mL	アダリママブ(遺伝子組換え)		免疫抑制薬
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	注射	自注 限定	ヒュミラ皮下注80mgペン0. 8mL	80mg0. 8mL	アダリママブ(遺伝子組換え)		免疫抑制薬
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	内服	外+限	ビルスバ錠200mg	200mg1錠	ビルフェニドン		
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	注射	採用	ブラリアHI皮下注60mgシリンジ0. 5	60mg0. 5mL	デノスマブ(遺伝子組換え)		免疫抑制薬
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	内服	採用	ブレディニン錠50	50mg1錠	ミゾリビン		免疫抑制薬
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	内服	院外	ボナロン経口ゼリー35mg	35mg1包	アレンドロン酸ナトリウム水和物		
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	内服	院外	マスーレッド錠12. 5mg	12. 5mg1錠	モリデュスタットナトリウム		
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	内服	院外	マスーレッド錠25mg	25mg1錠	モリデュスタットナトリウム		
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	内服	院外	マスーレッド錠5mg	5mg1錠	モリデュスタットナトリウム		
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	内服	院外	マスーレッド錠75mg	75mg1錠	モリデュスタットナトリウム		
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	内服	採用	ミノドロン酸錠50mg「日医工」	50mg1錠	ミノドロン酸水和物	後発	
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	注射	採用	ミラクリッド注射液5万単位	50000単位1m	ウリナスタチン		
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	注射	採用	ミルセラ注シリンジ100 μ g	100 μ g0. 3m	エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組	劇	
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	注射	採用	ミルセラ注シリンジ150 μ g	150 μ g0. 3m	エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組	劇	
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	注射	採用	ミルセラ注シリンジ25 μ g	25 μ g0. 3mL	エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組	劇	
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	注射	採用	ミルセラ注シリンジ50 μ g	50 μ g0. 3mL	エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組	劇	
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	注射	採用	ミルセラ注シリンジ75 μ g	75 μ g0. 3mL	エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組	劇	
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	内服	採用	ラクツロースシロップ65%「タカタ」	65%1mL	ラクツロース		
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	内服	採用	ラグノスNF経口ゼリー分包12g	54. 167%12g	ラクツロース	後発	
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	注射	採用	ランマークHI皮下注120mgシリンジ	120mg1mL1	デノスマブ(遺伝子組換え)		抗悪性腫瘍
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	内服	採用	リウマトレックスカプセル2mg	2mg1カプセル	メトレキサート		免疫抑制薬
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	注射	採用	リクラスト点滴静注液5mg	5mg100mL1	ゾレドロン酸水和物		
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	内服	採用	リセドロン酸Na錠17. 5mg「サワイ	17. 5mg1錠	リセドロン酸ナトリウム水	後発	
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	内服	院外	リンヴォック錠15mg	15mg1錠	ウパダシニブ水和物		免疫抑制薬
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	内服	院外	リンヴォック錠30mg	30mg1錠	ウパダシニブ水和物		免疫抑制薬
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	内服	院外	リンヴォック錠45mg	45mg1錠	ウパダシニブ水和物		免疫抑制薬
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	内服	院外	リンヴォック錠7. 5mg	7. 5mg1錠	ウパダシニブ水和物		免疫抑制薬
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	内服	院外	レグバラ錠25mg	25mg1錠	シナカルセット塩酸塩		
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	内服	院外	レボレード錠12. 5mg	12. 5mg1錠	エルトロンボパグ オラミン		
3. 9. 9	他に分類されない代謝性	内服	院外	レボレード錠25mg	25mg1錠	エルトロンボパグ オラミン		
4. 2. 1	アルキル化剤	内服	採用	エンドキサン錠50mg	50mg1錠	シクロホスファミド水和物		抗悪性腫瘍

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク
4. 2. 1 アルキル化剤	外用	採用	ギリアデル脳内留置用剤7. 7mg	7. 7mg1枚	カルムスチン		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 1 アルキル化剤	注射	限定	注射用イホマイド1g	1g1瓶	イホスファミド		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 1 アルキル化剤	注射	採用	注射用エンドキサン100mg	100mg1瓶	シクロホスファミド水和物		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 1 アルキル化剤	注射	採用	注射用エンドキサン500mg	500mg1瓶	シクロホスファミド水和物		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 1 アルキル化剤	内服	限定	テモゾロミド錠100mg「NK」	100mg1錠	テモゾロミド	後発	毒	抗悪性腫瘍
4. 2. 1 アルキル化剤	内服	限定	テモゾロミド錠20mg「NK」	20mg1錠	テモゾロミド	後発	毒	抗悪性腫瘍
4. 2. 2 代謝拮抗剤	内服	採用	エスワンタイハウ配合OD錠T20	20mg1錠(テガフル・ギメラシル・ウラシル)	テガフル・ギメラシル・ウラシル	後発	劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 2 代謝拮抗剤	内服	採用	エスワンタイハウ配合OD錠T25	25mg1錠(テガフル・ギメラシル・ウラシル)	テガフル・ギメラシル・ウラシル	後発	劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 2 代謝拮抗剤	内服	採用	カベシタビン錠300mg「ヤクルト」	300mg1錠	カベシタビン	後発	劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 2 代謝拮抗剤	注射	採用	ゲムシタビン点滴静注用1g「NK」	1g1瓶	ゲムシタビン塩酸塩	後発	劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 2 代謝拮抗剤	注射	採用	ゲムシタビン点滴静注用200mg「NK」	200mg1瓶	ゲムシタビン塩酸塩	後発	劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 2 代謝拮抗剤	注射	限定	注射用メトトレキサート50mg	50mg1瓶	メトトレキサート		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 2 代謝拮抗剤	内服	採用	ハイドレアカプセル500mg	500mg1カプセル	ヒドロキシカルバミド		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 2 代謝拮抗剤	注射	採用	フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	1000mg1瓶	フルオロウラシル		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 2 代謝拮抗剤	注射	採用	フルオロウラシル注250mg「トーワ」	250mg1瓶	フルオロウラシル		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 2 代謝拮抗剤	注射	採用	ペメトレキセド点滴静注液100mg「N」	100mg4mL1瓶	ペメトレキセドナトリウム水和物	後発	劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 2 代謝拮抗剤	注射	採用	ペメトレキセド点滴静注液500mg「N」	500mg20mL1瓶	ペメトレキセドナトリウム水和物	後発	劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 2 代謝拮抗剤	注射	採用	ペメトレキセド点滴静注液800mg「N」	800mg32mL1瓶	ペメトレキセドナトリウム水和物	後発	劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 2 代謝拮抗剤	注射	限定	メトトレキサート点滴静注液200mg	200mg8mL1瓶	メトトレキサート		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 2 代謝拮抗剤	内服	院外	ユーエフティE配合顆粒T100	100mg1包(テガフル・ウラシル)	テガフル・ウラシル		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 2 代謝拮抗剤	内服	院外	ユーエフティE配合顆粒T150	150mg1包(テガフル・ウラシル)	テガフル・ウラシル		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 2 代謝拮抗剤	内服	院外	ユーエフティE配合顆粒T200	200mg1包(テガフル・ウラシル)	テガフル・ウラシル		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 3 抗腫瘍性抗生物質製剤	注射	採用	エピルビン塩酸塩注射用10mg「N」	10mg1瓶	エピルビン塩酸塩	後発	劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 3 抗腫瘍性抗生物質製剤	注射	採用	エピルビン塩酸塩注射用50mg「N」	50mg1瓶	エピルビン塩酸塩	後発	劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 3 抗腫瘍性抗生物質製剤	注射	採用	カルセド注射用20mg	20mg1瓶	アムルビン塩酸塩		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 3 抗腫瘍性抗生物質製剤	注射	限定	ドキシル注20mg	20mg10mL1瓶	ドキシソルビン塩酸塩		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 3 抗腫瘍性抗生物質製剤	注射	採用	ドキシソルビン塩酸塩注射用10mg「N」	10mg1瓶	ドキシソルビン塩酸塩	後発	劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 3 抗腫瘍性抗生物質製剤	注射	採用	ドキシソルビン塩酸塩注射用50mg「N」	50mg1瓶	ドキシソルビン塩酸塩	後発	劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 3 抗腫瘍性抗生物質製剤	注射	採用	ビノルビン注射用30mg	30mg1瓶	ビノルビン塩酸塩		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 3 抗腫瘍性抗生物質製剤	注射	限定	ブレオ注射用15mg	15mg1瓶	ブレオマイシン塩酸塩		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 4 抗腫瘍性植物成分製剤	注射	採用	アブラキサン点滴静注用100mg	100mg1瓶	バクリタキセル(アルブミン懸濁型)	毒 特生	劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 4 抗腫瘍性植物成分製剤	注射	採用	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg	100mg5mL1瓶	イリノテカン塩酸塩水和物	後発	劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 4 抗腫瘍性植物成分製剤	注射	採用	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg	40mg2mL1瓶	イリノテカン塩酸塩水和物		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 4 抗腫瘍性植物成分製剤	注射	採用	エトボシド点滴静注液100mg「サン」	100mg5mL1瓶	エトボシド	後発	劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 4 抗腫瘍性植物成分製剤	注射	限定	オニバド点滴静注43mg	43mg10mL1瓶	イリノテカン塩酸塩水和物		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 4 抗腫瘍性植物成分製剤	注射	限定	オンコピン注射用1mg	1mg1瓶	ビンクリスチン硫酸塩		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 4 抗腫瘍性植物成分製剤	注射	採用	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL	20mg1mL1瓶	ドセタキセル水和物	後発	毒	抗悪性腫瘍
4. 2. 4 抗腫瘍性植物成分製剤	注射	採用	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL	80mg4mL1瓶	ドセタキセル水和物	後発	毒	抗悪性腫瘍
4. 2. 4 抗腫瘍性植物成分製剤	注射	限定	ハイカムチン注射用1. 1mg	1. 1mg1瓶	ノギテカン塩酸塩		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 4 抗腫瘍性植物成分製剤	注射	採用	パクリタキセル注100mg/16. 7mL	100mg16. 7mL1瓶	パクリタキセル		毒	抗悪性腫瘍
4. 2. 4 抗腫瘍性植物成分製剤	注射	採用	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	30mg5mL1瓶	パクリタキセル		毒	抗悪性腫瘍
4. 2. 4 抗腫瘍性植物成分製剤	注射	採用	ラストテツ注100mg/5mL	100mg5mL1瓶	エトボシド		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 4 抗腫瘍性植物成分製剤	注射	限定	ロゼウス静注液10mg	10mg1mL1瓶	ビノレルビン酒石酸塩	後発	毒	抗悪性腫瘍
4. 2. 4 抗腫瘍性植物成分製剤	注射	限定	ロゼウス静注液40mg	40mg4mL1瓶	ビノレルビン酒石酸塩	後発	毒	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	注射	限定	アクブラ静注用100mg	100mg1瓶	ネダブラチン		毒	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	注射	限定	アクブラ静注用10mg	10mg1瓶	ネダブラチン		毒	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	採用	アナストロゾール錠1mg「NK」	1mg1錠	アナストロゾール	後発	劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	注射	採用	アービタックス注射液100mg	100mg20mL1瓶	セツキシマブ(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	限定	アフィニール錠5mg	5mg1錠	エベロリムス		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	外+限	イクスタンジ錠40mg	40mg1錠	エンザルタミド		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	外+限	イクスタンジ錠80mg	80mg1錠	エンザルタミド		劇	抗悪性腫瘍

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	採用	イブランス錠125mg	125mg1錠	バルボシクリブ		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	採用	イブランス錠25mg	25mg1錠	バルボシクリブ		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	注射	採用	イミフィンジ点滴静注120mg	120mg2. 4m	デュルバルマブ(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	注射	採用	イミフィンジ点滴静注500mg	500mg10mL	デュルバルマブ(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	限定	イレツサ錠250	250mg1錠	ゲフィチニブ		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	採用	エキセメスタン錠25mg「NK」	25mg1錠	エキセメスタン	後発		抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	注射	採用	エリブリンメシル酸塩静注液1mg「ニ	1mg2mL1瓶	エリブリンメシル酸塩	後発	毒	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	注射	採用	エンハーツ点滴静注用100mg	100mg1瓶	トラスツズマブ デルクステカン(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	注射	採用	オキサリプラチン点滴静注液100mg	100mg20mL	オキサリプラチン	後発	毒	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	注射	採用	オキサリプラチン点滴静注液50mg「	50mg10mL1	オキサリプラチン	後発	毒	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	採用	オダイン錠125mg	125mg1錠	フルタミド		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	注射	限定	オブジーボ点滴静注120mg	120mg12mL	ニボルマブ(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	注射	採用	オブジーボ点滴静注240mg	240mg24mL	ニボルマブ(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	注射	採用	カドサイラ点滴静注用100mg	100mg1瓶	トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	注射	採用	カドサイラ点滴静注用160mg	160mg1瓶	トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	注射	採用	カルボプラチン注射液150mg「NK」	150mg15mL	カルボプラチン		毒	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	注射	採用	カルボプラチン注射液50mg「NK」	50mg5mL1瓶	カルボプラチン		毒	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	注射	採用	カルボプラチン点滴静注液150mg「	150mg15mL	カルボプラチン		毒	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	注射	採用	カルボプラチン点滴静注液50mg「N	50mg5mL1瓶	カルボプラチン		毒	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	注射	採用	キイトルーダ点滴静注100mg	100mg4mL1	ベムブロリズマブ(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	採用	グリベック錠100mg	100mg1錠	イマチニブメシル酸塩		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	院外	ザイティガ錠250mg	250mg1錠	アビラテロン酢酸エステル		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	院外	ザイティガ錠500mg	500mg1錠	アビラテロン酢酸エステル		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	注射	採用	サイラムザ点滴静注液100mg	100mg10mL	ラムシルマブ(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	注射	採用	サイラムザ点滴静注液500mg	500mg50mL	ラムシルマブ(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	限定	ザーコリカプセル200mg	200mg1カプセ	クリゾチニブ		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	限定	ザーコリカプセル250mg	250mg1カプセ	クリゾチニブ		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	注射	採用	ザルトラップ点滴静注100mg	100mg4mL1	アフリベルセプト ベータ(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	注射	採用	ザルトラップ点滴静注200mg	200mg8mL1	アフリベルセプト ベータ(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	限定	ジオトリフ錠20mg	20mg1錠	アフアチニブマレイン酸塩		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	限定	ジオトリフ錠30mg	30mg1錠	アフアチニブマレイン酸塩		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	限定	ジオトリフ錠40mg	40mg1錠	アフアチニブマレイン酸塩		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	注射	採用	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ	10mg20mL1	シスプラチン		毒	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	注射	採用	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ	50mg100mL	シスプラチン		毒	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	採用	スチバーガ錠40mg	40mg1錠	レゴラフェニブ水和物		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	院外	スーテントカプセル12. 5mg	12. 5mg1カプ	スニチニブリンゴ酸塩		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	外+限	タイケルブ錠250mg	250mg1錠	ラパチニブチル酸塩水和物		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	限定	タグリッソ錠40mg	40mg1錠	オシメルチニブメシル酸塩		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	限定	タグリッソ錠80mg	80mg1錠	オシメルチニブメシル酸塩		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	院外	タスルゴ錠35mg	35mg1錠	タスルグラチニブコハク酸塩		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	採用	タモキシフェン錠20mg「MYL」	20mg1錠	タモキシフェン酸塩	後発		抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	限定	タルセバ錠100mg	100mg1錠	エルロチニブ塩酸塩		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	限定	タルセバ錠150mg	150mg1錠	エルロチニブ塩酸塩		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	限定	タルセバ錠25mg	25mg1錠	エルロチニブ塩酸塩		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	院外	ツカイザ錠150mg	150mg1錠	ツカチニブ エタノール付加物		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	院外	ツカイザ錠50mg	50mg1錠	ツカチニブ エタノール付加物		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	注射	採用	テセントリク点滴静注1200mg	1200mg20m	アテゾリズマブ(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	注射	採用	テセントリク点滴静注840mg	840mg14mL	アテゾリズマブ(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	注射	採用	動注用アイエーコール100mg	100mg1瓶	シスプラチン		毒	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	注射	採用	トラスツズマブBS点滴静注用150m	150mg1瓶	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	後発		抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	院外	トルカブ錠160mg	160mg1錠	カビバセルチブ		劇	抗悪性腫瘍

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	院外	トルカブ錠200mg	200mg1錠	カピバセルチブ		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	外+限	トレミフェン錠40mg「サワイ」	40mg1錠	トレミフェンクエン酸塩	後発	劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	注射	採用	トロデルピ点滴静注用200mg	200mg1瓶	サシツズマブ ゴビテカン(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	院外	ニューベオ錠300mg	300mg1錠	ダロルタミド		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	限定	ネクスアール錠200mg	200mg1錠	ソクフェニブトシル酸塩		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	注射	採用	パーゼタ点滴静注420mg/14m	420mg14mL	ベルツズマブ(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	採用	ピカルタミド錠80mg「NK」	80mg1錠	ピカルタミド	後発	劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	注射	採用	ビシバニール注射用5KE	5KE1瓶	溶連菌抽出物		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	限定	ピラフトピカプセル50mg	50mg1カプセル	エンコラフェニブ		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	限定	ピラフトピカプセル75mg	75mg1カプセル	エンコラフェニブ		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	注射	採用	フェスゴ配合皮下注 IN	15mL1瓶	ベルツズマブ(遺伝子組換え)・トラスツ		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	注射	採用	フェスゴ配合皮下注 MA	10mL1瓶	ベルツズマブ(遺伝子組換え)・トラスツ		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	注射	採用	フェソロデックス筋注250mg	250mg5mL1	フルベストラント		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	院外	フリュザクラカプセル1mg	1mg1カプセル	フルキンチニブ		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	院外	フリュザクラカプセル5mg	5mg1カプセル	フルキンチニブ		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	注射	採用	ベクティビックス点滴静注100mg	100mg5mL1	パニツムマブ(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	外+限	ページニオ錠100mg	100mg1錠	アベマシクリブ		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	外+限	ページニオ錠150mg	150mg1錠	アベマシクリブ		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	外+限	ページニオ錠50mg	50mg1錠	アベマシクリブ		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	注射	採用	ベバシズマブBS点滴静注100mg「	100mg4mL1	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	後発	劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	注射	採用	ベバシズマブBS点滴静注400mg「	400mg16mL	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	後発	劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	注射	採用	無水エタノール注「フソー」	5mL1管	無水エタノール			
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	限定	メクトビ錠15mg	15mg1錠	ビメチニブ		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	注射	限定	ヤーボイ点滴静注液50mg	50mg10mL1	イビリムマブ(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	注射	採用	ユニタルク胸腹腔内注入用懸濁剤4	4g1瓶	滅菌調整タルク			抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	注射	限定	リツキシサン点滴静注100mg	100mg10mL	リツキシマブ(遺伝子組換え)			抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	注射	限定	リツキシサン点滴静注500mg	500mg50mL	リツキシマブ(遺伝子組換え)			抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	限定	レットヴィモ錠40mg	40mg1錠	セルベルカチニブ		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	限定	レットヴィモ錠80mg	80mg1錠	セルベルカチニブ		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	採用	レトロゾール錠2. 5mg「NK」	2. 5mg1錠	レトロゾール	後発	劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	院外	レンビマカプセル4mg	4mg1カプセル	レンバチニブメシル酸塩		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	採用	ロンサーフ配合錠T15	15mg1錠(トリ	トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合		劇	抗悪性腫瘍
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	採用	ロンサーフ配合錠T20	20mg1錠(トリ	トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合		劇	抗悪性腫瘍
4. 3. 0 放射性医薬品	注射	採用	アシアロシンチ注	10MBq	ガラクトシル人血清アルブミンジエチレントリアミン五酢酸テク			
4. 3. 0 放射性医薬品	注射	採用	アドステロール-1131注射液	1MBq	ヨウ化メチルノルコレステノール(131I)			
4. 3. 0 放射性医薬品	注射	採用	イオフェタミン(123I)注射液「第一」	10MBq	塩酸N-イソプロピル-4-ヨードアンフェタミン(123I)			
4. 3. 0 放射性医薬品	注射	採用	インジウムDTPA(111In)注	10MBq	ジエチレントリアミン五酢酸インジウム(111In)			
4. 3. 0 放射性医薬品	注射	採用	塩化インジウム(111In)注*(日本)	1患者当たり	塩化インジウム(111In)			
4. 3. 0 放射性医薬品	注射	採用	塩化タリウム(201Tl)注NMP	10MBq	塩化タリウム(201Tl)			
4. 3. 0 放射性医薬品	注射	採用	塩化タリウム-Tl201注射液	10MBq	塩化タリウム(201Tl)			
4. 3. 0 放射性医薬品	注射	採用	カーディオライト注射液 第一	370MBq1筒	ヘキサキスメチンイソプロピルチロニトリルテクネチウム(99mTc)			
4. 3. 0 放射性医薬品	注射	採用	カーディオライト注射液 第一	740MBq1筒	ヘキサキスメチンイソプロピルチロニトリルテクネチウム(99mTc)			
4. 3. 0 放射性医薬品	注射	採用	カーディオライト注射液 第一	259MBq1筒	ヘキサキスメチンイソプロピルチロニトリルテクネチウム(99mTc)			
4. 3. 0 放射性医薬品	注射	採用	カルディオダイン注	10MBq	ヨードフェニルメチルペンタデカン酸(123I)			
4. 3. 0 放射性医薬品	注射	採用	キドニーシンチTc-99m注	10MBq	ジメルカプトコハク酸テクネチウム(99mTc)			
4. 3. 0 放射性医薬品	注射	採用	クエン酸ガリウム(67Ga)注NMP	10MBq	クエン酸ガリウム(67Ga)			
4. 3. 0 放射性医薬品	注射	採用	クエン酸ガリウム-Ga67注射液	10MBq	クエン酸ガリウム(67Ga)			
4. 3. 0 放射性医薬品	注射	採用	クリアボーン注	10MBq	ヒドロキシメチレンジホスホン酸テクネチウム(99mTc)			
4. 3. 0 放射性医薬品	外用	採用	クリプトン(81mKr)ジェネレータ	1患者当たり	クリプトン(81mKr)			
4. 3. 0 放射性医薬品	注射	採用	ダットスキャン静注	167MBq1筒	イオフルパン(123I)			
4. 3. 0 放射性医薬品	注射	採用	テクネDTPAキット	1回分	ジエチレントリアミン五酢酸			

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク
4. 3. 0 放射性医薬品	注射	採用	テクネMAAキット	1回分	大凝集人血清アルブミン			
4. 3. 0 放射性医薬品	注射	採用	テクネMDP注射液	555MBq1筒	メチレンジホスホン酸テクネチウム(99mTc)			
4. 3. 0 放射性医薬品	注射	採用	テクネシンチ注-10M	10MBq	過テクネチウム酸ナトリウム(99mTc)			
4. 3. 0 放射性医薬品	注射	採用	テクネピロリン酸キット	1回分	ピロリン酸ナトリウム			
4. 3. 0 放射性医薬品	注射	採用	テクネフチン酸キット	1回分	フィチン酸ナトリウム			
4. 3. 0 放射性医薬品	注射	採用	ニューロライト注射液第一	600MBq1筒	エチレンジシステネートオキシテクネチウム(99mTc)			
4. 3. 0 放射性医薬品	注射	採用	パーヒューザミン注	10MBq	塩酸N-イソプロピル-4-ヨードアンフェタミン(123I)			
4. 3. 0 放射性医薬品	注射	採用	プールシンチ注	10MBq	人血清アルブミンジエチレントリアミン五酢酸テクネチウム(99mTc)			
4. 3. 0 放射性医薬品	注射	採用	ヘパティメージ注	10MBq	N-ピリドキシル-5-メチルトリプトファンテクネチウム(99mTc)			
4. 3. 0 放射性医薬品	注射	採用	マイオビュー注シリンジ	296MBq1筒	テトロホスミンテクネチウム(99mTc)			
4. 3. 0 放射性医薬品	注射	採用	マイオビュー注シリンジ	740MBq1筒	テトロホスミンテクネチウム(99mTc)			
4. 3. 0 放射性医薬品	注射	採用	ミオMBG-1123注射液	10MBq	3-ヨードベンジルグアニジン(123I)			
4. 4. 1 抗ヒスタミン剤	内服	院外	クレマスチンDS0.1%「タカタ」	0.1%1g	クレマスチンフマル酸塩	後発	劇	
4. 4. 1 抗ヒスタミン剤	内服	院外	ニボラジン錠3mg	3mg1錠	メキタジン			
4. 4. 1 抗ヒスタミン剤	注射	採用	ヒベルナ注25mg	2.5%1mL1管	プロメタジン塩酸塩			
4. 4. 1 抗ヒスタミン剤	内服	採用	ポララミン錠2mg	2mg1錠	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩			
4. 4. 1 抗ヒスタミン剤	注射	採用	ポララミン注5mg	0.5%1mL1管	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩			
4. 4. 1 抗ヒスタミン剤	内服	採用	レスタミンコーワ錠10mg	10mg1錠	ジフェンヒドラミン塩酸塩			
4. 4. 2 刺激療法剤	内服	採用	リマチル錠100mg	100mg1錠	ブシラミン		劇	
4. 4. 9 その他のアレルギー用薬	内服	採用	アイピーディカプセル100	100mg1カプセル	スプラタストシル酸塩			
4. 4. 9 その他のアレルギー用薬	内服	採用	アレロック顆粒0.5%	0.5%1g	オロパタジン塩酸塩			
4. 4. 9 その他のアレルギー用薬	内服	採用	エバスチンOD錠10mg「VTRS」	10mg1錠	エバスチン	後発		
4. 4. 9 その他のアレルギー用薬	内服	院外	エバスチンOD錠5mg「VTRS」	5mg1錠	エバスチン	後発		
4. 4. 9 その他のアレルギー用薬	内服	採用	エピナスチン塩酸塩錠20mg「VTRS」	20mg1錠	エピナスチン塩酸塩	後発		
4. 4. 9 その他のアレルギー用薬	内服	採用	オノンドライシロップ10%	10%1g	ブランドルカスト水和物			
4. 4. 9 その他のアレルギー用薬	内服	採用	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「ケミ」	5mg1錠	オロパタジン塩酸塩	後発		
4. 4. 9 その他のアレルギー用薬	内服	院外	キプレス細粒4mg	4mg1包	モンテルカストナトリウム			
4. 4. 9 その他のアレルギー用薬	内服	採用	キプレス錠5mg	5mg1錠	モンテルカストナトリウム			
4. 4. 9 その他のアレルギー用薬	内服	院外	キプレスチュアブル錠5mg	5mg1錠	モンテルカストナトリウム			
4. 4. 9 その他のアレルギー用薬	内服	採用	ケタスカプセル10mg	10mg1カプセル	イブジラスト			
4. 4. 9 その他のアレルギー用薬	内服	採用	ザイザル錠5mg	5mg1錠	レボセチリジン塩酸塩			
4. 4. 9 その他のアレルギー用薬	内服	採用	ザイザルシロップ0.05%	0.05%1mL	レボセチリジン塩酸塩			
4. 4. 9 その他のアレルギー用薬	内服	院外	ザジテンドライシロップ0.1%	0.1%1g	ケトチフェンフマル酸塩			
4. 4. 9 その他のアレルギー用薬	内服	採用	シダキユアスギ花粉舌下錠2000JA	2000JAU1錠	スギ花粉エキス			
4. 4. 9 その他のアレルギー用薬	内服	院外	シダキユアスギ花粉舌下錠5000JA	5000JAU1錠	スギ花粉エキス			
4. 4. 9 その他のアレルギー用薬	内服	院外	ジルテック錠10	10mg1錠	セチリジン塩酸塩			
4. 4. 9 その他のアレルギー用薬	内服	院外	タリオン錠10mg	10mg1錠	ベボタスチンベシル酸塩			
4. 4. 9 その他のアレルギー用薬	内服	院外	ディレグラ配合錠	1錠	フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸ブソイドエフェドリン配合剤			
4. 4. 9 その他のアレルギー用薬	内服	院外	デザレックス錠5mg	5mg1錠	デスロラタジン			
4. 4. 9 その他のアレルギー用薬	注射	自注	デュピクセント皮下注300mgペン	300mg2mL1	デュピルマブ(遺伝子組換え)		劇	
4. 4. 9 その他のアレルギー用薬	内服	採用	ビラノアOD錠20mg	20mg1錠	ビラスチン			
4. 4. 9 その他のアレルギー用薬	内服	院外	フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「F」	30mg1錠	フェキソフェナジン塩酸塩			
4. 4. 9 その他のアレルギー用薬	内服	採用	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「F」	60mg1錠	フェキソフェナジン塩酸塩			
4. 4. 9 その他のアレルギー用薬	内服	採用	ブランドルカストカプセル112.5mg「F」	112.5mg1カプセル	ブランドルカスト水和物			
4. 4. 9 その他のアレルギー用薬	内服	院外	ミティキュアダニ舌下錠10000JAU	10000JAU1錠	アレルゲンエキス			
4. 4. 9 その他のアレルギー用薬	内服	採用	ミティキュアダニ舌下錠3300JAU	3300JAU1錠	アレルゲンエキス			
4. 4. 9 その他のアレルギー用薬	内服	採用	モンテルカストOD錠10mg「タカタ」	10mg1錠	モンテルカストナトリウム	後発		
4. 4. 9 その他のアレルギー用薬	内服	院外	ラマトロバン錠75mg「KO」	75mg1錠	ラマトロバン	後発		
4. 4. 9 その他のアレルギー用薬	内服	採用	リザベンカプセル100mg	100mg1カプセル	トラニラスト			
4. 4. 9 その他のアレルギー用薬	内服	採用	ルパフィン錠10mg	10mg1錠	ルパタジンフマル酸塩			
5. 1. 0 生薬	内服	院外	ツムラの生薬コウジン末(調剤用)	1g	コウジン			

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク
5. 2. 0 漢方製剤	内服	採用	コタロー柴胡桂枝乾姜湯エキス細粒	1g	柴胡桂枝乾姜湯エキス			
5. 2. 0 漢方製剤	内服	採用	コタロー小柴胡湯エキス細粒	1g	小柴胡湯エキス			
5. 2. 0 漢方製剤	内服	採用	コタロー小青竜湯エキス細粒	1g	小青竜湯エキス			
5. 2. 0 漢方製剤	内服	院外	コタロー苓桂朮甘湯エキス細粒	1g	苓桂朮甘湯エキス			
5. 2. 0 漢方製剤	内服	院外	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)	1g	温経湯エキス			
5. 2. 0 漢方製剤	内服	採用	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)	1g	乙字湯エキス			
5. 2. 0 漢方製剤	内服	採用	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	1g	葛根湯エキス			
5. 2. 0 漢方製剤	内服	院外	ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒	1g	葛根湯加川きゅう辛夷エキス			
5. 2. 0 漢方製剤	内服	院外	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)	1g	加味帰脾湯エキス			
5. 2. 0 漢方製剤	内服	採用	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	1g	加味逍遙散エキス			
5. 2. 0 漢方製剤	内服	採用	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)	1g	桂枝茯苓丸エキス			
5. 2. 0 漢方製剤	内服	院外	ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒	1g	桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス			
5. 2. 0 漢方製剤	内服	院外	ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)	1g	五積散エキス			
5. 2. 0 漢方製剤	内服	採用	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	1g	牛車腎気丸エキス			
5. 2. 0 漢方製剤	内服	採用	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)	1g	五苓散エキス			
5. 2. 0 漢方製剤	内服	院外	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒	1g	柴胡加竜骨牡蛎湯エキス			抗てんかん
5. 2. 0 漢方製剤	内服	採用	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	1g	柴苓湯エキス			
5. 2. 0 漢方製剤	内服	採用	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)	1g	酸棗仁湯エキス			
5. 2. 0 漢方製剤	内服	採用	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	1g	芍薬甘草湯エキス			
5. 2. 0 漢方製剤	内服	採用	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)	1g	十全大補湯エキス			
5. 2. 0 漢方製剤	内服	採用	ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)	1g	大黃甘草湯エキス			
5. 2. 0 漢方製剤	内服	採用	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	1g	大建中湯エキス			
5. 2. 0 漢方製剤	内服	採用	ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)	1g	猪苓湯エキス			
5. 2. 0 漢方製剤	内服	院外	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス	1g	当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス			
5. 2. 0 漢方製剤	内服	採用	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)	1g	当帰芍薬散エキス			
5. 2. 0 漢方製剤	内服	採用	ツムラ人參養榮湯エキス顆粒(医療用)	1g	人參養榮湯エキス			
5. 2. 0 漢方製剤	内服	採用	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	1g	麦門冬湯エキス			
5. 2. 0 漢方製剤	内服	採用	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	1g	半夏厚朴湯エキス			
5. 2. 0 漢方製剤	内服	採用	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	1g	半夏瀉心湯エキス			
5. 2. 0 漢方製剤	内服	採用	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	1g	防風通聖散エキス			
5. 2. 0 漢方製剤	内服	採用	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	1g	補中益気湯エキス			
5. 2. 0 漢方製剤	内服	院外	ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)	1g	麻黄附子細辛湯エキス			
5. 2. 0 漢方製剤	内服	採用	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)	1g	麻子仁丸エキス			
5. 2. 0 漢方製剤	内服	採用	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	1g	抑肝散エキス			
5. 2. 0 漢方製剤	内服	院外	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒	1g	抑肝散加陳皮半夏エキス			
5. 2. 0 漢方製剤	内服	採用	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	1g	六君子湯エキス			
5. 2. 0 漢方製剤	内服	院外	本草八味丸料エキス顆粒-M	1g	八味丸エキス		劇	
5. 9. 0 その他の生薬および漢方	内服	院外	ブシ末(調剤用)「ツムラ」	1g	ブシ		劇	
5. 9. 0 その他の生薬および漢方	内服	院外	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	1錠	ヨクイニンエキス			
6. 1. 1 主としてグラム陽性菌に	注射	採用	アルベカシン硫酸塩注射液200mg	200mg4mL1	アルベカシン硫酸塩		劇	
6. 1. 1 主としてグラム陽性菌に	注射	採用	クリンダマイシンリン酸エステル注射	600mg1管	クリンダマイシンリン酸エステル			
6. 1. 1 主としてグラム陽性菌に	注射	限定	ステルイズ水性懸濁筋注240万単位	240万単位1筒	ベンジルペニシリンベンザチン水和物			
6. 1. 1 主としてグラム陽性菌に	内服	採用	ダフクリア錠200mg	200mg1錠	フィダキソマイシン			
6. 1. 1 主としてグラム陽性菌に	注射	採用	ダプトマイシン静注用350mg「ニプロ	350mg1瓶	ダプトマイシン	後発		
6. 1. 1 主としてグラム陽性菌に	内服	採用	ダラシンカプセル150mg	150mg1カプセ	クリンダマイシン塩酸塩			
6. 1. 1 主としてグラム陽性菌に	注射	採用	注射用ペニシリンGカリウム100万単	100万単位1瓶	ベンジルペニシリンカリウム			
6. 1. 1 主としてグラム陽性菌に	注射	採用	テイコプラニン点滴静注用200mg「N	200mg1瓶	テイコプラニン	後発	劇	
6. 1. 1 主としてグラム陽性菌に	内服	採用	バンコマイシン塩酸塩散0. 5g「VTR	500mg1瓶	バンコマイシン塩酸塩			
6. 1. 1 主としてグラム陽性菌に	注射	採用	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0. 0. 5g1瓶	0. 5g1瓶	バンコマイシン塩酸塩			
6. 1. 2 主としてグラム陰性菌に	注射	採用	アミカシン硫酸塩注射液200mg「SV	200mg1管	アミカシン硫酸塩			
6. 1. 2 主としてグラム陰性菌に	注射	採用	オルドレブ点滴静注用150mg	150mg1瓶	コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム		劇	

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性	内服	採用	アモキシシリンカプセル250mg「日工」	250mg1カプセル	アモキシシリン水和物			
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性	内服	採用	オーグメンチン配合錠250RS	(375mg)1錠	アモキシシリン水和物・クラバン酸カリウム			
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性	内服	外+限	オラベナム小児用細粒10%	100mg1g	テビベナム ビボキシル			
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性	内服	採用	クラバモックス小児用配合ドライシロ	(636. 5mg)1	アモキシシリン水和物・クラバン酸カリウム			
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性	注射	採用	ゲンタマイシン硫酸塩注射液40mg「サワ	40mg1管	ゲンタマイシン硫酸塩		劇	
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性	注射	採用	ザバクサ配合点滴静注用	(1. 5g)1瓶	セフトロザン硫酸塩・タゾバクタムナトリウム			
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性	内服	採用	セファクロル細粒小児用10%「SWJ」	100mg1g	セファクロル			
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性	注射	採用	セファゾリンナトリウム注射用1g「日工	1g1瓶	セファゾリンナトリウム			
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性	内服	採用	セファレキシン錠250mg「日医工」	250mg1錠	セファレキシン			
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性	注射	採用	セフェピム塩酸塩静注用1g「CMX」	1g1瓶	セフェピム塩酸塩水和物	後発		
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性	注射	採用	セフォチアム塩酸塩静注用1g「NPJ」	1g1瓶	セフォチアム塩酸塩			
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性	内服	院外	セフジトレンビボキシル錠100mg「S	100mg1錠	セフジトレン ビボキシル			
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性	内服	院外	セフゾン細粒小児用10%	100mg1g	セフジニル			
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性	注射	採用	セフトラジウム静注用1g「VTRS」	1g1瓶	セフトラジウム水和物			
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性	注射	採用	セフトリアキソンナトリウム静注用1g	1g1瓶	セフトリアキソンナトリウム水和物			
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性	内服	院外	セフボドキシムプロキセチル錠100r	100mg1錠	セフボドキシム プロキセチル	後発		
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性	注射	採用	セフメタゾールナトリウム静注用1g「	1g1瓶	セフメタゾールナトリウム			
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性	注射	採用	タゾピペ配合静注用4. 5「明治」	(4. 5g)1瓶	タゾバクタム・ピペラシリン水和物			
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性	注射	採用	パニマイシン注射液100mg	100mg1管	ジベカシン硫酸塩		劇	
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性	注射	採用	ピクシリン注射用1g	1g1瓶	アンピシリンナトリウム			
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性	注射	採用	ピクシリン注射用2g	2g1瓶	アンピシリンナトリウム			
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性	注射	採用	ピシリバクタ静注用3g	(3g)1瓶	アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム			
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性	注射	採用	ビペラシリンNa注射用2g「NIG」	2g1瓶	ビペラシリンナトリウム			
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性	内服	院外	ファロム錠200mg	200mg1錠	ファロペナムナトリウム水和物			
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性	注射	採用	フルマリル静注用1g	1g1瓶	フロモキシセフナトリウム			
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性	内服	院外	フロモックス錠100mg	100mg1錠	セフカペン ビボキシル塩酸塩水和物			
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性	内服	採用	ホスミン錠250	250mg1錠	ホスホマイシンカルシウム水和物			
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性	内服	院外	ホスミシンドライシロップ400	400mg1g	ホスホマイシンカルシウム水和物			
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性	内服	院外	メイアクトMS小児用細粒10%	100mg1g	セフジトレン ビボキシル			
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性	注射	採用	メロペナム点滴静注用1g「NPJ」	1g1瓶	メロペナム水和物			
6. 1. 4 主としてグラム陽性菌、マ	内服	採用	アジスロマイシン錠250mg「トーワ」	250mg1錠	アジスロマイシン水和物	後発		
6. 1. 4 主としてグラム陽性菌、マ	内服	採用	エリスロシン錠200mg	200mg1錠	エリスロマイシンステアリン酸塩			
6. 1. 4 主としてグラム陽性菌、マ	内服	採用	エリスロシンドライシロップW20%	200mg1g	エリスロマイシンエチルコハク酸エステル			
6. 1. 4 主としてグラム陽性菌、マ	内服	院外	クラリスド錠50mg小児用	50mg1錠	クラリスロマイシン			
6. 1. 4 主としてグラム陽性菌、マ	内服	採用	クラリスロマイシンDS10%小児用「	100mg1g	クラリスロマイシン			
6. 1. 4 主としてグラム陽性菌、マ	内服	採用	クラリスロマイシン錠200mg「サワイ	200mg1錠	クラリスロマイシン			
6. 1. 4 主としてグラム陽性菌、マ	注射	採用	ジスロマック点滴静注用500mg	500mg1瓶	アジスロマイシン水和物			
6. 1. 4 主としてグラム陽性菌、マ	内服	院外	ロキシスロマイシン錠150mg「サワ	150mg1錠	ロキシスロマイシン	後発		
6. 1. 5 主としてグラム陽性・陰性	注射	採用	クロラムイセチンサクシネート静注用	1g1瓶(溶解液	クロラムフェニコールコハク酸エステルナトリウム			
6. 1. 5 主としてグラム陽性・陰性	内服	採用	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワ	50mg1錠	ミノサイクリン塩酸塩			
6. 1. 5 主としてグラム陽性・陰性	注射	採用	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100	100mg1瓶	ミノサイクリン塩酸塩			
6. 1. 6 主として抗酸菌に作用す	外用	限定	アリケイ吸入液590mg	590mg8. 4m	アミカシン硫酸塩			
6. 1. 6 主として抗酸菌に作用す	注射	限定	ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「	1g1瓶	ストレプトマイシン硫酸塩			
6. 1. 6 主として抗酸菌に作用す	内服	採用	リファンピシンカプセル150mg「サン	150mg1カプセル	リファンピシン			
6. 1. 7 主としてカビに作用する	注射	採用	アムピゾーム点滴静注用50mg	50mg1瓶	アムホテリジンB		毒	
6. 1. 7 主としてカビに作用する	注射	限定	ブイフェンド200mg静注用	200mg1瓶	ポリコナゾール		劇	
6. 1. 7 主としてカビに作用する	内服	外+限	ポリコナゾール錠200mg「DSEP」	200mg1錠	ポリコナゾール	後発	劇	
6. 1. 7 主としてカビに作用する	内服	外+限	ポリコナゾール錠50mg「DSEP」	50mg1錠	ポリコナゾール	後発	劇	
6. 1. 7 主としてカビに作用する	注射	採用	ミカファンギンNa点滴静注用75mg「	75mg1瓶	ミカファンギンナトリウム	後発	劇	
6. 1. 9 その他の抗生物質製剤	内服	院外	ボノサップパック400	1シート	ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマ			
6. 1. 9 その他の抗生物質製剤	内服	院外	ボノピオンパック	1シート	ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・メロニダゾ			

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク
6. 1. 9 その他の抗生物質製剤	内服	採用	リフキシマ錠200mg	200mg1錠	リファキシミン			
6. 2. 1 サルファ剤	内服	採用	サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg	500mg1錠	サラゾスルファピリジン	後発		
6. 2. 2 抗結核剤	内服	採用	イスコチン錠100mg	100mg1錠	イソニアジド			
6. 2. 2 抗結核剤	注射	採用	イスコチン注100mg	100mg1管	イソニアジド			
6. 2. 2 抗結核剤	内服	採用	エサンブートール錠125mg	125mg1錠	エタンブートール塩酸塩		劇	
6. 2. 2 抗結核剤	内服	採用	ピラマイド原末	1g	ピラジナミド			
6. 2. 4 合成抗菌剤	内服	採用	ジェニナック錠200mg	200mg1錠	メシル酸ガレノキサシン水和物			
6. 2. 4 合成抗菌剤	内服	採用	シタフロキサシン錠50mg「サワイ」	50mg1錠	シタフロキサシン水和物			
6. 2. 4 合成抗菌剤	内服	採用	ラスビック錠75mg	75mg1錠	ラスクフロキサシン塩酸塩			
6. 2. 4 合成抗菌剤	注射	採用	ラスビック点滴静注キット150mg	150mg1キット	ラスクフロキサシン塩酸塩		劇	
6. 2. 4 合成抗菌剤	内服	採用	リネゾリド錠600mg「明治」	600mg1錠	リネゾリド	後発		
6. 2. 4 合成抗菌剤	注射	採用	リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	600mg300m	リネゾリド	後発		
6. 2. 4 合成抗菌剤	内服	採用	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	500mg1錠(レ	レボフロキサシン水和物	後発		
6. 2. 4 合成抗菌剤	注射	採用	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg	500mg100m	レボフロキサシン水和物	後発		
6. 2. 5 抗ウイルス剤	注射	採用	アシクロビル点滴静注用250mg「サ	250mg1瓶	アシクロビル			
6. 2. 5 抗ウイルス剤	内服	採用	アメナリーフ錠200mg	200mg1錠	アメナメビル			
6. 2. 5 抗ウイルス剤	外用	採用	イナビル吸入懸濁用160mgセット	160mg1瓶	ラニナミビルオクタン酸エステル水和物			
6. 2. 5 抗ウイルス剤	外用	採用	イナビル吸入粉末剤20mg	20mg1キット	ラニナミビルオクタン酸エステル水和物			
6. 2. 5 抗ウイルス剤	内服	採用	オセルタミビルDS3%「サワイ」	3%1g	オセルタミビルリン酸塩	後発		
6. 2. 5 抗ウイルス剤	内服	採用	オセルタミビルカプセル75mg「サワ	75mg1カプセル	オセルタミビルリン酸塩	後発		
6. 2. 5 抗ウイルス剤	内服	採用	カレトラ配合錠	1錠	ロピナビル・リトナビル		劇	抗HIV薬
6. 2. 5 抗ウイルス剤	注射	限定	ガンシクロビル点滴静注用500mg「	500mg1瓶	ガンシクロビル	後発	毒	
6. 2. 5 抗ウイルス剤	注射	採用	シナジス筋注液100mg	100mg1mL1	バリビズマブ(遺伝子組換え)			
6. 2. 5 抗ウイルス剤	注射	採用	シナジス筋注液50mg	50mg0. 5mL	バリビズマブ(遺伝子組換え)			
6. 2. 5 抗ウイルス剤	内服	院外	ゼフィックス錠100	100mg1錠	ラミブジン		劇	
6. 2. 5 抗ウイルス剤	内服	採用	ゾコーバ錠125mg	125mg1錠	エンシトレルビル フマル酸		劇	
6. 2. 5 抗ウイルス剤	内服	限定	ゾフルーザ錠10mg	10mg1錠	パロキサビル マルボキシル			
6. 2. 5 抗ウイルス剤	内服	採用	ゾフルーザ錠20mg	20mg1錠	パロキサビル マルボキシル			
6. 2. 5 抗ウイルス剤	内服	院外	テノゼット錠300mg	300mg1錠	テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩		劇	
6. 2. 5 抗ウイルス剤	内服	採用	パキロビッドパック300	1シート	ニルマトレルビル・リトナビル		劇	
6. 2. 5 抗ウイルス剤	内服	採用	パキロビッドパック600	1シート	ニルマトレルビル・リトナビル		劇	
6. 2. 5 抗ウイルス剤	内服	院外	ハーボニー配合錠	1錠	レジパスビル アセトン付加物・ソホスブビル			
6. 2. 5 抗ウイルス剤	内服	採用	バラクルード錠0. 5mg	0. 5mg1錠	エンテカビル水和物		劇	
6. 2. 5 抗ウイルス剤	内服	採用	バラシクロビル錠500mg「SPKK」	500mg1錠	バラシクロビル塩酸塩	後発		
6. 2. 5 抗ウイルス剤	内服	採用	ビクタルビ配合錠	1錠	ビクテグラビルナトリウム・エムトリシタ		劇	抗HIV薬
6. 2. 5 抗ウイルス剤	外用	採用	ビダラビン軟膏3%「SW」	3%1g	ビダラビン	後発		
6. 2. 5 抗ウイルス剤	内服	採用	ファミル錠250mg	250mg1錠	ファミシクロビル			
6. 2. 5 抗ウイルス剤	注射	採用	ベクルリー点滴静注用100mg	100mg1瓶	レムデシビル			
6. 2. 5 抗ウイルス剤	内服	採用	ベムリディ錠25mg	25mg1錠	テノホビル アラフェナミドフマル酸塩		劇	
6. 2. 5 抗ウイルス剤	内服	院外	マヴィレット配合錠	1錠	グレカプレビル水和物・ビブレンタスビル			
6. 2. 5 抗ウイルス剤	内服	採用	ラゲブリオ錠400mg	400mg1錠	モルヌピラビル		劇	
6. 2. 5 抗ウイルス剤	注射	採用	ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg	300mg60mL	ペラミビル水和物			
6. 2. 5 抗ウイルス剤	外用	院外	リレンザ	5mg1プリスター	ザナミビル水和物			
6. 2. 9 その他の化学療法剤	内服	採用	イトラコナゾール錠50mg「科研」	50mg1錠	イトラコナゾール	後発		
6. 2. 9 その他の化学療法剤	内服	採用	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	1%1mL	イトラコナゾール	後発		
6. 2. 9 その他の化学療法剤	外用	院外	エフィナコナゾール爪外用液10%「利	10%1g	エフィナコナゾール	後発		
6. 2. 9 その他の化学療法剤	外用	採用	オラビ錠口腔用50mg	50mg1錠	ミコナゾール			
6. 2. 9 その他の化学療法剤	内服	採用	テルビナフィン錠125mg「サワイ」	125mg1錠	テルビナフィン塩酸塩	後発		
6. 2. 9 その他の化学療法剤	内服	院外	ネイリンカプセル100mg	100mg1カプセル	ホスラブコナゾール L-リシンエタノール付加物			
6. 2. 9 その他の化学療法剤	内服	採用	バクタ配合顆粒	1g	スルファメトキサゾール・トリメトプリム			
6. 2. 9 その他の化学療法剤	内服	採用	バクタ配合錠	1錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム			

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク
6. 2. 9 その他の化学療法剤	内服	採用	フルコナゾールカプセル100mg「サ	100mg1カプセ	フルコナゾール			
6. 2. 9 その他の化学療法剤	注射	採用	プロジフ静注液200	8%2. 5mL1瓶	ホスフルコナゾール			
6. 2. 9 その他の化学療法剤	内服	採用	フロリードゲル経口用2%	2%1g	ミコナゾール			
6. 2. 9 その他の化学療法剤	外用	院外	ベセルナクリーム5%	5%250mg1包	イミキモド			
6. 2. 9 その他の化学療法剤	外用	院外	ルコナック爪外用液5%	5%1g	ルリコナゾール			
6. 3. 1 ワクチン類	注射	採用	アクトヒブ	10μg1瓶(溶角	乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(担体た		劇	
6. 3. 1 ワクチン類	注射	採用	アレックスビー筋注用	1瓶(溶解液付)	組換えRSウイルスワクチン		劇	
6. 3. 1 ワクチン類	注射	採用	イモバックスポリオ皮下注	0. 5mL1筒	不活化ポリオワクチン		劇	
6. 3. 1 ワクチン類	注射	採用	おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」	一人分1瓶(溶角	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン		劇	
6. 3. 1 ワクチン類	注射	採用	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	0. 5mL1筒	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス		劇	
6. 3. 1 ワクチン類	注射	採用	乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)	一人分1管(溶角	乾燥BCGワクチン		劇	
6. 3. 1 ワクチン類	注射	採用	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	一人分1瓶(溶角	乾燥弱毒生水痘ワクチン		劇	
6. 3. 1 ワクチン類	注射	採用	乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」	一人分1瓶(溶角	乾燥弱毒生風しんワクチン		劇	
6. 3. 1 ワクチン類	注射	採用	乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」	一人分1瓶(溶角	乾燥弱毒生麻しんワクチン		劇	
6. 3. 1 ワクチン類	注射	採用	キャップバックス筋注シリンジ	0. 5mL1筒	21価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性		劇	
6. 3. 1 ワクチン類	注射	採用	サーバリックス	0. 5mL1筒	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス		劇	
6. 3. 1 ワクチン類	注射	採用	ジェービックV	一人分1瓶(溶角	乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン		劇	
6. 3. 1 ワクチン類	注射	採用	ニューモバックスNPシリンジ	0. 5mL1筒	肺炎球菌ワクチン		劇	
6. 3. 1 ワクチン類	注射	採用	バクニューバンス水性懸濁注シリンジ	0. 5mL1筒	沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン(無		劇	
6. 3. 1 ワクチン類	注射	採用	ビームゲン注0. 25mL	0. 25mL1瓶	組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由		劇	
6. 3. 1 ワクチン類	注射	採用	ビームゲン注0. 5mL	0. 5mL1瓶	組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由		劇	
6. 3. 1 ワクチン類	注射	採用	フルーベックHAシリンジ	0. 5mL1キット	インフルエンザHAワクチン		劇	
6. 3. 1 ワクチン類	注射	採用	ブレバナー20水性懸濁注	0. 5mL1筒	沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(無		劇	
6. 3. 1 ワクチン類	注射	採用	ヘプタバックスーII水性懸濁注シリン	0. 25mL1筒	組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由		劇	
6. 3. 1 ワクチン類	注射	採用	ヘプタバックスーII水性懸濁注シリン	0. 5mL1筒	組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由		劇	
6. 3. 1 ワクチン類	注射	採用	メンクアッドフィ筋注	0. 5mL1瓶	4価髄膜炎菌ワクチン(破傷風トキソイ		劇	
6. 3. 1 ワクチン類	内服	採用	ロタテック内用液	2mL1本	5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン		劇	
6. 3. 1 ワクチン類	内服	採用	ロタリックス内用液	1. 5mL1本	経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン		劇	
6. 3. 2 毒素及びトキソイド類	注射	採用	沈降破傷風トキソイド「生研」	0. 5mL1瓶	沈降破傷風トキソイド		劇	
6. 3. 4 血液製剤類	注射	採用	アコアラシ静注用1800	1800国際単位	アンチトロンビン ガンマ(遺伝子組換え		特生	
6. 3. 4 血液製剤類	注射	採用	アコアラシ静注用600	600国際単位1	アンチトロンビン ガンマ(遺伝子組換え		特生	
6. 3. 4 血液製剤類	注射	採用	乾燥HBグロブリン筋注用1000単位	1000単位5mL	乾燥抗HBs人免疫グロブリン		特生	
6. 3. 4 血液製剤類	注射	採用	乾燥HBグロブリン筋注用200単位	200単位1mL	乾燥抗HBs人免疫グロブリン		特生	
6. 3. 4 血液製剤類	注射	採用	ガンマグロブリン筋注1500mg/10	150mg1mL	人免疫グロブリン		特生	
6. 3. 4 血液製剤類	注射	採用	献血アルブミン5%静注12. 5g/25	5%250mL1瓶	人血清アルブミン		特生	
6. 3. 4 血液製剤類	注射	採用	献血ヴェノグロブリンIH10%静注10	10g100mL1瓶	ポリエチレングリコール処理人免疫グロ		特生	
6. 3. 4 血液製剤類	注射	採用	献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.	2. 5g25mL1瓶	ポリエチレングリコール処理人免疫グロ		特生	
6. 3. 4 血液製剤類	注射	採用	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g	5g50mL1瓶	ポリエチレングリコール処理人免疫グロ		特生	
6. 3. 4 血液製剤類	注射	採用	献血グロベニンーI静注用5000mg	5g100mL1瓶	乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫		特生	
6. 3. 4 血液製剤類	注射	採用	献血ベニンローI静注用5000mg	5g100mL1瓶	乾燥スルホ化人免疫グロブリン		特生	
6. 3. 4 血液製剤類	注射	採用	抗Dグロブリン筋注用1000倍「ニチ	1000倍1瓶(溶	乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン		特生	
6. 3. 4 血液製剤類	注射	採用	赤十字アルブミン25%静注12. 5g	25%50mL1瓶	人血清アルブミン		特生	
6. 3. 4 血液製剤類	外用	採用	タコシール組織接着用シート	4. 8cm×4. 8	フィブリノゲン配合剤		特生	
6. 3. 4 血液製剤類	注射	採用	テタノブリンIH静注1500単位	1500国際単位	ポリエチレングリコール処理抗破傷風		特生	
6. 3. 4 血液製剤類	注射	採用	テタノブリン筋注用250単位	250国際単位1	乾燥抗破傷風人免疫グロブリン		特生	
6. 3. 4 血液製剤類	注射	限定	ハプトグロビン静注2000単位「JB」	2000単位100	人ハプトグロビン		特生	
6. 3. 4 血液製剤類	注射	採用	フィブロガミンP静注用	240国際単位1	ヒト血漿由来乾燥血液凝固第XIII因子		特生	
6. 3. 4 血液製剤類	外用	採用	ペリプラストP コンビセット 組織接着	1mL2キット1組	フィブリノゲン加第XIII因子		特生	
6. 3. 4 血液製剤類	外用	採用	ペリプラストP コンビセット 組織接着	3mL2キット1組	フィブリノゲン加第XIII因子		特生	
6. 3. 6 混合生物学的製剤	注射	採用	DTビック	0. 1mL1瓶	沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド		劇	
6. 3. 6 混合生物学的製剤	注射	採用	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチ	一人分1瓶(溶角	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン		劇	

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク
6. 3. 6 混合生物学的製剤	注射	採用	クアトロバック皮下注シリンジ	0. 5mL1キット	沈降精製百日せきジフテリア破傷風不	劇		
6. 3. 6 混合生物学的製剤	注射	採用	ゴービック水性懸濁注シリンジ	0. 5mL1筒	沈降精製百日せきジフテリア破傷風不	劇		
6. 3. 6 混合生物学的製剤	注射	採用	トリビック	0. 5mL1瓶	沈降精製百日せきジフテリア破傷風混	劇		
6. 3. 6 混合生物学的製剤	注射	採用	はしか風しん混合生ワクチン「第一三	一人分1瓶(溶	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン	劇		
6. 3. 6 混合生物学的製剤	注射	採用	ミールピックII皮下注用	一人分1瓶(溶	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン	劇		
6. 3. 9 その他の生物学的製剤	注射	限定	アクテムラ点滴静注用80mg	80mg4mL1瓶	トシリズマブ(遺伝子組換え)	劇		免疫抑制薬
6. 3. 9 その他の生物学的製剤	注射	限定	アクテムラ皮下注162mgオートイン	162mg0. 9m	トシリズマブ(遺伝子組換え)	劇		免疫抑制薬
6. 3. 9 その他の生物学的製剤	注射	採用	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)	(一般診断用・1	精製ツベルクリン	劇		
6. 3. 9 その他の生物学的製剤	外用	採用	イムノブラダー膀胱注用40mg	40mg1瓶(溶	乾燥BCG膀胱内用(日本株)	劇		抗悪性腫瘍
6. 3. 9 その他の生物学的製剤	外用	採用	イムノブラダー膀胱注用80mg	80mg1瓶(溶	乾燥BCG膀胱内用(日本株)	劇		抗悪性腫瘍
6. 4. 1 抗原虫剤	注射	採用	アネメト点滴静注液500mg	500mg100m	メトロニダゾール			
6. 4. 1 抗原虫剤	注射	限定	バクトラミン注	5mL1管	スルファメトキサゾール・トリメプリム			
6. 4. 1 抗原虫剤	内服	採用	フラジール内服錠250mg	250mg1錠	メトロニダゾール			
6. 4. 1 抗原虫剤	注射	限定	ベナンボックス注用300mg	300mg1瓶	ペンタミジンイセチオン酸塩	劇		
6. 4. 2 駆虫剤	内服	採用	コンバントリンドライシロップ100mg	10%1g	ピランテルパモ酸塩			
6. 4. 2 駆虫剤	内服	採用	ストロメクトール錠3mg	3mg1錠	イベルメクチン	劇		
6. 4. 2 駆虫剤	外用	採用	スミスリンローション5%	5%1g	フェントリン			
7. 1. 1 賦形剤	内服	採用	バレイショデンプン「ケンエー」	10g	バレイショデンプン			
7. 1. 2 軟膏基剤	外用	採用	オリブ油「ケンエー」	10mL	オリブ油			
7. 1. 2 軟膏基剤	外用	採用	吸水クリーム「ニコー」	10g	吸水クリーム			
7. 1. 2 軟膏基剤	外用	採用	ソルベース	10g	マクロゴール			
7. 1. 2 軟膏基剤	外用	採用	白色ワセリン「ケンエー」	10g	白色ワセリン			
7. 1. 2 軟膏基剤	外用	採用	プロベト	10g	白色ワセリン			
7. 1. 2 軟膏基剤	外用	採用	流動パラフィン「ヨシダ」	10mL	流動パラフィン			
7. 1. 3 溶解剤	注射	採用	大塚蒸留水	100mL1瓶	注射用水			
7. 1. 3 溶解剤	注射	採用	注射用水PL「フソー」	20mL1管	注射用水			
7. 1. 3 溶解剤	注射	採用	注射用水PL「フソー」	1L1瓶	注射用水			
7. 1. 3 溶解剤	注射	採用	注射用水バッグ「フソー」	1L1袋	注射用水			
7. 1. 3 溶解剤	注射	採用	注射用水「フソー」	5mL1管	注射用水			
7. 1. 4 矯味, 矯臭, 着色剤	内服	採用	単シロップ	10mL	単シロップ			
7. 1. 4 矯味, 矯臭, 着色剤	内服 外用	採用	ハッカ油「コザカイ・M」	1mL	ハッカ油			
7. 1. 9 その他の調剤用薬	内服 外用	採用	塩化ナトリウム「オーツカ」	10g	塩化ナトリウム			
7. 2. 1 X線造影剤	注射	採用	イオパミドール150注200mL「F」	30. 62%200	イオパミドール			
7. 2. 1 X線造影剤	注射	採用	イオパミドール150注50mL「F」	30. 62%50m	イオパミドール			
7. 2. 1 X線造影剤	注射	採用	イオパミドール300注100mL「F」	61. 24%100	イオパミドール			
7. 2. 1 X線造影剤	注射	採用	イオパミドール300注50mL「F」	61. 24%50m	イオパミドール			
7. 2. 1 X線造影剤	注射	採用	イオパミドール(370)100mL注射液	75. 52%100	イオパミドール			
7. 2. 1 X線造影剤	注射	採用	イオパミロン注300	61. 24%50m	イオパミドール			
7. 2. 1 X線造影剤	注射	採用	イオパミロン注370	75. 52%50m	イオパミドール			
7. 2. 1 X線造影剤	注射	採用	イオパミロン注370	75. 52%100	イオパミドール			
7. 2. 1 X線造影剤	注射	採用	イオメロン350注100mL	71. 44%100	イオメプロール			
7. 2. 1 X線造影剤	注射	採用	イオメロン350注50mL	71. 44%50m	イオメプロール			
7. 2. 1 X線造影剤	注射	採用	イオメロン350注シリンジ100mL	71. 44%100	イオメプロール			
7. 2. 1 X線造影剤	注射	採用	イソピスト注240	51. 26%10m	イオトロラン			
7. 2. 1 X線造影剤	注射	採用	イソピスト注300	64. 08%10m	イオトロラン			
7. 2. 1 X線造影剤	注射	採用	ウログラフィン注60%	60%20mL1管	アミドリソ酸ナトリウムメグルミン			
7. 2. 1 X線造影剤	注射	採用	オプチレイ320注100mL	67. 8%100m	イオベルソール			
7. 2. 1 X線造影剤	注射	採用	オムニパーク300注シリンジ100mL	64. 71%100	イオヘキソール			
7. 2. 1 X線造影剤	内服	採用	ガストログラフィン経口・注腸用	1mL	アミドリソ酸ナトリウムメグルミン			
7. 2. 1 X線造影剤	内服	採用	バリトップHD	99%10g	硫酸バリウム			
7. 2. 1 X線造影剤	内服	採用	パロス発泡顆粒ーS	1g	炭酸水素ナトリウム・酒石後発			

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク
7. 2. 1 X線造影剤	注射	採用	ピリスコピン点滴静注50	10. 55%100	イオトロクス酸メグルミン			
7. 2. 1 X線造影剤	内服	採用	マグコロール散68%分包50g	68%50g1包	クエン酸マグネシウム			
7. 2. 1 X線造影剤	注射	採用	リビオドール480注10mL	10mL1管	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル			
7. 2. 2 機能検査用試薬	注射	採用	LH-RH注0. 1mg「ニプロ」	0. 1mg1管	ゴナドレリン酢酸塩			
7. 2. 2 機能検査用試薬	注射	採用	TRH注0. 5mg「ニプロ」	0. 5mg1管	プロチレリン			
7. 2. 2 機能検査用試薬	注射	採用	アルギニン点滴静注30g「AY」	10%300mL1	L-アルギニン塩酸塩			
7. 2. 2 機能検査用試薬	注射	限定	アンチレクス静注10mg	1%1mL1管	エドロホニウム塩化物		劇	
7. 2. 2 機能検査用試薬	注射	採用	インジゴカルミン注20mg「AFP」	0. 4%5mL1管	インジゴカルミン			
7. 2. 2 機能検査用試薬	注射 自注	採用	グルカゴンGノボ注射用1mg	1mg1瓶	グルカゴン(遺伝子組換え)		劇	
7. 2. 2 機能検査用試薬	注射	採用	ジアグノグリーン注射用25mg	25mg1瓶(溶解	インドシアニングリーン			
7. 2. 2 機能検査用試薬	注射	採用	注射用GHRP科研100	100μg1瓶	ブラルモレリン塩酸塩			
7. 2. 2 機能検査用試薬	注射	採用	ヒトCRH静注用100μg「ニプロ」	100μg1瓶(溶	コルチコレリン(ヒト)			
7. 2. 2 機能検査用試薬	注射	採用	プロチレリン酒石酸塩注0. 5mg「NF	0. 5mg1管	プロチレリン酒石酸塩水	後発		
7. 2. 9 その他の診断用薬(体外)	注射	採用	EOB・プリモビスト注シリンジ	18. 143%10	ガドキセト酸ナトリウム			
7. 2. 9 その他の診断用薬(体外)	注射	採用	ガドビスト静注1. 0mol/Lシリンジ	60. 47%10m	ガドブトロール			
7. 2. 9 その他の診断用薬(体外)	注射	採用	ガドビスト静注1. 0mol/Lシリンジ5	60. 47%5mL	ガドブトロール			
7. 2. 9 その他の診断用薬(体外)	注射	採用	ガドビスト静注1. 0mol/Lシリンジ7	60. 47%7. 5	ガドブトロール			
7. 2. 9 その他の診断用薬(体外)	注射	採用	ソナゾイド注射用16μL	1瓶(溶解液付)	ペルフルブタン			
7. 2. 9 その他の診断用薬(体外)	内服	採用	トレーランG液75g	225mL1瓶	デンブ部分加水分解物			
7. 2. 9 その他の診断用薬(体外)	注射	採用	フルオレサイト静注500mg	10%5mL1瓶	フルオレセイン	後発		
7. 2. 9 その他の診断用薬(体外)	注射	採用	プロハンス静注シリンジ13mL	13mL1筒	ガドテリドール			
7. 2. 9 その他の診断用薬(体外)	外用	採用	フローレス眼検査用試験紙0. 7mg	1枚	フルオレセインナトリウム			
7. 2. 9 その他の診断用薬(体外)	内服	採用	ボースデル内用液10	10mg250mL	塩化マンガン四水和物			
7. 3. 2 防疫用殺菌消毒剤	外用	採用	デイスオーパ消毒液0. 55%	0. 55%1mL	フタラール		劇	
7. 9. 9 他に分類されない治療を	注射	採用	アデノシン負荷用静注60mgシリンジ	60mg20mL1	アデノシン	後発		
7. 9. 9 他に分類されない治療を	注射	限定	タイロゲン筋注用0. 9mg	0. 9mg1瓶	ヒトチロトロピン アルファ(遺伝子組換え)			
7. 9. 9 他に分類されない治療を	内服	採用	ビジクリア配合錠	1錠	リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウ			
7. 9. 9 他に分類されない治療を	内服	採用	プロナーゼMS	20000単位	プロナーゼ			
7. 9. 9 他に分類されない治療を	内服	採用	ミンクリア内用散布液0. 8%	20mL1筒	l-メントール			
7. 9. 9 他に分類されない治療を	内服	採用	モビブレップ配合内用剤	1袋	ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合剤			
8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻	内服	採用	MSコンチン錠10mg	10mg1錠	モルヒネ硫酸塩水和物		麻 劇	
8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻	内服	採用	MSコンチン錠30mg	30mg1錠	モルヒネ硫酸塩水和物		麻 劇	
8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻	内服	採用	オキシコドン徐放錠10mgNX「第一	10mg1錠	オキシコドン塩酸塩水和物		麻 劇	
8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻	内服	採用	オキシコドン徐放錠20mgNX「第一	20mg1錠	オキシコドン塩酸塩水和物		麻 劇	
8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻	内服	採用	オキシコドン徐放錠40mgNX「第一	40mg1錠	オキシコドン塩酸塩水和物		麻 劇	
8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻	内服	採用	オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三	5mg1錠	オキシコドン塩酸塩水和物		麻 劇	
8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻	注射	採用	オキシコドン注射液10mg「第一三共	1%1mL1管	オキシコドン塩酸塩水和物	後発	麻 劇	
8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻	注射	採用	オキシコドン注射液50mg「第一三共	1%5mL1管	オキシコドン塩酸塩水和物	後発	麻 劇	
8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻	内服	採用	オキノーム散10mg	10mg1包	オキシコドン塩酸塩水和物		麻 劇	
8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻	内服	採用	オキノーム散2. 5mg	2. 5mg1包	オキシコドン塩酸塩水和物		麻 劇	
8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻	内服	採用	オキノーム散20mg	20mg1包	オキシコドン塩酸塩水和物		麻 劇	
8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻	内服	採用	オキノーム散5mg	5mg1包	オキシコドン塩酸塩水和物		麻 劇	
8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻	内服	採用	オプソ内服液10mg	10mg5mL1包	モルヒネ塩酸塩水和物		麻 劇	
8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻	内服	採用	オプソ内服液5mg	5mg2. 5mL1	モルヒネ塩酸塩水和物		麻 劇	
8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻	内服	採用	ナルサス錠12mg	12mg1錠	ヒドロモルフォン塩酸塩		麻 劇	
8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻	内服	採用	ナルサス錠24mg	24mg1錠	ヒドロモルフォン塩酸塩		麻 劇	
8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻	内服	採用	ナルサス錠2mg	2mg1錠	ヒドロモルフォン塩酸塩		麻 劇	
8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻	内服	採用	ナルサス錠6mg	6mg1錠	ヒドロモルフォン塩酸塩		麻 劇	
8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻	注射	採用	ナルベイン注20mg	20mg2mL1管	ヒドロモルフォン塩酸塩		麻 劇	
8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻	注射	採用	ナルベイン注2mg	2mg1mL1管	ヒドロモルフォン塩酸塩		麻 劇	
8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻	内服	採用	ナルラビド錠1mg	1mg1錠	ヒドロモルフォン塩酸塩		麻 劇	

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク
8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻	内服	採用	ナルラビド錠2mg	2mg1錠	ヒドロモルフォン塩酸塩		麻 劇	
8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻	内服	採用	ナルラビド錠4mg	4mg1錠	ヒドロモルフォン塩酸塩		麻 劇	
8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻	注射	採用	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノ	1%1mL1管	モルヒネ塩酸塩水和物		麻 劇	
8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻	注射	採用	モルヒネ塩酸塩注射液200mg「シオ	4%5mL1管	モルヒネ塩酸塩水和物		麻 劇	
8. 2. 1 合成麻薬	内服	採用	アブストラル舌下錠100 μ g	100 μ g1錠	フェンタニルクエン酸塩		麻 劇	
8. 2. 1 合成麻薬	内服	採用	アブストラル舌下錠200 μ g	200 μ g1錠	フェンタニルクエン酸塩		麻 劇	
8. 2. 1 合成麻薬	外用	採用	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ	1mg1枚	フェンタニルクエン酸塩		麻 劇	
8. 2. 1 合成麻薬	外用	採用	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ	2mg1枚	フェンタニルクエン酸塩		麻 劇	
8. 2. 1 合成麻薬	外用	採用	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ	4mg1枚	フェンタニルクエン酸塩		麻 劇	
8. 2. 1 合成麻薬	外用	採用	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ	6mg1枚	フェンタニルクエン酸塩		麻 劇	
8. 2. 1 合成麻薬	注射	採用	フェンタニル注射液0. 1mg「テルモ	0. 005%2mL	フェンタニルクエン酸塩		麻 劇	
8. 2. 1 合成麻薬	外用	採用	フェントステープ0. 5mg	0. 5mg1枚	フェンタニルクエン酸塩		麻 劇	
8. 2. 1 合成麻薬	注射	採用	レミフェンタニル静注用2mg「第一三	2mg1瓶	レミフェンタニル塩酸塩	後発	麻 劇	

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
注射	採用	1%ディプリバン注ーキット	500mg50mL	プロポフォル		劇	
内服	採用	25mgアリナミンF糖衣錠	25mg1錠	フルスルチアミン			
外用	採用	5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	5%10g	サリチル酸	後発		
注射	採用	ATP注20mg「イセイ」	20mg1管	アデノシン三リン酸二ナト	後発		
注射	採用	DTビック	0. 1mL1瓶	沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド		劇	
注射	採用	DDライ透析剤3. 0S	2瓶1組	人工透析液			
注射	採用	EOB・プリモビスト注シリンジ	18. 143%10	ガドキセト酸ナトリウム			
注射 自注	採用	HMG注用75単位「あすか」	75単位1瓶(溶	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン			
注射	採用	KCL注20mEqキット「テルモ」	1モル20mL1	塩化カリウム			カリウム製剤
注射	採用	LHーRH注0. 1mg「ニプロ」	0. 1mg1管	ゴナドレリン酢酸塩			
内服	採用	MSコンチン錠10mg	10mg1錠	モルヒネ硫酸塩水和物		麻 劇	
内服	採用	MSコンチン錠30mg	30mg1錠	モルヒネ硫酸塩水和物		麻 劇	
外用	採用	PA・ヨード点眼・洗眼液	0. 2%1mL	ポリビニルアルコールヨウ素			
内服	採用	PL配合顆粒	1g	非ピリン系感冒剤		劇	
外用	採用	SPTローチ0. 25mg「明治」	0. 25mg1錠	デカリニウム塩化物	後発		
注射	採用	TRH注0. 5mg「ニプロ」	0. 5mg1管	プロチレリン			
注射 自注	採用	uFSH注用75単位「あすか」	75単位1瓶(溶	精製下垂体性性腺刺激ホルモン			
内服	採用	アーテン錠(2mg)	2mg1錠	トリヘキシフェニジル塩酸塩			
注射	採用	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流	500mL1キット	ブドウ糖・無機塩類配合剤			
注射	採用	アービタックス注射液100mg	100mg20mL	セツキシマブ(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍剤
外用	採用	アイオピジンUD点眼液1%	1%0. 1mL1個	アブラクロニン塩酸塩		劇	
内服	採用	アイビーディカブセル100	100mg1カプセ	スプラタストシル酸塩			
外用	採用	アイベータ配合点眼液	1mL	ブリモニジン酒石酸塩・チモロールマレイン酸塩			
外用	採用	アイラミド配合懸濁性点眼液	1mL	ブリモニジン酒石酸塩・プリンゾラミド			
注射	採用	アイリーア8mg硝子体内注射用キッ	8mg0. 07mL	アフリベルセプト(遺伝子組換え)		劇	
注射	採用	アイリーア硝子体内注射用キット40	2mg0. 05mL	アフリベルセプト(遺伝子組換え)		劇	
注射 自注	採用	アウィクリ注 フレックスタッチ 総量3C	300単位1キッ	インスリン イコデク(遺伝子組換え)		劇	膵臓ホルモン剤
注射 自注	院外	アウィクリ注 フレックスタッチ 総量7C	700単位1キッ	インスリン イコデク(遺伝子組換え)		劇	膵臓ホルモン剤
内服	採用	アキネトン錠1mg	1mg1錠	ビペリデン塩酸塩			
注射	採用	アキネトン注射液5mg	0. 5%1mL1管	乳酸ビペリデン		劇	
外用	採用	アクアチムクリーム1%	1%1g	ナジフロキサシン			
注射	限定	アクテムラ点滴静注用80mg	80mg4mL1瓶	トシリズマブ(遺伝子組換え)		劇	免疫抑制剤
注射 自注	限定	アクテムラ皮下注162mgオートイン	162mg0. 9m	トシリズマブ(遺伝子組換え)		劇	免疫抑制剤
外用	採用	アクトシン軟膏3%	3%1g	ブクラデシンナトリウム			
注射	採用	アクトヒブ	10 μ g1瓶(溶剤	乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(担体た		劇	
注射	限定	アクブラ静注用100mg	100mg1瓶	ネダブラチン		毒	抗悪性腫瘍剤
注射	限定	アクブラ静注用10mg	10mg1瓶	ネダブラチン		毒	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	アコアラン静注用1800	1800国際単位	アンチトロンビン ガンマ(遺伝子組換え)		特生	
注射	採用	アコアラン静注用600	600国際単位1	アンチトロンビン ガンマ(遺伝子組換え)		特生	
内服	採用	アコファイド錠100mg	100mg1錠	アコファイド塩酸塩水和物			
内服	採用	アザニン錠50mg	50mg1錠	アザチオプリン			免疫抑制剤
注射	採用	アシアロシンチ注	10MBq	ガラクトシル人血清アルブミンジエチレントリアミン			五酢酸テクネチウム(
注射	採用	アシクロビル点滴静注用250mg「サ	250mg1瓶	アシクロビル			
内服	採用	アジスロマイシン錠250mg「トーワ」	250mg1錠	アジスロマイシン水和物	後発		
外用	院外	アジマイシン点眼液1%	1%1mL	アジスロマイシン水和物			
内服	院外	アジルサルタンOD錠10mg「ケミフ	10mg1錠	アジルサルタン	後発		
内服	採用	アジルサルタンOD錠20mg「ケミフ	20mg1錠	アジルサルタン	後発		
内服	院外	アジレクト錠0. 5mg	0. 5mg1錠	ラサギリンメシル酸塩		劇	
内服	院外	アジレクト錠1mg	1mg1錠	ラサギリンメシル酸塩		劇	
注射	採用	アスコルビン酸注500mg「イセイ」	500mg1管	アスコルビン酸			
外用	採用	アズノールうがい液4%	4%1mL	アズレンスルホン酸ナトリ	後発		

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
外用	採用	アズノール軟膏0.033%	0.033%10g	ジメチルイソプロピルアズレン			
内服	採用	アスパラカリウム散50%	50%1g	Ｌ－アスパラギン酸カリウム			
内服	採用	アスパラカリウム錠300mg	300mg1錠	Ｌ－アスパラギン酸カリウム			
内服	採用	アスピリン原末「マルイシ」	10g	アスピリン			血液凝固阻 止 剤
外用	採用	アスプールの液(0.5%)	0.5%1mL	dl-イソブレンナリン塩酸塩			
内服	採用	アスペノンカプセル10	10mg1カプセル	アブリンジン塩酸塩		劇	不整脈用剤
内服	採用	アスベリン散10%	10%1g	チペピジンヒベンズ酸塩			
内服	採用	アスベリン錠20	20mg1錠	チペピジンヒベンズ酸塩			
内服	採用	アセトアミノフェン細粒20%「トーフ」	20%1g	アセトアミノフェン		劇	
注射	採用	アセリオ静注液1000mgバッグ	1000mg100mL	アセトアミノフェン		劇	
内服	採用	アゼルニジピン錠16mg「日医工」	16mg1錠	アゼルニジピン	後発		
内服	採用	アゾセミド錠30mg「JG」	30mg1錠	アゾセミド			
内服	採用	アゾセミド錠60mg「JG」	60mg1錠	アゾセミド	後発		
外用	採用	アゾルガ配合懸濁性点眼液	1mL	プリンゾラミド・チモロールマレイン酸塩			
内服	院外	アダプチノール錠5mg	5mg1錠	ヘレニエン			
内服	採用	アタラックス－Pカプセル25mg	25mg1カプセル	ヒドロキシジンパモ酸塩			精神神経用剤
内服	院外	アタラックス－Pドライシロップ2.5%	2.5%1g	ヒドロキシジンパモ酸塩			精神神経用剤
注射	採用	アタラックス－P注射液(50mg/mL)	5%1mL1管	ヒドロキシジン塩酸塩			精神神経用剤
注射 自注	採用	アダリムマブBS皮下注40mgペン0	40mg0.4mL	アダリムマブ(遺伝子組換え)	後発	劇	免疫抑制剤
注射 自注	採用	アダリムマブBS皮下注80mgペン0	80mg0.8mL	アダリムマブ(遺伝子組換え)	後発	劇	免疫抑制剤
内服	院外	アテディオ配合錠	1錠	バルサルタン・シルニジピン配合剤			
注射	採用	アデノシン負荷用静注60mgシリンジ	60mg20mL1	アデノシン	後発		
内服	採用	アデホスコ－ワ腸溶錠60	60mg1錠	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物			
内服	採用	アデホスコ－ワ顆粒10%	10%1g	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物			
外用	院外	アドエア100ディスカス60吸入用	60ブリスター1	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル			
外用	採用	アドエア250エアゾール120吸入用	12.0g1瓶	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル			
外用	院外	アドエア250ディスカス60吸入用	60ブリスター1	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル			
外用	院外	アドエア500ディスカス60吸入用	60ブリスター1	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル			
外用	院外	アドエア50エアゾール120吸入用	12.0g1瓶	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル			
内服	院外	アト－ゼット配合錠HD	1錠	エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤			
内服	院外	アト－ゼット配合錠LD	1錠	エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤			
注射	採用	アドステロール－I131注射液	1MBq	ヨウ化メチルノルコレステノール(131I)			
外用	採用	アドフィードパップ40mg	10cm×14cm	フルルビプロフェン			
外用	採用	アトラント外用液1%	1%1mL	ネチコナゾール塩酸塩			
外用	採用	アトラント軟膏1%	1%1g	ネチコナゾール塩酸塩			
内服	採用	アトルバスタチン錠10mg「サワイ」	10mg1錠	アトルバスタチンカルシウム水和物	後発		
注射	採用	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	0.1%1mL1管	アドレナリン		劇	
注射	採用	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	0.05%1mL1	アトロピン硫酸塩水和物		劇	不整脈用剤
内服	採用	アナストロゾール錠1mg「NK」	1mg1錠	アナストロゾール	後発	劇	抗悪性腫瘍剤
注射	限定	アナフラニール点滴静注液25mg	25mg1管	クロミプラミン塩酸塩		劇	精神神経用剤
外用	院外	アニュイティ100μgエリブタ30吸入	30吸入1キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル			
外用	院外	アニュイティ200μgエリブタ30吸入	30吸入1キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル			
注射	採用	アネメトロ点滴静注液500mg	500mg100m	メトロニダゾール			
外用	院外	アノーロエリブタ30吸入用	30吸入1キット	ウメクリニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩			
注射 自注	院外	アピドラ注ソロスター	300単位1キッ	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)	劇		膵臓ホルモン剤
内服	限定	アフィニール錠5mg	5mg1錠	エベロリス		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	採用	アブストラル舌下錠100μg	100μg1錠	フェンタニルクエン酸塩		麻 劇	
内服	採用	アブストラル舌下錠200μg	200μg1錠	フェンタニルクエン酸塩		麻 劇	
外用	院外	アフタッチ口腔用貼付剤25μg	25μg1錠	トリアムシノロンアセトニド			
注射	採用	アブラキサン点滴静注用100mg	100mg1瓶	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	毒 特生		抗悪性腫瘍剤
注射	採用	アフリベルセプトBS硝子体内注射用	2mg0.05mL	アフリベルセプト(遺伝子組換え)	劇		

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
内服	採用	アプレピタントカプセル125mg「サワ	125mg1カプセル	アプレピタント	後発		
内服	採用	アプレピタントカプセル80mg「サワイ	80mg1カプセル	アプレピタント	後発		
内服	採用	アマルエット配合錠4番「トーワ」	1錠	アムロジピンベシル酸塩	後発	劇	
内服	採用	アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワ	10%1g	アマンタジン塩酸塩	後発		
内服	採用	アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ	50mg1錠	アマンタジン塩酸塩	後発		
注射	採用	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE	150mg3mL1	アミオダロン塩酸塩	後発	劇	不整脈用剤
内服	採用	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「	100mg1錠	アミオダロン塩酸塩		毒	不整脈用剤
注射	採用	アミカシン硫酸塩注射液200mg「SV	200mg1管	アミカシン硫酸塩			
内服	採用	アミティーザカプセル12μg	12μg1カプセル	ルビプロストン			
内服	院外	アミティーザカプセル24μg	24μg1カプセル	ルビプロストン			
内服	採用	アミノレバニEN配合散	10g	肝不全用成分栄養剤			
注射	採用	アミノレバニ点滴静注	500mL1袋	肝不全用アミノ酸製剤			
注射	採用	アミパレン輸液	200mL1袋	高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤			
内服	採用	アムバロ配合錠「トーワ」	1錠	バルサルタン・アムロジピン	後発	劇	
注射	採用	アムビゾーム点滴静注用50mg	50mg1瓶	アムホテリシンB		毒	
内服	採用	アムロジピンOD錠2.5mg「明治」	2.5mg1錠	アムロジピンベシル酸塩		劇	
内服	採用	アムロジピンOD錠5mg「明治」	5mg1錠	アムロジピンベシル酸塩		劇	
内服	採用	アメナリーフ錠200mg	200mg1錠	アメナメビル			
内服	採用	アモキシシリンカプセル250mg「日	250mg1カプセル	アモキシシリン水和物			
注射	採用	アリクストラ皮下注1.5mg	1.5mg0.3mL	フォンダパリヌクスナトリウム			
外用	限定	アリケイス吸入液590mg	590mg8.4mL	アミカシン硫酸塩			
外用	院外	アリドネパッチ27.5mg	27.5mg1枚	ドネベジル		劇	
外用	院外	アリドネパッチ55mg	55mg1枚	ドネベジル		劇	
内服	採用	アリピプラゾールOD錠3mg「ニプロ	3mg1錠	アリピプラゾール	後発	劇	精神神経用剤
注射	採用	アルガトロバンHI注10mg/2mL「	10mg2mL1管	アルガトロバン水和物	後発		
注射	採用	アルギニン点滴静注30g「AY」	10%300mL1	L-アルギニン塩酸塩			
内服	院外	アルサルミン細粒90%	90%1g	スクラルファート水和物			
注射	採用	アルツディスポ関節注25mg	1%2.5mL1管	精製ヒアルロン酸ナトリウム			
内服	院外	アルドメット錠125	125mg1錠	メチルドパ水和物			
外用	採用	アルピニー坐剤100	100mg1個	アセトアミノフェン			
外用	採用	アルピニー坐剤200	200mg1個	アセトアミノフェン			
内服	採用	アルファカルシドール錠0.25μg「ア	0.25μg1錠	アルファカルシドール	後発	劇	
内服	採用	アルファカルシドール錠0.5μg「ア	0.5μg1錠	アルファカルシドール	後発	劇	
内服	採用	アルファカルシドール錠1.0μg「ア	1μg1錠	アルファカルシドール	後発	劇	
内服	採用	アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	0.4mg1錠	アルプラゾラム		精3	
注射	採用	アルプロスタジルアルファデクス注射	20μg1瓶	アルプロスタジル アルプロ	後発	劇	
注射	採用	アルプロスタジル注10μgシリンジ「	10μg2mL1管	アルプロスタジル	後発	劇	
注射	採用	アルベカシン硫酸塩注射液200mg「	200mg4mL1	アルベカシン硫酸塩		劇	
内服	採用	アルロイドG内用液5%	10mL	アルギン酸ナトリウム			
外用	院外	アレジオンLX点眼液0.1%	0.1%1mL	エビナスチン塩酸塩			
外用	院外	アレジオン眼瞼クリーム0.5%	0.5%1g	エビナスチン塩酸塩			
外用	院外	アレジオン点眼液0.05%	0.05%1mL	エビナスチン塩酸塩			
注射	採用	アレックスビー筋注用	1瓶(溶解液付)	組換えRSウイルスワクチン		劇	
内服	採用	アレビアチン散10%	10%1g	フェニトイン		劇	抗てんかん剤
内服	採用	アレビアチン錠100mg	100mg1錠	フェニトイン			抗てんかん剤
注射	採用	アレビアチン注250mg	5%5mL1管	フェニトインナトリウム		劇	抗てんかん剤
外用	採用	アレベール吸入用溶解液0.125%	0.125%1mL	チロキサポール			
内服	採用	アレロック顆粒0.5%	0.5%1g	オロパタジン塩酸塩			
内服	採用	アローゼン顆粒	1g	センナ・センナ実			
注射	採用	アロカリス点滴静注235mg	235mg10mL	ホスネツピタント塩化物塩酸塩		劇	
内服	採用	アロチノロール塩酸塩錠10mg「DS	10mg1錠	アロチノロール塩酸塩			不整脈用剤

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイスルク分類
内服	採用	アロプリノール錠100mg「ケミファ」	100mg1錠	アロプリノール	後発		
注射	限定	アンチレクス静注10mg	1%1mL1管	エドロホニウム塩化物		劇	
内服	採用	アンブロキシール塩酸塩錠15mg「サ	15mg1錠	アンブロキシール塩酸塩	後発		
注射	採用	イオパミドール(370)100mL注射液	75. 52%100	イオパミドール			
注射	採用	イオパミドール150注200mL「F」	30. 62%200	イオパミドール			
注射	採用	イオパミドール150注50mL「F」	30. 62%50m	イオパミドール			
注射	採用	イオパミドール300注100mL「F」	61. 24%100	イオパミドール			
注射	採用	イオパミドール300注50mL「F」	61. 24%50m	イオパミドール			
注射	採用	イオパミロン注300	61. 24%50m	イオパミドール			
注射	採用	イオパミロン注370	75. 52%50m	イオパミドール			
注射	採用	イオパミロン注370	75. 52%100	イオパミドール			
注射	採用	イオフエタミン(123I)注射液「第一」	10MBq	塩酸N-イソプロピル-4-ヨードアンフェタミン(123I)			
注射	採用	イオメロン350注100mL	71. 44%100	イオメプロール			
注射	採用	イオメロン350注50mL	71. 44%50m	イオメプロール			
注射	採用	イオメロン350注シリンジ100mL	71. 44%100	イオメプロール			
内服	採用	イグザレト錠2. 5mg	2. 5mg1錠	リバーロキサバン			血液凝固阻止剤
内服	外+限	イクスタンジ錠40mg	40mg1錠	エンザルタミド		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	外+限	イクスタンジ錠80mg	80mg1錠	エンザルタミド		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	採用	イスコチン錠100mg	100mg1錠	イソニアジド			
注射	採用	イスコチン注100mg	100mg1管	イソニアジド			
外用	採用	イソジンゲル10%	10%10g	ポビドンヨード			
注射	採用	イソゾール注射液0. 5g	500mg1瓶(溶	チアミラルナトリウム		劇	
内服	採用	イソソルビド内服ゼリー70%分包30	70%30g1個	イソソルビド			
内服	採用	イソソルビド内用液70%「CEO」	70%1mL	イソソルビド			
注射	採用	イソビスト注240	51. 26%10m	イオトロラン			
注射	採用	イソビスト注300	64. 08%10m	イオトロラン			
内服	採用	イソメニールカプセル7. 5mg	7. 5mg1カプセ	dl-イソプレナリン塩酸塩			
内服	採用	イトラコナゾール錠50mg「科研」	50mg1錠	イトラコナゾール	後発		
内服	採用	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	1%1mL	イトラコナゾール	後発		
外用	採用	イナビル吸入懸濁用160mgセット	160mg1瓶	ラニナミビルオクタン酸エステル水和物			
外用	採用	イナビル吸入粉末剤20mg	20mg1キット	ラニナミビルオクタン酸エステル水和物			
内服	院外	イニシク配合錠	1錠	アログリブチン安息香酸塩・メトホルミン		劇	糖尿病用剤
内服	採用	イノソリッド配合経腸用半固形剤	10g	経腸成分栄養剤			
注射	採用	イノバン注0. 3%シリンジ	0. 3%50mL1	ドバミン塩酸塩		劇	
内服	採用	イノラス配合経腸用液	10mL	経腸成分栄養剤			
注射	採用	イバンドロン酸静注1mgシリンジ「V	1mg1mL1筒	イバンドロン酸ナトリウム	後発	劇	
内服	採用	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「	20mg1錠	イフェンプロジル酒石酸塩			
内服	採用	イブランス錠125mg	125mg1錠	パルボシクリブ		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	採用	イブランス錠25mg	25mg1錠	パルボシクリブ		劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	イベニティ皮下注105mgシリンジ	105mg1. 17r	ロモズマブ(遺伝子組換え)			
内服	採用	イミグラン錠50	50mg1錠	スマトリプタンコハク酸塩		劇	
外用	外+限	イミグラン点鼻液20	20mg0. 1mL	スマトリプタン		劇	
内服	採用	イミダプリル塩酸塩錠5mg「DSEP」	5mg1錠	イミダプリル塩酸塩	後発		
注射	採用	イミフィンジ点滴静注120mg	120mg2. 4m	デュルバルマブ(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	イミフィンジ点滴静注500mg	500mg10mL	デュルバルマブ(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍剤
外用	採用	イムノブラダー膀胱注用40mg	40mg1瓶(溶解	乾燥BCG膀胱内用(日本株)		劇	抗悪性腫瘍剤
外用	採用	イムノブラダー膀胱注用80mg	80mg1瓶(溶解	乾燥BCG膀胱内用(日本株)		劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	イモバックスポリオ皮下注	0. 5mL1筒	不活化ポリオワクチン		劇	
注射	採用	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100r	100mg5mL1	イリノテカン塩酸塩水和物	後発	劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40m	40mg2mL1瓶	イリノテカン塩酸塩水和物		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	院外	イリボーOD錠2. 5μg	2. 5μg1錠	ラモセトロン塩酸塩		劇	

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
内服	院外	イリボーOD錠5 μ g	5 μ g1錠	ラモセトロン塩酸塩		劇	
内服	採用	イルアミクス配合錠HD「ケミファ」	1錠	イルベサルタン・アムロジ	後発	劇	
内服	院外	イルアミクス配合錠LD「ケミファ」	1錠	イルベサルタン・アムロジ	後発	劇	
内服	院外	イルトラ配合錠HD	1錠	イルベサルタン・トリクロルメチアジド配合剤			
内服	院外	イルトラ配合錠LD	1錠	イルベサルタン・トリクロルメチアジド配合剤			
内服	院外	イルベサルタン錠100mg「トーワ」	100mg1錠	イルベサルタン	後発		
内服	採用	イルベサルタン錠50mg「トーワ」	50mg1錠	イルベサルタン	後発		
内服	限定	イレッサ錠250	250mg1錠	ゲフィチニブ		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	採用	インクレミンシロップ5%	1mL	溶性ピロリン酸第二鉄	後発		
注射	採用	インジウムDTPA(111In)注	10MBq	ジエチレントリアミン五酢酸インジウム(111In)			
注射	採用	インジゴカルミン注20mg[AFP]	0.4%5mL1管	インジゴカルミン			
注射	自注採用	インスリン アスパルトBS注ソロスター	300単位1キッ	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	後発	劇	膵臓ホルモン剤
注射	自注採用	インスリン グラルギンBS注ミリオペ	300単位1キッ	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	後発	劇	膵臓ホルモン剤
注射	自注採用	インスリン リスプロBS注100単位ノ	100単位1mL	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	後発	劇	膵臓ホルモン剤
注射	自注採用	インスリン リスプロBS注ソロスター	300単位1キッ	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	後発	劇	膵臓ホルモン剤
内服	院外	インチュニブ錠1mg	1mg1錠	グアンファシン塩酸塩		劇	精神神経用剤
内服	院外	インチュニブ錠3mg	3mg1錠	グアンファシン塩酸塩		劇	精神神経用剤
外用	採用	インテバンクリーム1%	1%1g	インドメタシン			
内服	採用	インデラル錠10mg	10mg1錠	プロプラノロール塩酸塩		劇	不整脈用剤
注射	採用	インデラル注射液2mg	0.1%2mL1管	プロプラノロール塩酸塩		劇	不整脈用剤
注射	採用	イントラリボス輸液20%	20%100mL1	ダイズ油			
注射	採用	インフリキシマブBS点滴静注用100	100mg1瓶	インフリキシマブ(遺伝子組換え)	後発	劇	免疫抑制剤
注射	自注採用	ウゴービ皮下注0.25mg SD	0.25mg0.5r	セマグルチド(遺伝子組換え)		劇	糖尿病用剤
注射	自注採用	ウゴービ皮下注0.5mg SD	0.5mg0.5m	セマグルチド(遺伝子組換え)		劇	糖尿病用剤
注射	自注採用	ウゴービ皮下注1.0mg SD	1mg0.5mL1	セマグルチド(遺伝子組換え)		劇	糖尿病用剤
注射	自注採用	ウゴービ皮下注1.7mg SD	1.7mg0.75r	セマグルチド(遺伝子組換え)		劇	糖尿病用剤
注射	自注採用	ウゴービ皮下注2.4mg SD	2.4mg0.75r	セマグルチド(遺伝子組換え)		劇	糖尿病用剤
内服	院外	ウテメリン錠5mg	5mg1錠	リトドリン塩酸塩			
注射	採用	ウパシタ静注透析用25 μ gシリンジ	25 μ g1mL1筒	ウパシカルセトナトリウム水和物		劇	
注射	採用	ウパシタ静注透析用50 μ gシリンジ	50 μ g1mL1筒	ウパシカルセトナトリウム水和物		劇	
内服	採用	ウブレチド錠5mg	5mg1錠	ジスチグミン臭化物		毒	
内服	採用	ウリアデック錠40mg	40mg1錠	トピロキソスタット			
内服	採用	ウルソデオキシコール酸錠100mg「	100mg1錠	ウルソデオキシコール酸			
外用	採用	ウルティプロ吸入用カプセル	1カプセル	インダカテロールマレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物			
内服	採用	ウロカルン錠225mg	225mg1錠	ウラジログシエキス			
注射	採用	ウログラフイン注60%	60%20mL1管	アミドリゾ酸ナトリウムメグルミン			
注射	採用	ウロナーゼ静注用6万単位	60000単位1瓶	ウロキナーゼ			
外用	採用	ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%	3%3L1袋	D-ソルビトール			
外用	院外	エイベリス点眼液0.002%	0.002%1mL	オミデネバグ イソプロピル		劇	
外用	採用	エキザルベ	1g	混合死菌製剤			
注射	採用	エキシデンサー皮下注100mgペン	100mg1mL1	デベモキマブ(遺伝子組換え)		劇	
内服	採用	エキセメスタン錠25mg「NK」	25mg1錠	エキセメスタン	後発		抗悪性腫瘍剤
内服	院外	エクア錠50mg	50mg1錠	ビルダグリプチン			糖尿病用剤
内服	採用	エクセグラン散20%	20%1g	ゾニサミド		劇	抗てんかん剤
内服	採用	エクセグラン錠100mg	100mg1錠	ゾニサミド		劇	抗てんかん剤
内服	外+限	エクフィナ錠50mg	50mg1錠	サフィナミドメシル酸塩		劇	
内服	院外	エクメット配合錠HD	1錠	ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩	後発	劇	糖尿病用剤
内服	院外	エクメット配合錠LD	1錠	ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩	後発	劇	糖尿病用剤
外用	採用	エクラープラスター20 μ g/cm2	(1.5mg)7.5	デブロドンプロピオン酸エステル			
外用	院外	エクロックゲル5%	5%1g	ソフピロニウム臭化物			
外用	採用	エコ消エタ消毒液	10mL	エタノール			

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイスルク分類
内服	採用	エサンブトール錠125mg	125mg1錠	エタンブトール塩酸塩		劇	
外用	採用	エスクレ坐剤「250」	250mg1個	抱水クロラール			
外用	採用	エスクレ注腸用キット「500」	500mg1筒	抱水クロラール			
内服	採用	エスゾピクロン錠1mg「トーワ」	1mg1錠	エスゾピクロン	後発		
内服	院外	エスゾピクロン錠2mg「トーワ」	2mg1錠	エスゾピクロン	後発		
外用	院外	エストラーナテープ0.72mg	(0.72mg)9平	エストラジオール			
外用	採用	エストリール錠0.5mg	0.5mg1錠	エストリオール			
内服	院外	エストリオール錠1mg「F」	1mg1錠	エストリオール			
注射	限定	エスポー皮下用24000シリンジ	24000国際単位	エポエチン アルファ(遺伝子組換え)		劇	
内服	採用	エスワンタイホウ配合OD錠T20	20mg1錠(テガ)	テガフル・ギメラシル・メシナ	後発	劇	抗悪性腫瘍剤
内服	採用	エスワンタイホウ配合OD錠T25	25mg1錠(テガ)	テガフル・ギメラシル・メシナ	後発	劇	抗悪性腫瘍剤
内服	採用	エゼチミブOD錠10mg「トーワ」	10mg1錠	エゼチミブ	後発		
内服	採用	エソメプラゾールカプセル20mg「トーワ」	20mg1カプセル	エソメプラゾールマグネシウム塩	後発		
注射	採用	エダラボン点滴静注液30mg「バグ」	30mg100mL	エダラボン	後発		
内服	採用	エチゾラム錠0.5mg「SW」	0.5mg1錠	エチゾラム		精3	精神神経用剤
注射	採用	エトキシスクレロール1%注射液	1%30mL1瓶	ポリドカノール		劇	
注射	採用	エトボシド点滴静注液100mg「サン」	100mg5mL1	エトボシド	後発	劇	抗悪性腫瘍剤
内服	外+限	エドルミズ錠50mg	50mg1錠	アナモレリン塩酸塩		劇	
外用	院外	エナジア吸入用カプセル高用量	1カプセル	インダカテロール酢酸塩・グリコピロニウム臭化物・モメタゾンフランカル			
外用	院外	エナジア吸入用カプセル中用量	1カプセル	インダカテロール酢酸塩・グリコピロニウム臭化物・モメタゾンフランカル			
内服	院外	エナラプリルマレイン酸塩細粒1%「フ」	1%1g	エナラプリルマレイン酸塩	後発		
内服	採用	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「オ」	5mg1錠	エナラプリルマレイン酸塩			
内服	採用	エナロイ錠2mg	2mg1錠	エナロデュスタット		劇	
内服	採用	エナロイ錠4mg	4mg1錠	エナロデュスタット		劇	
内服	採用	エバスチンOD錠10mg「VTRS」	10mg1錠	エバスチン	後発		
内服	院外	エバスチンOD錠5mg「VTRS」	5mg1錠	エバスチン	後発		
内服	採用	エパデールEMカプセル2g	2g1包	イコサペント酸エチル			
内服	採用	エパルレストアット錠50mg「VTRS」	50mg1錠	エパルレストアット	後発		
内服	採用	エピスタ錠60mg	60mg1錠	ラロキシフェン塩酸塩			
内服	採用	エピナスチン塩酸塩錠20mg「VTRS」	20mg1錠	エピナスチン塩酸塩	後発		
内服	院外	エビプロスタット配合錠DB	1錠	オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤			
注射	自注院外	エビペン注射液0.15mg	0.15mg1筒	アドレナリン		劇	
注射	自注外+限	エビペン注射液0.3mg	0.3mg1筒	アドレナリン		劇	
注射	採用	エビルビシン塩酸塩注射液10mg「N」	10mg1瓶	エビルビシン塩酸塩	後発	劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	エビルビシン塩酸塩注射液50mg「N」	50mg1瓶	エビルビシン塩酸塩	後発	劇	抗悪性腫瘍剤
内服	院外	エブレオプチマル散50%	50%1g	エトスクシミド			抗てんかん剤
内服	採用	エフィエント錠2.5mg	2.5mg1錠	プラスグレル塩酸塩			血液凝固阻止剤
内服	採用	エフィエント錠3.75mg	3.75mg1錠	プラスグレル塩酸塩			血液凝固阻止剤
外用	院外	エフィナコナゾール爪外用液10%「科」	10%1g	エフィナコナゾール	後発		
内服	採用	エフビーOD錠2.5	2.5mg1錠	セレギリン塩酸塩		劇	
内服	採用	エブランチルカプセル15mg	15mg1カプセル	ウラビジル			
内服	採用	エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」	50mg1錠	エペリゾン塩酸塩	後発		
内服	院外	エベレンゾ錠100mg	100mg1錠	ロキサデュスタット		劇	
内服	採用	エベレンゾ錠20mg	20mg1錠	ロキサデュスタット		劇	
内服	採用	エベレンゾ錠50mg	50mg1錠	ロキサデュスタット		劇	
注射	採用	エポエチンアルファBS注1500シリンジ	1500国際単位	エポエチン カッパ(遺伝子組換え)	後発	劇	
注射	採用	エポエチンアルファBS注3000シリンジ	3000国際単位	エポエチン カッパ(遺伝子組換え)	後発	劇	
注射	採用	エホチール注10mg	1%1mL1管	エチレフリン塩酸塩		劇	
注射	自注	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	120mg1mL1	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)			
外用	採用	エムラクリーム	1g	リドカイン・プロピトカイン配合剤		劇	
内服	採用	エリキユース錠2.5mg	2.5mg1錠	アピキサバン			血液凝固阻止剤

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
内服	採用	エリキウス錠5mg	5mg1錠	アピキサバン			血液凝固阻止剤
外用	院外	エリザス点鼻粉末200 μ g28噴霧用	5.6mg1瓶	デキサメタゾンシベシル酸エステル			
内服	採用	エリスロシンドライシロップW20%	200mg1g	エリスロマイシンエチルコハク酸エステル			
内服	採用	エリスロシン錠200mg	200mg1錠	エリスロマイシステアリン酸塩			
注射	採用	エリブリンメシル酸塩静注液1mg「ニ	1mg2mL1瓶	エリブリンメシル酸塩	後発	毒	抗悪性腫瘍剤
内服	院外	エルカルチンFF錠100mg	100mg1錠	レボカルニチン			
内服	院外	エルカルチンFF錠250mg	250mg1錠	レボカルニチン			
注射	採用	エルカルチンFF静注1000mgシリン	1000mg5mL	レボカルニチン			
内服	外+限	エルカルチンFF内用液10%	10%1mL	レボカルニチン			
内服	院外	エルカルチンFF内用液10%分包10	10%10mL1包	レボカルニチン			
内服	院外	エルカルチンFF内用液10%分包5m	10%5mL1包	レボカルニチン			
注射	採用	エルシトニン注20Sディスポ	20エルカトニン	エルカトニン		劇	
注射	採用	エルシトニン注40単位	40エルカトニン	エルカトニン		劇	
内服	採用	エルデカルシールカプセル0.75 μ	0.75 μ g1カプ	エルデカルシール	後発	劇	
注射	採用	エルネオパNF1号輸液	1000mL1キッ	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン			
注射	採用	エルネオパNF1号輸液	1500mL1キッ	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン			
注射	採用	エルネオパNF2号輸液	1000mL1キッ	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン			
注射	採用	エルネオパNF2号輸液	1500mL1キッ	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン			
内服	採用	エレンタール配合内用剤	10g	経腸成分栄養剤			
内服	採用	エンシュア・H	10mL	経腸成分栄養剤			
注射	採用	エンタイビオ点滴静注用300mg	300mg1瓶	ベドリズマブ(遺伝子組換え)		劇	
注射	採用	エンタイビオ皮下注108mgベン	108mg0.68r	ベドリズマブ(遺伝子組換え)		劇	
内服	採用	エンドキサン錠50mg	50mg1錠	シクロホスファミド水和物		劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	エンハーツ点滴静注用100mg	100mg1瓶	トラスツズマブ デルクステカン(遺伝子	劇	劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	エンブレル皮下注25mgシリンジ0.4	25mg0.5mL	エタネルセプト(遺伝子組換え)		劇	免疫抑制剤
注射	採用	エンブレル皮下注50mgベン1.0m	50mg1mL1キ	エタネルセプト(遺伝子組換え)		劇	免疫抑制剤
内服	採用	エンレスト錠100mg	100mg1錠	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物			
内服	採用	エンレスト錠200mg	200mg1錠	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物			
内服	採用	エンレスト錠50mg	50mg1錠	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物			
内服	院外	オイグルコン錠1.25mg	1.25mg1錠	グリベンクラミド		劇	糖尿病用剤
外用	採用	オイラックスHクリーム	1g	ヒドロコルチゾン・クロタミトン			
外用	採用	オイラックスクリーム10%	10%10g	クロタミトン			
内服	採用	オーグメンチン配合錠250RS	(375mg)1錠	アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム			
注射	採用	オーツカMV注	1瓶1管1組	高カロリー輸液用総合ビタミン剤			
外用	注射	オーラ注歯科用カートリッジ1.0mL	1mL1管	リドカイン塩酸塩・アドレ	後発	劇	
外用	注射	オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL	1.8mL1管	リドカイン塩酸塩・アドレ	後発	劇	
注射	採用	オキサリプラチン点滴静注液100mg	100mg20mL	オキサリプラチン	後発	毒	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	オキサリプラチン点滴静注液50mg	50mg10mL1	オキサリプラチン	後発	毒	抗悪性腫瘍剤
外用	採用	オキサロール軟膏25 μ g/g	0.0025%1g	マキシカルシール		劇	
内服	採用	オキシコドン徐放錠10mgNX「第一	10mg1錠	オキシコドン塩酸塩水和物		麻 劇	
内服	採用	オキシコドン徐放錠20mgNX「第一	20mg1錠	オキシコドン塩酸塩水和物		麻 劇	
内服	採用	オキシコドン徐放錠40mgNX「第一	40mg1錠	オキシコドン塩酸塩水和物		麻 劇	
内服	採用	オキシコドン徐放錠5mgNX「第一	5mg1錠	オキシコドン塩酸塩水和物		麻 劇	
注射	採用	オキシコドン注射液10mg「第一三	1%1mL1管	オキシコドン塩酸塩水和物	後発	麻 劇	
注射	採用	オキシコドン注射液50mg「第一三	1%5mL1管	オキシコドン塩酸塩水和物	後発	麻 劇	
外用	採用	オキシドール「東海」	10mL	オキシドール			
外用	採用	オキナゾール錠600mg	600mg1錠	オキシコナゾール硝酸塩			
内服	採用	オキノーム散10mg	10mg1包	オキシコドン塩酸塩水和物		麻 劇	
内服	採用	オキノーム散2.5mg	2.5mg1包	オキシコドン塩酸塩水和物		麻 劇	
内服	採用	オキノーム散20mg	20mg1包	オキシコドン塩酸塩水和物		麻 劇	
内服	採用	オキノーム散5mg	5mg1包	オキシコドン塩酸塩水和物		麻 劇	

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
注射	自注採用	オクトレオチド酢酸塩皮下注100 μ g	100 μ g1mL1	オクトレオチド酢酸塩	後発	劇	
注射	採用	オザグレルNa点滴静注液80mg「ケ	80mg4mL1管	オザグレルナトリウム	後発		
注射	自注院外	オスタバロ皮下注カートリッジ1.5m	1.5mg0.75r	アバロバラチド酢酸塩			
内服	採用	オセルタミビルDS3%「サワイ」	3%1g	オセルタミビルリン酸塩	後発		
内服	採用	オセルタミビルカプセル75mg「サワ	75mg1カプセル	オセルタミビルリン酸塩	後発		
注射	自注採用	オゼンビック皮下注2mg	2mg1.5mL1	セマグルチド(遺伝子組換え)		劇	糖尿病用剤
内服	採用	オダイン錠125mg	125mg1錠	フルタミド		劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」	一人分1瓶(溶解)	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン		劇	
内服	院外	オテズラ錠10mg	10mg1錠	アブレミラスト		劇	
内服	院外	オテズラ錠20mg	20mg1錠	アブレミラスト		劇	
内服	院外	オテズラ錠30mg	30mg1錠	アブレミラスト		劇	
注射	限定	オニバイト点滴静注43mg	43mg10mL1	イリノテカン塩酸塩水和物		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	採用	オノンドライシロップ10%	10%1g	ブランルカスト水和物			
注射	採用	オビソート注射用0.1g	100mg1管(溶	アセチルコリン塩化物		劇	
外用	外+限	オフサロン点眼液	5mL1瓶	クロラムフェニコール・コリスチンメタン	スルホン酸ナトリウム		
注射	限定	オブジーボ点滴静注120mg	120mg12mL	ニボルマブ(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	オブジーボ点滴静注240mg	240mg24mL	ニボルマブ(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	院外	オブスミット錠10mg	10mg1錠	マシテンタン		劇	
内服	採用	オブソ内服液10mg	10mg5mL1包	モルヒネ塩酸塩水和物		麻 劇	
内服	採用	オブソ内服液5mg	5mg2.5mL1	モルヒネ塩酸塩水和物		麻 劇	
注射	採用	オプチレイ320注100mL	67.8%100m	イオベルソール			
注射	採用	オムニパーク300注シリンジ100ml	64.71%100	イオヘキソール			
内服	採用	オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル	2g1包	オメガー3脂肪酸エチル	後発		
外用	採用	オラビ錠口腔用50mg	50mg1錠	ミコナゾール			
内服	外+限	オラベナム小児用細粒10%	100mg1g	デビベナム ピボキシル			
外用	採用	オリブ油「ケンエー」	10mL	オリブ油			
内服	採用	オルケディア錠1mg	1mg1錠	エボカルセト		劇	
内服	採用	オルケディア錠2mg	2mg1錠	エボカルセト		劇	
内服	採用	オルケディア錠4mg	4mg1錠	エボカルセト		劇	
外用	採用	オルセノン軟膏0.25%	0.25%1g	トレチノイン トコフェリル			
注射	採用	オルダミン注射用1g	10%10g1瓶	モノエタノールアミノオレイン酸塩		劇	
注射	採用	オルドレブ点滴静注用150mg	150mg1瓶	コリスチンメタン	スルホン酸ナトリウム	劇	
外用	院外	オルベスコ100 μ gインヘラー56吸	5.6mg3.3g1	シクレソニド			
外用	採用	オルベスコ200 μ gインヘラー56吸	11.2mg3.3g	シクレソニド			
内服	採用	オルミエント錠2mg	2mg1錠	バリシチニブ		劇	免疫抑制剤
内服	採用	オルミエント錠4mg	4mg1錠	バリシチニブ		劇	免疫抑制剤
内服	採用	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP	20mg1錠	オルメサルタン メドキシ	後発		
注射	限定	オレンシア点滴静注用250mg	250mg1瓶	アバタセプト(遺伝子組換え)		劇	免疫抑制剤
注射	自注限定	オレンシア皮下注125mgオートイン	125mg1mL1	アバタセプト(遺伝子組換え)		劇	免疫抑制剤
内服	採用	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「ケミ	5mg1錠	オロパタジン塩酸塩	後発		
外用	採用	オロパタジン点眼液0.1%「センジュ	0.1%1mL	オロパタジン塩酸塩	後発		
注射	限定	オンコピン注射用1mg	1mg1瓶	ピンクリスチン硫酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	外+限	オンジェンティス錠25mg	25mg1錠	オビカボン		劇	
注射	採用	オンダンセトロン注4mgシリンジ「マ	4mg2mL1筒	オンダンセトロン塩酸塩	後発	劇	
外用	院外	オンプレス吸入用カプセル150 μ g	150 μ g1カプセル	インダカテロールマレイン酸塩			
注射	採用	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	0.5mL1筒	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス	劇		
注射	採用	カーディオライト注射液 第一	370MBq1筒	ヘキササキスメキシイソブチルイソニトリルテクネチウム(99mTc)			
注射	採用	カーディオライト注射液 第一	740MBq1筒	ヘキササキスメキシイソブチルイソニトリルテクネチウム(99mTc)			
注射	採用	カーディオライト注射液 第一	259MBq1筒	ヘキササキスメキシイソブチルイソニトリルテクネチウム(99mTc)			
注射	採用	カーボスター透析剤・L	6L1瓶(炭酸水	人工透析液			
内服	採用	ガスコンドロップ内用液2%	2%1mL	ジメチコン			

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
内服	採用	ガスコン錠40mg	40mg1錠	ジメチコン			
内服	採用	ガストログラフィン経口・注腸用	1mL	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン			
外用	院外	ガチフロ点眼液0.3%	0.3%1mL	ガチフロキサシン水和物			
内服	院外	カデチア配合錠HD「あすか」	1錠	カンデサルタン シレキセ	後発		
外用	採用	カデックス軟膏0.9%	0.9%1g	ヨウ素			
注射	採用	カドサイラ点滴静注用100mg	100mg1瓶	トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組)	劇		抗悪性腫瘍剤
注射	採用	カドサイラ点滴静注用160mg	160mg1瓶	トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組)	劇		抗悪性腫瘍剤
注射	採用	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ160.47%10m	60.47%10m	ガドブトロール			
注射	採用	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ560.47%5mL	60.47%5mL	ガドブトロール			
注射	採用	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ60.47%7.5	60.47%7.5	ガドブトロール			
内服	院外	カナグル錠100mg	100mg1錠	カナグリフロジン水和物			糖尿病用剤
内服	院外	カナリア配合OD錠	1錠	テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物・カナグリフ			糖尿病用剤
内服	院外	カバサル錠0.25mg	0.25mg1錠	カベルゴリン		劇	
内服	採用	カバサル錠1.0mg	1mg1錠	カベルゴリン		劇	
内服	採用	ガバペン錠200mg	200mg1錠	ガバペンチン			抗てんかん剤
内服	院外	ガバペン錠400mg	400mg1錠	ガバペンチン			抗てんかん剤
注射	採用	ガベキサートメシル酸塩注射用500	500mg1瓶	ガベキサートメシル酸塩		劇	
内服	採用	カペシタビン錠300mg「ヤクルト」	300mg1錠	カペシタビン	後発	劇	抗悪性腫瘍剤
内服	院外	カムシア配合錠HD「あすか」	1錠	カンデサルタン シレキセ	後発	劇	
内服	採用	カモスタットメシル酸塩錠100mg「サ	100mg1錠	カモスタットメシル酸塩			
内服	院外	ガラクターゼ散50%	50%1g	β-ガラクトシダーゼ(アスペルギルス)			
内服	採用	ガラタミンOD錠12mg「ニプロ」	12mg1錠	ガラタミン臭化水素酸塩	後発	劇	
内服	採用	ガラタミンOD錠4mg「ニプロ」	4mg1錠	ガラタミン臭化水素酸塩	後発	劇	
内服	採用	ガラタミンOD錠8mg「ニプロ」	8mg1錠	ガラタミン臭化水素酸塩	後発	劇	
内服	採用	カリジノゲナーゼ錠50単位「NIG」	50単位1錠	カリジノゲナーゼ	後発		
内服	採用	カリメート経口液20%	20%25g1包	ポリスチレンスルホン酸カルシウム			
内服	外+限	カリメート散	1g	ポリスチレンスルホン酸カルシウム			
注射	採用	カルシトリオール静注液0.5μg「F」	0.5μg1mL1	カルシトリオール	後発	劇	
注射	採用	カルシトリオール静注液1μg「F」	1μg1mL1管	カルシトリオール	後発	劇	
注射	採用	カルセド注射用20mg	20mg1瓶	アムルピシン塩酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	カルチコール注射液8.5%5mL	8.5%5mL1管	グルコン酸カルシウム水和物			
注射	採用	カルディオダイン注	10MBq	ヨードフェニルメチルペンタデカン酸(123I)			
外用	採用	カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%	2%1mL	カルテオロール塩酸塩	後発		
内服	採用	カルデナリンOD錠2mg	2mg1錠	ドキサゾシンメシル酸塩			
内服	採用	カルバゾクロムスルホン酸Na錠30n	30mg1錠	カルバゾクロムスルホン	後発		
注射	採用	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム	0.5%10mL1	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物			
内服	採用	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	100mg1錠	カルバマゼピン			抗てんかん剤
内服	採用	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	200mg1錠	カルバマゼピン			抗てんかん剤
内服	採用	カルベジロール錠10mg「トーワ」	10mg1錠	カルベジロール	後発		不整脈用剤
内服	採用	カルベジロール錠2.5mg「トーワ」	2.5mg1錠	カルベジロール			不整脈用剤
内服	採用	カルボシステインDS50%「トーワ」	50%1g	L-カルボシステイン			
内服	採用	カルボシステイン錠250mg「サワイ	250mg1錠	L-カルボシステイン			
注射	採用	カルボプラチン注射液150mg「NK」	150mg15mL	カルボプラチン		毒	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	カルボプラチン注射液50mg「NK」	50mg5mL1瓶	カルボプラチン		毒	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	カルボプラチン点滴静注液150mg「	150mg15mL	カルボプラチン		毒	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	カルボプラチン点滴静注液50mg「N	50mg5mL1瓶	カルボプラチン		毒	抗悪性腫瘍剤
内服	採用	カレトラ配合錠	1錠	ロピナビル・リトナビル		劇	抗HIV薬
内服	院外	カログラ錠120mg	120mg1錠	カロテグラステメチル		劇	
内服	採用	カロナール錠300	300mg1錠	アセトアミノフェン	後発		
内服	採用	カロナール錠500	500mg1錠	アセトアミノフェン	後発	劇	
注射	限定	ガンシクロビル点滴静注用500mg「	500mg1瓶	ガンシクロビル	後発	毒	

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
内服	採用	カンデサルタンOD錠8mg「サワイ」	8mg1錠	カンデサルタン シレキセ	後発		
注射	採用	ガンマグロブリン筋注1500mg/100mL	150mg1mL	人免疫グロブリン		特生	
注射	採用	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	200mg1瓶	カンレノ酸カリウム	後発	劇	
注射	採用	キイトルーダ点滴静注100mg	100mg4mL1	ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍剤
外用	採用	キシロカインゼリー2%	2%1mL	キシロカイン塩酸塩			
外用	採用	キシロカインボンブスプレー8%	1g	キシロカイン		劇	
外用	採用	キシロカイン液「4%」	4%1mL	キシロカイン塩酸塩			
注射	採用	キシロカイン注ポリアンブ1%	1%10mL1管	キシロカイン塩酸塩		劇	
注射	採用	キシロカイン注射液「0.5%」エビレナミ	0.5%10mL1	キシロカイン塩酸塩・アドレナリン		劇	
注射	採用	キシロカイン注射液「1%」エビレナミ	1%10mL1バイ	キシロカイン塩酸塩・アドレナリン		劇	
注射	採用	キシロカイン注射液「2%」エビレナミ	2%10mL1バイ	キシロカイン塩酸塩・アドレナリン		劇	
内服	採用	キックリンカプセル250mg	250mg1カプセル	ビキサロマー			
注射	採用	キドニーシンチTc-99m注	10MBq	ジメルカプトコハク酸テクネチウム(99mTc)			
注射	採用	キドミン輸液	200mL1袋	腎不全用アミノ酸製剤			
内服	院外	キプレスチュアブル錠5mg	5mg1錠	モンテルカストナトリウム			
内服	院外	キプレス細粒4mg	4mg1包	モンテルカストナトリウム			
内服	採用	キプレス錠5mg	5mg1錠	モンテルカストナトリウム			
注射	採用	キャップバックス筋注シリンジ	0.5mL1筒	21価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性)	劇		
内服	外+限	ギャバロン錠5mg	5mg1錠	バクロフェン		劇	
内服	採用	キャブピリン配合錠	1錠	アスピリン・ボノブラザンフマル酸塩配合剤			血液凝固阻止剤
外用	院外	キューパール100エアゾール	15mg8.7g1#	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル			
外用	採用	ギリアデル脳内留置用剤7.7mg	7.7mg1枚	カルムスチン		劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	キンダリー透析剤2E	2袋1組	人工透析液			
注射	採用	キンダリー透析剤AF2号	6L1瓶(炭酸水)	人工透析液			
注射	採用	クアトロバック皮下注シリンジ	0.5mL1キット	沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ワクチン	劇		
内服	採用	クービビック錠50mg	50mg1錠	ダリドレキサント塩酸塩			
内服	採用	グーフイス錠5mg	5mg1錠	エロピキシバット水和物			
内服	採用	クエチアピン錠100mg「DSEP」	100mg1錠	クエチアピンフマル酸塩	後発	劇	精神神経用剤
内服	採用	クエチアピン錠25mg「DSEP」	25mg1錠	クエチアピンフマル酸塩	後発	劇	精神神経用剤
内服	採用	クエンメット配合錠	1錠	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物			
注射	採用	クエン酸ガリウム(67Ga)注NMP	10MBq	クエン酸ガリウム(67Ga)			
注射	採用	クエン酸ガリウム-Ga67注射液	10MBq	クエン酸ガリウム(67Ga)			
内服	採用	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	鉄50mg1錠	クエン酸第一鉄ナトリウム			
内服	院外	クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.39g	1g	クエン酸第一鉄ナトリウム			
外用	院外	グラアルファ配合点眼液	1mL	リバスジル塩酸塩水和物・プリモニジン酒石酸塩			
外用	採用	グラナテック点眼液0.4%	0.4%1mL	リバスジル塩酸塩水和物			
注射	採用	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/30mL	3mg100mL1	グラニセトロン塩酸塩		劇	
内服	外+限	グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミ」	2mg1包	グラニセトロン塩酸塩	後発	劇	
内服	採用	クラバモックス小児用配合ドライシロ	(636.5mg)1	アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム			
内服	院外	クラリシッド錠50mg小児用	50mg1錠	クラリスロマイシン			
内服	採用	クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」	100mg1g	クラリスロマイシン			
内服	採用	クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	200mg1錠	クラリスロマイシン			
内服	院外	クリアナール錠200mg	200mg1錠	フドステイン			
注射	採用	クリアボーン注	10MBq	ヒドロキシメチレンジホスホン酸テクネチウム(99mTc)			
外用	採用	グリセリン「ケンエー」	10mL	グリセリン			
注射	採用	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	200mL1袋	濃グリセリン・果糖			
外用	採用	グリセリン浣腸「オヲタ」120	50%120mL1	グリセリン			
外用	採用	グリセリン浣腸「オヲタ」60	50%60mL1	グリセリン			
外用	採用	グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30	50%30mL1	グリセリン			
内服	採用	グリチロン配合錠	1錠	グリチルリチン・グリシン・DL-メチオニン配合剤			
外用	採用	クリプトン(81mKr)ジェネレータ	1患者当たり	クリプトン(81mKr)			

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
内服	採用	グリベック錠100mg	100mg1錠	イマチニブメシル酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	採用	グリミクロン錠40mg	40mg1錠	グリクラジド		劇	糖尿病用剤
内服	採用	グリメピリド錠1mg「Me」	1mg1錠	グリメピリド		劇	糖尿病用剤
注射	採用	クリンダマイシンリン酸エステル注射	600mg1管	クリンダマイシンリン酸エステル			
注射 自注	採用	グルカゴンGノボ注射用1mg	1mg1瓶	グルカゴン(遺伝子組換え)		劇	
注射	採用	グルトバ注600万	600万国際単位	アルテプラゼ(遺伝子組換え)			
内服	採用	グルベス配合錠	1錠	ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース配合			糖尿病用剤
注射	採用	クレキサン皮下注キット2000IU	2000低分子ヘ	エノキサバリンナトリウム		劇	
内服	院外	クレマスチンDS0.1%「タカタ」	0.1%1g	クレマスチンフマル酸塩	後発	劇	
内服	採用	クロチアゼパム錠5mg「トーワ」	5mg1錠	クロチアゼパム		精3	精神神経用剤
内服	採用	クロビドグレル錠75mg「SANIK」	75mg1錠	クロビドグレル硫酸塩	後発		血液凝固阻止剤
外用	院外	クロベタゾールプロピオン酸エステル	0.05%1g	クロベタゾールプロピオン	後発	劇	
外用	採用	クロベタゾールプロピオン酸エステル	0.05%1g	クロベタゾールプロピオン	後発	劇	
外用	採用	クロベタゾールプロピオン酸エステル	0.05%1g	クロベタゾールプロピオン	後発	劇	
外用	採用	クロマイ腔錠100mg	100mg1錠	クロラムフェニコール			
内服	院外	クロミッド錠50mg	50mg1錠	クロミフェンクエン酸塩			
外用	採用	クロモグリク酸Na吸入液1%「サイ	1%2mL1管	クロモグリク酸ナトリウム			
注射	採用	クロロマイセチンサクシネート静注用	1g1瓶(溶解液)	クロラムフェニコールコハク酸エステルナトリウム			
内服	採用	ケアラム錠25mg	25mg1錠	イグラチモド		劇	免疫抑制剤
注射	採用	ケイツーN静注10mg	10mg1管	メナテレノン			
外用	採用	ゲーベングリーム1%	1%1g	スルファジアジン銀			
注射	採用	ケサンラ点滴静注液350mg	350mg20mL	ドナネマブ(遺伝子組換え)		劇	
注射 自注	外+限	ケシンプタ皮下注20mgベン	20mg0.4mL	オファツムマブ(遺伝子組換え)		劇	
内服	採用	ケタスカプセル10mg	10mg1カプセル	イブジラスト			
注射	採用	ケタラール筋注用500mg	500mg10mL	ケタミン塩酸塩		麻 劇	
注射	採用	ケタラール静注用200mg	200mg20mL	ケタミン塩酸塩		麻 劇	
外用	院外	ケトプロフェン(30mg)10cm×14cm	10cm×14cm	ケトプロフェン			
注射	採用	ケナコルトーA筋注用関節腔内用水	40mg1mL1瓶	トリアムシノロンアセトニド			免疫抑制剤
注射	採用	ケナコルトーA皮内用関節腔内用水	10mg1mL1バ	トリアムシノロンアセトニド			免疫抑制剤
注射	採用	ゲムシタピン点滴静注用1g「NK」	1g1瓶	ゲムシタピン塩酸塩	後発	劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	ゲムシタピン点滴静注用200mg「N	200mg1瓶	ゲムシタピン塩酸塩	後発	劇	抗悪性腫瘍剤
内服	採用	ケレンディア錠10mg	10mg1錠	フィネレノン			
内服	採用	ケレンディア錠20mg	20mg1錠	フィネレノン			
注射	採用	ゲンタマイシン硫酸塩注射液40mg「	40mg1管	ゲンタマイシン硫酸塩		劇	
外用	採用	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イ	1mg1g	ゲンタマイシン硫酸塩			
注射	採用	コアベータ静注用12.5mg	12.5mg1瓶	ランジオロール塩酸塩		劇	不整脈用剤
内服	採用	コートリル錠10mg	10mg1錠	ヒドロコルチゾン			免疫抑制剤
注射	限定	コートロシンZ筋注0.5mg	0.5mg1瓶	テトラコサクチド酢酸塩			抗てんかん剤
注射	採用	コートロシン注射用0.25mg	0.25mg1瓶(3	テトラコサクチド酢酸塩			
注射	採用	ゴービック水性懸濁注シリンジ	0.5mL1筒	沈降精製百日せきジフテリア破傷風不		劇	
外用	院外	コルタイジン点鼻液	1mL	テトラヒドロゾリン塩酸塩・プレドニゾロン			
内服	採用	コタロー柴胡桂枝乾姜湯エキス細粒	1g	柴胡桂枝乾姜湯エキス			
内服	採用	コタロー小柴胡湯エキス細粒	1g	小柴胡湯エキス			
内服	採用	コタロー小青竜湯エキス細粒	1g	小青竜湯エキス			
内服	院外	コタロー苓桂朮甘湯エキス細粒	1g	苓桂朮甘湯エキス			
内服	採用	コデインリン酸塩散1%「メタル」	1%1g	コデインリン酸塩水和物		劇	
注射 自注	限定	ゴナールエフ皮下注ペン450	450国際単位0	ホリトロピン アルファ(遺伝子組換え)			
注射 自注	限定	ゴナールエフ皮下注ペン900	900国際単位1	ホリトロピン アルファ(遺伝子組換え)			
注射	採用	ゴナックス皮下注用120mg	120mg1瓶(溶	デガレリクス酢酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	ゴナックス皮下注用240mg	240mg1瓶(溶	デガレリクス酢酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	ゴナックス皮下注用80mg	80mg1瓶(溶角	デガレリクス酢酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイスルク分類
注射	自注	限定	ゴナトロピン注用5000単位	5000単位1瓶	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン		
外用	院外	コムクロシヤンプー0.05%	0.05%1g	クロベタゾールプロピオン酸エステル	劇		
内服	採用	コムタン錠100mg	100mg1錠	エンタカボン			
内服	採用	コメリアンコーワ錠100	100mg1錠	ジラゼブ塩酸塩水和物			
内服	採用	コメリアンコーワ錠50	50mg1錠	ジラゼブ塩酸塩水和物			
内服	採用	コラン錠2.5mg	2.5mg1錠	イバブラジン塩酸塩		劇	
内服	採用	コラン錠5mg	5mg1錠	イバブラジン塩酸塩		劇	
内服	院外	コラン錠7.5mg	7.5mg1錠	イバブラジン塩酸塩		劇	
注射	採用	コルスバ静注透析用シリンジ17.5μ	17.5μg0.7mL	ジフェリケファリン酢酸塩			
注射	採用	コルスバ静注透析用シリンジ25.0μ	25μg0.7mL	ジフェリケファリン酢酸塩			
注射	採用	コルスバ静注透析用シリンジ35.0μ	35μg0.7mL	ジフェリケファリン酢酸塩			
内服	採用	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	0.5mg1錠	コルヒチン		劇	
外用	院外	コレクチム軟膏0.5%	0.5%1g	デルゴシチニブ			
内服	院外	コレチメント錠9mg	9mg1錠	ブデソニド			免疫抑制剤
内服	院外	コンサータ錠18mg	18mg1錠	メチルフェニデート塩酸塩		劇 精1	精神神経用剤
内服	院外	コンサータ錠27mg	27mg1錠	メチルフェニデート塩酸塩		劇 精1	精神神経用剤
内服	院外	コンサータ錠36mg	36mg1錠	メチルフェニデート塩酸塩		劇 精1	精神神経用剤
注射	採用	コントミン筋注10mg	0.5%2mL1管	クロルプロマジン塩酸塩		劇	精神神経用剤
内服	採用	コンバントリンドライシロップ100mg	10%1g	ピランテルパモ酸塩			
内服	院外	コンブラビン配合錠	1錠	クロビドグレル硫酸塩・アスピリン			血液凝固阻止剤
外用	採用	コンベッククリーム5%	5%1g	ウフェナマート			
内服	限定	ザーコリカプセル200mg	200mg1カプセル	クリゾチニブ		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	限定	ザーコリカプセル250mg	250mg1カプセル	クリゾチニブ		劇	抗悪性腫瘍剤
外用	採用	ザーネ軟膏0.5%	5000単位1g	ビタミンA油			
注射	採用	サーバリックス	0.5mL1筒	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス	劇		
内服	採用	ザイザルシロップ0.05%	0.05%1mL	レボセチリジン塩酸塩			
内服	採用	ザイザル錠5mg	5mg1錠	レボセチリジン塩酸塩			
内服	院外	ザイティガ錠250mg	250mg1錠	アビラテロン酢酸エステル		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	院外	ザイティガ錠500mg	500mg1錠	アビラテロン酢酸エステル		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	院外	サイトテック錠200	200μg1錠	ミソプロストール		劇	
外用	採用	サイブレジン1%点眼液	1%1mL	シクロペントラート塩酸塩			
注射	採用	サイラムザ点滴静注液100mg	100mg10mL	ラムシルマブ(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	サイラムザ点滴静注液500mg	500mg50mL	ラムシルマブ(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	採用	サイレース錠2mg	2mg1錠	フルニトラゼパム		精2	
注射	採用	サイレース静注2mg	2mg1管	フルニトラゼパム		精2	
内服	採用	サインバルタカプセル20mg	20mg1カプセル	デュロキセチン塩酸塩		劇	精神神経用剤
内服	院外	ザジテンドライシロップ0.1%	0.1%1g	ケトチフェンフマル酸塩			
外用	採用	ザジテン点鼻液0.05%	6.048mg8m	ケトチフェンフマル酸塩			
注射	採用	ザバクサ配合点滴静注用	(1.5g)1瓶	セフトロザン硫酸塩・タゾバクタムナトリウム			
内服	院外	ザファテック錠100mg	100mg1錠	トララグリブチンコハク酸塩			糖尿病用剤
注射	採用	サブラッド血液ろ過用補充液BSG	2020mL1キット	人工透析液			
内服	限定	サムスカOD錠15mg	15mg1錠	トルバプタン		劇	
内服	限定	サムスカOD錠7.5mg	7.5mg1錠	トルバプタン		劇	
注射	採用	サムタス点滴静注用8mg	8mg1瓶	トルバプタンリン酸エステルナトリウム		劇	
内服	採用	サラジェン顆粒0.5%	5mg1包	ピロカルピン塩酸塩		劇	
内服	採用	サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg	500mg1錠	サラゾスルファピリジン	後発		
内服	院外	サリグレンカプセル30mg	30mg1カプセル	セビメリン塩酸塩水和物			
外用	採用	サリチル酸「ケンエー」	10g	サリチル酸			
外用	採用	サリベートエアゾール	50g1個	リン酸ニカリウム・無機塩類配合剤			
外用	採用	サルタノールインヘラー100μg	0.16%13.5mL	サルブタモール硫酸塩			
注射	採用	ザルトラップ点滴静注100mg	100mg4mL1瓶	アフリベルセプト ベータ(遺伝子組換え)	劇		抗悪性腫瘍剤

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
注射	採用	ザルトラップ点滴静注200mg	200mg8mL1	アフリベルセプト ペータ(遺伝子組換え)	劇		抗悪性腫瘍剤
内服	採用	サルボグレラート塩酸塩錠100mg	100mg1錠	サルボグレラート塩酸塩	後発		
外用	採用	サンドールP点眼液	1mL	トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩			
注射	採用	サンドスタチンLAR筋注用キット20r	20mg1キット	オクトレオチド酢酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤
注射	限定	サンドスタチンLAR筋注用キット30r	30mg1キット	オクトレオチド酢酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤
外用	採用	サンピロ点眼液2%	2%5mL1瓶	ピロカルピン塩酸塩		劇	
外用	採用	サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%	0.1%1mL	ベタメタゾンリン酸エステル	後発		
注射	採用	サンリズム注射液50	50mg5mL1管	ピルシカイニド塩酸塩水和物		劇	不整脈用剤
注射	採用	ジアグノグリーン注射用25mg	25mg1瓶(溶解)	インドシアニングリーン			
内服	採用	ジアゼパム錠2「トーフ」	2mg1錠	ジアゼパム	後発	精3	
内服	院外	ジアゼパム錠5「トーフ」	5mg1錠	ジアゼパム	後発	精3	
注射	採用	ジアゼパム注射液10mg「NIG」	10mg1管	ジアゼパム		精3	
外用	採用	シアノコバラミン点眼液0.02%「ニッ	0.02%5mL1	シアノコバラミン	後発		
注射	採用	ジーラスタ皮下注3.6mgボディーボ	3.6mg0.36r	ベグフィルグラスチム(遺伝子組換え)			
内服	採用	ジェイゾロフト錠50mg	50mg1錠	セルトラリン塩酸塩		劇	精神神経用剤
注射	採用	ジェービックV	一人分1瓶(溶解)	乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン		劇	
内服	採用	ジェニナック錠200mg	200mg1錠	メシル酸ガレノキサシン水和物			
内服	院外	ジェノゲスト錠0.5mg「モチダ」	0.5mg1錠	ジェノゲスト	後発		
内服	院外	ジェノゲスト錠1mg「モチダ」	1mg1錠	ジェノゲスト	後発		
注射	自注	ジェントロピンゴークイック注用12mg	12mg1キット	ソマトロピン(遺伝子組換え)			
注射	自注	ジェントロピンゴークイック注用5.33mg	5.33mg1キット	ソマトロピン(遺伝子組換え)			
内服	院外	ジェミナー配合錠	1錠	レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール			
内服	限定	ジオトリフ錠20mg	20mg1錠	アフアチニブマレイン酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	限定	ジオトリフ錠30mg	30mg1錠	アフアチニブマレイン酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	限定	ジオトリフ錠40mg	40mg1錠	アフアチニブマレイン酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	ジオン注無痛化剤付	10mL1瓶(希釈)	硫酸アルミニウムカリウム水和物・タン		劇	
外用	院外	ジクアスLX点眼液3%	3%5mL1瓶	ジクアホソルナトリウム			
外用	採用	ジクアス点眼液3%	3%5mL1瓶	ジクアホソルナトリウム			
外用	採用	ジクトルテープ75mg	75mg1枚	ジクロフェナクナトリウム			
内服	採用	ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」	25mg1錠	ジクロフェナクナトリウム	後発	劇	
外用	院外	ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg	12.5mg1個	ジクロフェナクナトリウム		劇	
外用	採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg	25mg1個	ジクロフェナクナトリウム		劇	
外用	採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg	50mg1個	ジクロフェナクナトリウム		劇	
内服	院外	ジゴシン散0.1%	0.1%1g	ジゴキシン		劇	ジギタリス製剤
注射	採用	ジゴシン注0.25mg	0.025%1mL	ジゴキシン		劇	ジギタリス製剤
注射	採用	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ	10mg20mL1	シスプラチン		毒	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ	50mg100mL	シスプラチン		毒	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	ジスロマック点滴静注用500mg	500mg1瓶	アジスロマイシン水和物			
内服	院外	ジセラカ錠100mg	100mg1錠	フィルゴチニブマレイン酸塩		劇	免疫抑制剤
内服	院外	ジセラカ錠200mg	200mg1錠	フィルゴチニブマレイン酸塩		劇	免疫抑制剤
内服	採用	ジソピラミド徐放錠150mg「VTRS」	150mg1錠	ジソピラミドリン酸塩	後発	劇	不整脈用剤
内服	採用	シダキュアスギ花粉舌下錠2000JA	2000JAU1錠	スギ花粉エキス			
内服	院外	シダキュアスギ花粉舌下錠5000JA	5000JAU1錠	スギ花粉エキス			
内服	採用	シタフロキサシン錠50mg「サワイ」	50mg1錠	シタフロキサシン水和物			
内服	採用	シナール配合錠	1錠	アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム			
注射	採用	シナジス筋注液100mg	100mg1mL1	パリビズマブ(遺伝子組換え)			
注射	採用	シナジス筋注液50mg	50mg0.5mL	パリビズマブ(遺伝子組換え)			
内服	院外	ジピリダモール散12.5%「JG」	12.5%1g	ジピリダモール	後発		
内服	採用	ジプレキサザイデイス錠2.5mg	2.5mg1錠	オランザピン		劇	精神神経用剤
内服	採用	ジプレキサザイデイス錠5mg	5mg1錠	オランザピン		劇	精神神経用剤
内服	採用	シベンノール錠50mg	50mg1錠	シベンゾリンコハク酸塩		劇	不整脈用剤

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
注射	採用	シベノール静注70mg	70mg5mL1管	シベンブリンコハク酸塩		劇	不整脈用剤
外用	採用	シムビコートタービュヘイラー60吸入	60吸入1キット	ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物			
内服	採用	ジャディアンス錠10mg	10mg1錠	エンパグリフロジン			糖尿病用剤
内服	採用	ジャディアンス錠25mg	25mg1錠	エンパグリフロジン			糖尿病用剤
内服	院外	ジャドニユ顆粒分包360mg	360mg1包	デフェラシロクス		劇	
内服	院外	ジャドニユ顆粒分包90mg	90mg1包	デフェラシロクス		劇	
内服	採用	ジャヌビア錠50mg	50mg1錠	シタグリブチンリン酸塩水和物			糖尿病用剤
内服	採用	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg	100mg1カプセル	ジルチアゼム塩酸塩	後発		
注射	採用	ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「	50mg1瓶	ジルチアゼム塩酸塩	後発	劇	不整脈用剤
内服	院外	ジルテック錠10	10mg1錠	セチリジン塩酸塩			
内服	採用	シルニジピン錠10mg「サワイ」	10mg1錠	シルニジピン	後発		
内服	採用	ジルムロ配合錠HD「武田テバ」	1錠	アジルサルタン・アムロジ	後発	劇	
内服	院外	ジルムロ配合錠LD「武田テバ」	1錠	アジルサルタン・アムロジ	後発	劇	
内服	院外	ジレニアカプセル0.5mg	0.5mg1カプセル	フィンゴリモド塩酸塩		劇	
内服	採用	シロスタゾールOD錠100mg「トーワ	100mg1錠	シロスタゾール	後発		血液凝固阻止剤
内服	採用	シロドシンOD錠4mg「ケミファ」	4mg1錠	シロドシン	後発	劇	
内服	採用	シントス錠50mg	50mg1錠	ヒスチジン亜鉛水和物		劇	
内服	院外	シンバスタチン錠5mg「YD」	5mg1錠	シンバスタチン			
注射	採用	シンビット静注用50mg	50mg1瓶	ニフェカラント塩酸塩		劇	不整脈用剤
注射 自注	採用	シンボニー皮下注50mgオートインジ	50mg0.5mL	ゴリムマブ(遺伝子組換え)		劇	免疫抑制剤
内服	採用	スインブロイク錠0.2mg	0.2mg1錠	ナルデメジントシル酸塩			
内服	採用	スーグラ錠50mg	50mg1錠	イブラグリフロジン L-プロリン			糖尿病用剤
内服	院外	スージャス配合錠	1錠	シタグリブチンリン酸塩水和物・イブラグリフロジン			糖尿病用剤
内服	院外	スーテントカプセル12.5mg	12.5mg1カプセル	スニチニブリンゴ酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤
外用	採用	スーブレイン吸入麻酔液	1mL	デスフルラン		劇	
注射	採用	スガマデクス静注液200mg「マルイ	200mg2mL1	スガマデクスナトリウム	後発		
注射	採用	スキサメニウム注100「マルイシ」	2%5mL1管	スキサメニウム塩化物水和物		毒	
外用	採用	スコピゾル眼科用液	1mL	ヒドロキシエチルセルロース・無機塩類配合剤			
内服	院外	スタレボ配合錠L100	1錠	レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカボン			
内服	院外	スタレボ配合錠L50	1錠	レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカボン			
内服	採用	スチバーガ錠40mg	40mg1錠	レゴラフェニブ水和物		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	採用	ステーブラOD錠0.1mg	0.1mg1錠	イミダフェナシン			
外用	採用	ステリクロンR液0.1	0.1%10mL	クロルヘキシジングルコン酸塩			
注射	限定	ステルイズ水性懸濁筋注240万単位	240万単位1筒	ベンジルペニシリンベンザチン水和物			
内服	院外	ストラテラカプセル10mg	10mg1カプセル	アトモキセチン塩酸塩		劇	精神神経用剤
内服	院外	ストラテラカプセル25mg	25mg1カプセル	アトモキセチン塩酸塩		劇	精神神経用剤
内服	院外	ストラテラカプセル40mg	40mg1カプセル	アトモキセチン塩酸塩		劇	精神神経用剤
内服	院外	ストラテラカプセル5mg	5mg1カプセル	アトモキセチン塩酸塩		劇	精神神経用剤
注射	限定	ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「	1g1瓶	ストレプトマイシン硫酸塩			
内服	採用	ストロメクトール錠3mg	3mg1錠	イベルメクチン		劇	
内服	採用	スパカール錠40mg	40mg1錠	トレピトン			
外用	採用	スピール膏M	25平方cm1枚	サリチル酸			
外用	採用	スピオルトレスビマット60吸入	60吸入1キット	チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩			
外用	採用	スピリーバ2.5μgレスビマット60吸	150μg1キット	チオトロピウム臭化物水和物			
外用	院外	スピリーバ吸入用カプセル18μg	18μg1カプセル	チオトロピウム臭化物水和物			
内服	採用	スピロラクトン錠25mg「NP」	25mg1錠	スピロノラクトン	後発		
内服	院外	スピロペント錠10μg	10μg1錠	クレンブテロール塩酸塩			
外用	採用	スミスリンローション5%	5%1g	フェントリン			
内服	院外	スリンダ錠28	(28日分)1組	ドロスピレノン			
内服	採用	スルピリド錠50mg「サワイ」	50mg1錠	スルピリド	後発		精神神経用剤
外用	採用	セタネオ点眼液0.002%	0.002%1mL	セバタプロスト			

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
注射	自注院外	ゼップバウンド皮下注10mgアテオス	10mg0. 5mL	チルゼパチド		劇	糖尿病用剤
注射	自注院外	ゼップバウンド皮下注12. 5mgアテ	12. 5mg0. 5r	チルゼパチド		劇	糖尿病用剤
注射	自注院外	ゼップバウンド皮下注15mgアテオス	15mg0. 5mL	チルゼパチド		劇	糖尿病用剤
注射	自注院外	ゼップバウンド皮下注2. 5mgアテオ	2. 5mg0. 5m	チルゼパチド		劇	糖尿病用剤
注射	自注院外	ゼップバウンド皮下注5mgアテオス	5mg0. 5mL1	チルゼパチド		劇	糖尿病用剤
注射	自注院外	ゼップバウンド皮下注7. 5mgアテオ	7. 5mg0. 5m	チルゼパチド		劇	糖尿病用剤
内服	採用	セディール錠10mg	10mg1錠	タンドスピロンクエン酸塩		劇	
内服	採用	セネガシロップ「メタル」	10mL	セネガ			
外用	院外	ゼビアックスローション2%	2%1g	オゼノキサシン			
内服	採用	セファクロル細粒小児用10%「SW」	100mg1g	セファクロル			
注射	採用	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医	1g1瓶	セファゾリンナトリウム			
内服	採用	セファドール錠25mg	25mg1錠	ジフェニドール塩酸塩			
内服	院外	セファランチン末1%	1%1g	セファランチン			
内服	採用	セファレキシシン錠250mg「日医工」	250mg1錠	セファレキシシン			
内服	院外	ゼフィックス錠100	100mg1錠	ラムブジン		劇	
注射	採用	セフェピム塩酸塩静注用1g「CMX」	1g1瓶	セフェピム塩酸塩水和物	後発		
注射	採用	セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」	1g1瓶	セフォチアム塩酸塩			
内服	院外	セフジトレンピボキシル錠100mg「S	100mg1錠	セフジトレン ピボキシル			
内服	院外	セフゾン細粒小児用10%	100mg1g	セフジニル			
注射	採用	セフトラジウム静注用1g「VTRS」	1g1瓶	セフトラジウム水和物			
注射	採用	セフトリアキソンナトリウム静注用1g	1g1瓶	セフトリアキソンナトリウム水和物			
内服	院外	セフボドキシムプロキセチル錠100n	100mg1錠	セフボドキシム プロキセチル	後発		
注射	採用	セフメタゾールナトリウム静注用1g「	1g1瓶	セフメタゾールナトリウム			
内服	院外	ゼボジアカプセル0. 92mg	0. 92mg1カプ	オザニモド塩酸塩		劇	
内服	院外	ゼボジアカプセルスターターパック	1カプセル	オザニモド塩酸塩		劇	
外用	採用	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	1mL	セボフルラン	後発	劇	
内服	院外	セララ錠25mg	25mg1錠	エブレノン			
内服	採用	セララ錠50mg	50mg1錠	エブレノン			
内服	採用	セルシン散1%	1%1g	ジアゼパム		精3	
外用	院外	セルタッチパップ70	10cm×14cm	フェルビナク			
内服	院外	セルニルトン錠	1錠	セルニチンボーレンエキス			
外用	採用	ゼルフフォーム	2cm×6cm×0	ゼラチン			
内服	採用	セレコキシブ錠100mg「ケミファ」	100mg1錠	セレコキシブ	後発	劇	
内服	院外	セレストアミン配合錠	1錠	ベタメタゾン・d-ークロルフェニラミンマレイン酸塩			免疫抑制剤
内服	院外	セレニカR錠400mg	400mg1錠	バルプロ酸ナトリウム			抗てんかん剤
内服	採用	セレニカR顆粒40%	40%1g	バルプロ酸ナトリウム			抗てんかん剤
外用	院外	セレベント50ディスクス	50μg60ブリス	サルメテロールキシナホ酸塩			
内服	院外	ゼンタコートカプセル3mg	3mg1カプセル	ブデソニド			免疫抑制剤
内服	採用	センノシド錠12mg「サワイ」	12mg1錠	センノシド	後発		
注射	自注院外	ソグルーヤ皮下注10mg	10mg1. 5mL	ソマブシタン(遺伝子組換え)			
注射	自注院外	ソグルーヤ皮下注15mg	15mg1. 5mL	ソマブシタン(遺伝子組換え)			
注射	自注院外	ソグルーヤ皮下注5mg	5mg1. 5mL1	ソマブシタン(遺伝子組換え)			
内服	採用	ゾコーバ錠125mg	125mg1錠	エンシトレルビル フマル酸		劇	
注射	採用	ソセゴン注射液15mg	15mg1管	ペンタゾシン		劇 精2	
注射	採用	ソナゾイド注射用16μL	1瓶(溶解液付)	ペルフルブタン			
内服	採用	ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP	25mg1錠	ゾニサミド	後発	劇	
内服	院外	ゾニサミドOD錠50mgTRE「SMPP	50mg1錠	ゾニサミド	後発	劇	
外用	採用	ゾピラックス眼軟膏3%	3%1g	アシクロビル			
外用	採用	ソフラチュール貼付剤10cm	(10. 8mg) 10	フラジオマイシン硫酸塩			
内服	限定	ゾフルーザ錠10mg	10mg1錠	パロキサビル マルボキシル			
内服	採用	ゾフルーザ錠20mg	20mg1錠	パロキサビル マルボキシル			

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイスルク分類
注射	採用	ゾラデックス1.8mgデポ	1.8mg1筒(ゴ	ゴセレリン酢酸塩		劇	
注射	採用	ゾラデックス3.6mgデポ	3.6mg1筒(ゴ	ゴセレリン酢酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	ゾラデックスLA10.8mgデポ	10.8mg1筒(ゴ	ゴセレリン酢酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	院外	ソランタール錠100mg	100mg1錠	チアラミド塩酸塩			
注射 自注	院外	ソリクア配合注ソロスター	1キット	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	劇		糖尿病用剤
注射	採用	ソリター-T1号輸液	500mL1袋	開始液			
注射	採用	ソリター-T1号輸液	200mL1袋	開始液			
注射	採用	ソリター-T3号輸液	500mL1袋	維持液			
注射	採用	ソリター-T3号輸液	200mL1袋	維持液			
内服	外+限	ソリター-T配合顆粒3号	4g1包	ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤			
注射 自注	採用	ソル・コーテフ注射用100mg	100mg1瓶(溶	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム			免疫抑制剤
注射	採用	ソル・メドロール静注用125mg	125mg1瓶(溶	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム			免疫抑制剤
注射	採用	ソル・メドロール静注用40mg	40mg1瓶(溶	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム			免疫抑制剤
注射	採用	ソル・メドロール静注用500mg	500mg1瓶(溶	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム			免疫抑制剤
内服	採用	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「ト	5mg1錠	ゾルピデム酒石酸塩	後発	精3	
外用	採用	ソルベース	10g	マクロゴール			
注射 自注	採用	ゾレア皮下注150mgペン	150mg1mL1	オマリズマブ(遺伝子組換え)		劇	
注射 自注	採用	ゾレア皮下注300mgペン	300mg2mL1	オマリズマブ(遺伝子組換え)		劇	
注射	採用	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100m	4mg100mL1	ゾレドロン酸水和物	後発	劇	抗悪性腫瘍剤
内服	院外	ダーブロック錠1mg	1mg1錠	ダプロデュスタット		劇	
内服	採用	ダーブロック錠2mg	2mg1錠	ダプロデュスタット		劇	
内服	採用	ダーブロック錠4mg	4mg1錠	ダプロデュスタット		劇	
外用	採用	ダイアアップ坐剤10	10mg1個	ジアゼパム		精3	抗てんかん剤
外用	院外	ダイアアップ坐剤4	4mg1個	ジアゼパム		精3	抗てんかん剤
外用	採用	ダイアアップ坐剤6	6mg1個	ジアゼパム		精3	抗てんかん剤
内服	採用	ダイアモックス錠250mg	250mg1錠	アセタゾラミド			抗てんかん剤
注射	採用	ダイアモックス注射用500mg	500mg1瓶	アセタゾラミドナトリウム			抗てんかん剤
内服	外+限	タイケルブ錠250mg	250mg1錠	ラバチニブトシル酸塩水和物	劇		抗悪性腫瘍剤
注射	限定	タイロゲン筋注用0.9mg	0.9mg1瓶	ヒトチロロピン アルファ(遺伝子組換え)			
内服	院外	ダクチル錠50mg	50mg1錠	ピペリドレート塩酸塩		劇	
内服	限定	タグリッソ錠40mg	40mg1錠	オシメルチニブメシル酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	限定	タグリッソ錠80mg	80mg1錠	オシメルチニブメシル酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	採用	タクロリムス錠1mg「あゆみ」	1mg1錠	タクロリムス水和物	後発	劇	免疫抑制剤
内服	採用	タケキャブ錠10mg	10mg1錠	ボノブラザンフマル酸塩			
内服	院外	タケキャブ錠20mg	20mg1錠	ボノブラザンフマル酸塩			
注射	採用	タケブロン静注用30mg	30mg1瓶	ランソプラゾール			
内服	院外	タケルダ配合錠	1錠	アスピリン・ランソプラゾール配合剤			血液凝固阻止剤
外用	採用	タコシール組織接着用シート	4.8cm×4.8	フィブリノゲン配合剤		特生	
内服	院外	タスフィゴ錠35mg	35mg1錠	タスルグラチニブコハク酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	タゾピバ配合静注用4.5「明治」	(4.5g)1瓶	タゾバクタム・ピペラシリン水和物			
内服	外+限	タダラフィル錠20mgAD「TE」	20mg1錠	タダラフィル	後発		
内服	採用	タダラフィル錠5mgZA「サワイ」	5mg1錠	タダラフィル	後発		
注射	採用	タツスキャン静注	167MBq1筒	イオフルバン(123I)			
内服	採用	ダパグリフロジン錠5mg「サワイ」	5mg1錠	ダパグリフロジンプロピレ	後発		糖尿病用剤
内服	採用	ダフクリア錠200mg	200mg1錠	フィダキソマイシン			
外用	院外	タブコム配合点眼液	1mL	タフルプロスト・チモロールマレイン酸塩	劇		
注射	採用	ダプトマイシン静注用350mg「ニプロ	350mg1瓶	ダプトマイシン	後発		
外用	採用	タブロス点眼液0.0015%	0.0015%1m	タフルプロスト		劇	
内服	採用	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「B	0.2mg1錠	タムスロシン塩酸塩			
内服	採用	タモキシフェン錠20mg「MYL」	20mg1錠	タモキシフェンクエン酸塩	後発		抗悪性腫瘍剤
外用	採用	ダラシンTゲル1%	1%1g	クリンダマイシンリン酸エステル			

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイスルク分類
内服	採用	ダラシカプセル150mg	150mg1カプセル	クリンダマイシン塩酸塩			
内服	採用	タリージェOD錠10mg	10mg1錠	ミロガバリンベシル酸塩			
内服	採用	タリージェOD錠15mg	15mg1錠	ミロガバリンベシル酸塩			
内服	採用	タリージェOD錠2.5mg	2.5mg1錠	ミロガバリンベシル酸塩			
内服	採用	タリージェOD錠5mg	5mg1錠	ミロガバリンベシル酸塩			
内服	院外	タリオン錠10mg	10mg1錠	ベボタスチンベシル酸塩			
外用	採用	タリビッド眼軟膏0.3%	0.3%1g	オフロキサシン			
外用	採用	タリビッド耳科用液0.3%	3mg1mL	オフロキサシン			
内服	限定	タルセバ錠100mg	100mg1錠	エルロチニブ塩酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	限定	タルセバ錠150mg	150mg1錠	エルロチニブ塩酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	限定	タルセバ錠25mg	25mg1錠	エルロチニブ塩酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	採用	タルチレリンOD錠5mg「日医工」	5mg1錠	タルチレリン水和物	後発		
注射	採用	ダルテパリンNa静注4000単位／1	4000低分子ヘ	ダルテパリンナトリウム	後発		
注射	採用	ダルベポエチン アルファ注10μgシ	10μg0.5mL	ダルベポエチン アルファ	後発	劇	
注射	採用	ダルベポエチン アルファ注120μgシ	120μg0.5mL	ダルベポエチン アルファ	後発	劇	
注射	採用	ダルベポエチン アルファ注15μgシ	15μg0.5mL	ダルベポエチン アルファ	後発	劇	
注射	採用	ダルベポエチン アルファ注180μgシ	180μg0.5mL	ダルベポエチン アルファ	後発	劇	
注射	採用	ダルベポエチン アルファ注20μgシ	20μg0.5mL	ダルベポエチン アルファ	後発	劇	
注射	採用	ダルベポエチン アルファ注30μgシ	30μg0.5mL	ダルベポエチン アルファ	後発	劇	
注射	採用	ダルベポエチン アルファ注40μgシ	40μg0.5mL	ダルベポエチン アルファ	後発	劇	
注射	採用	ダルベポエチン アルファ注5μgシ	5μg0.5mL1	ダルベポエチン アルファ	後発	劇	
注射	採用	ダルベポエチン アルファ注60μgシ	60μg0.5mL	ダルベポエチン アルファ	後発	劇	
内服	採用	ダントリウムカプセル25mg	25mg1カプセル	ダントロレンナトリウム水和物			
注射	採用	ダントリウム静注用20mg	20mg1瓶	ダントロレンナトリウム水和物			
内服	採用	タンニン酸アルブミン「ケンエー」	1g	タンニン酸アルブミン			
内服	院外	タンボコール錠50mg	50mg1錠	フレカイニド酢酸塩		劇	不整脈用剤
注射	採用	タンボコール静注50mg	50mg5mL1管	フレカイニド酢酸塩		劇	不整脈用剤
内服	採用	チアプリド錠50mg「サワイ」	50mg1錠	チアプリド塩酸塩	後発		
注射	採用	チアミン塩化物塩酸塩注50mg「フソ	50mg1管	チアミン塩化物塩酸塩			
内服	採用	チウラジール錠50mg	50mg1錠	プロピルチオウラシル			
内服	採用	チガソシカプセル10	10mg1カプセル	エトレチナート		劇	
内服	採用	チザニジン錠1mg「トーワ」	1mg1錠	チザニジン塩酸塩	後発		
外用	院外	チモプートルXE点眼液0.5%	0.5%1mL	チモロールマレイン酸塩			
注射	限定	チラーヂンS静注液200μg	200μg1mL1	レボチロキシナトリウム水和物		劇	
内服	採用	ツイミグ錠500mg	500mg1錠	イメグリミン塩酸塩			糖尿病用剤
内服	院外	ツートラム錠50mg	50mg1錠	トラマドール塩酸塩		劇	
内服	院外	ツカイザ錠150mg	150mg1錠	ツカチニブ エタノール付加物		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	院外	ツカイザ錠50mg	50mg1錠	ツカチニブ エタノール付加物		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	採用	つくしA・M配合散	1g	カンゾウ配合剤			
内服	院外	ツムラの生薬コウジン末(調剤用)	1g	コウジン			
内服	採用	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)	1g	乙字湯エキス			
内服	院外	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)	1g	温経湯エキス			
内服	院外	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)	1g	加味帰脾湯エキス			
内服	採用	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	1g	加味逍遙散エキス			
内服	採用	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	1g	葛根湯エキス			
内服	院外	ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆	1g	葛根湯加川きゅう辛夷エキス			
内服	採用	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	1g	牛車腎気丸エキス			
内服	採用	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)	1g	桂枝茯苓丸エキス			
内服	院外	ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆	1g	桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス			
内服	院外	ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)	1g	五積散エキス			
内服	採用	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)	1g	五苓散エキス			

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
内服	採用	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)	1g	酸棗仁湯エキス			
内服	院外	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒	1g	柴胡加竜骨牡蛎湯エキス			抗てんかん剤
内服	採用	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	1g	柴苓湯エキス			
内服	採用	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)	1g	十全大補湯エキス			
内服	採用	ツムラ人參養栄湯エキス顆粒(医療用)	1g	人參養栄湯エキス			
内服	採用	ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)	1g	大黃甘草湯エキス			
内服	採用	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	1g	大建中湯エキス			
内服	採用	ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)	1g	猪苓湯エキス			
内服	院外	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキ	1g	当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス			
内服	採用	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)	1g	当帰芍薬散エキス			
内服	採用	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	1g	麦門冬湯エキス			
内服	採用	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	1g	半夏厚朴湯エキス			
内服	採用	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	1g	半夏瀉心湯エキス			
内服	採用	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	1g	補中益気湯エキス			
内服	採用	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	1g	防風通聖散エキス			
内服	院外	ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医	1g	麻黄附子細辛湯エキス			
内服	採用	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)	1g	麻子仁丸エキス			
内服	採用	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	1g	抑肝散エキス			
内服	院外	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒	1g	抑肝散加陳皮半夏エキス			
内服	採用	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	1g	六君子湯エキス			
内服	採用	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	1g	芍薬甘草湯エキス			
外用	採用	ツロブテロールテープ0.5mg「久光	0.5mg1枚	ツロブテロール	後発		
外用	採用	ツロブテロールテープ1mg「久光」	1mg1枚	ツロブテロール	後発		
外用	採用	ツロブテロールテープ2mg「久光」	2mg1枚	ツロブテロール	後発		
内服	院外	ディアコミットドライシロップ分包250	250mg1包	スチリペントール		劇	抗てんかん剤
内服	院外	ディアコミットドライシロップ分包500	500mg1包	スチリペントール		劇	抗てんかん剤
注射	採用	テイコプラニン点滴静注用200mg「	200mg1瓶	テイコプラニン	後発	劇	
外用	採用	ディスオーパ消毒液0.55%	0.55%1mL	フタラール		劇	
外用	院外	ディフェリンゲル0.1%	0.1%1g	アダパレン		劇	
内服	院外	ディレグラ配合錠	1錠	フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸ブソイドエフェドリン配合剤			
内服	採用	デエビゴ錠5mg	5mg1錠	レンボレキサント			
内服	採用	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ	100mg1錠	テオフィリン			テオフィリン製剤
内服	採用	デカドロン錠0.5mg	0.5mg1錠	デキサメタゾン			免疫抑制剤
内服	採用	デカドロン錠4mg	4mg1錠	デキサメタゾン			免疫抑制剤
注射	採用	デキサート注射液1.65mg	1.65mg0.5r	デキサメタゾンリン酸エステル	後発		免疫抑制剤
注射	採用	デキサート注射液6.6mg	6.6mg2mL1	デキサメタゾンリン酸エステル	後発		免疫抑制剤
外用	採用	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「N	0.1%1g	デキサメタゾン	後発		
内服	採用	デキストロメトルファン臭化水素酸塩	15mg1錠	デキストロメトルファン臭	後発		
注射	採用	デクスメドミジン静注液200μg/4	200μg50mL	デクスメドミジン塩酸塩	後発	劇	
注射	採用	テクネDTPAキット	1回分	ジエチレントリアミン五酢酸			
注射	採用	テクネMAAキット	1回分	大凝集人血清アルブミン			
注射	採用	テクネMDP注射液	555MBq1筒	メチレンジホスホン酸テクネチウム(99mTc)			
注射	採用	テクネシンチ注-10M	10MBq	過テクネチウム酸ナトリウム(99mTc)			
注射	採用	テクネピロリン酸キット	1回分	ピロリン酸ナトリウム			
注射	採用	テクネフチン酸キット	1回分	フィチン酸ナトリウム			
内服	採用	テグレート細粒50%	50%1g	カルバマゼピン			抗てんかん剤
内服	院外	デザレックス錠5mg	5mg1錠	デスロラタジン			
注射	採用	テストノンデボー筋注用250mg	250mg1mL1	テストステロンエナント酸エステル			
外用	採用	デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg	125μg1瓶	デスモプレシン酢酸塩水和物		劇	
注射	採用	テセントリク点滴静注1200mg	1200mg20m	アテゾリズマブ(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	テセントリク点滴静注840mg	840mg14mL	アテゾリズマブ(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍剤

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
注射	採用	テタノブリンIH静注1500単位	1500国際単位	ポリエチレングリコール処理抗破傷風		特生	
注射	採用	テタノブリン筋注用250単位	250国際単位	乾燥抗破傷風人免疫グロブリン		特生	
外用	院外	デタントール0.01%点眼液	0.01%1mL	ブナゾシン塩酸塩			
外用	採用	テトラサイクリン・プレステロン歯科用	1g	エビジヒドロコレステリン・テトラサイクリン塩酸塩			
内服	採用	テトラミド錠10mg	10mg1錠	ミアンセリン塩酸塩			精神神経用剤
内服	採用	テネリアOD錠20mg	20mg1錠	テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物			糖尿病用剤
内服	採用	テノミン錠50	50mg1錠	アテノロール			不整脈用剤
内服	院外	テノゼット錠300mg	300mg1錠	テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩	劇		
内服	採用	デノタスチュアブル配合錠	1錠	沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム			
内服	院外	デパケンシロップ5%	5%1mL	バルプロ酸ナトリウム			抗てんかん剤
注射	採用	デフィブラーゼ点滴静注液10単位	10単位1管	バトロコゾン		劇	
内服	院外	デベルザ錠20mg	20mg1錠	トホグリフロジン水和物			糖尿病用剤
内服	限定	テモゾロミド錠100mg「NK」	100mg1錠	テモゾロミド	後発	毒	抗悪性腫瘍剤
内服	限定	テモゾロミド錠20mg「NK」	20mg1錠	テモゾロミド	後発	毒	抗悪性腫瘍剤
内服	採用	デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」	0.5mg1錠	デュタステリド	後発	劇	
注射 自注	採用	デュピクセント皮下注300mgペン	300mg2mL1	デュピルマブ(遺伝子組換え)		劇	
内服	院外	デュファストン錠5mg	5mg1錠	ジドロゲステロン			
外用	採用	テラ・コートリル軟膏	1g	オキシテトラサイクリン塩酸塩・ヒドロコルチゾン			
内服	採用	テラムロ配合錠AP「トーフ」	1錠	テルミサルタン・アムロジ	後発	劇	
内服	院外	テラムロ配合錠BP「トーフ」	1錠	テルミサルタン・アムロジ	後発	劇	
注射 自注 外+限	採用	テリパラチドBS皮下注キット600μg	600μg1キット	テリパラチド(遺伝子組換え)	後発		
注射 自注	院外	テリボン皮下注28.2μgオートイン	28.2μg1キット	テリパラチド酢酸塩			
注射	限定	テリボン皮下注用56.5μg	56.5μg1瓶	テリパラチド酢酸塩			
外用	採用	テリルジー100エリブタ30吸入用	30吸入1キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ビラン			
外用	採用	テリルジー200エリブタ30吸入用	30吸入1キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ビラン			
内服	院外	テルチア配合錠AP「DSEP」	1錠	テルミサルタン・ヒドロクロ	後発		
内服	院外	テルチア配合錠BP「DSEP」	1錠	テルミサルタン・ヒドロクロ	後発		
外用	採用	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サ	1%1g	テルビナフィン塩酸塩	後発		
内服	採用	テルビナフィン錠125mg「サワイ」	125mg1錠	テルビナフィン塩酸塩	後発		
内服	採用	テルミサルタン錠40mg「ケミファ」	40mg1錠	テルミサルタン	後発		
外用	採用	デルモゾールGクリーム	1g	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩			
外用	採用	デルモゾールGローション	1mL	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩			
外用	採用	デルモゾールG軟膏	1g	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩			
注射	採用	テルモ糖注5%	5%500mL1袋	精製ブドウ糖			
外用	院外	テレミンソフト坐薬10mg	10mg1個	ビサコジル			
外用	院外	テレミンソフト坐薬2mg	2mg1個	ビサコジル			
内服	採用	トアラセット配合錠「ケミファ」	1錠	トラマドール塩酸塩・アセ	後発	劇	
注射	限定	ドキシル注20mg	20mg10mL1	ドキシルビン塩酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	ドキシルビン塩酸塩注射用10mg	10mg1瓶	ドキシルビン塩酸塩	後発	劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	ドキシルビン塩酸塩注射用50mg	50mg1瓶	ドキシルビン塩酸塩	後発	劇	抗悪性腫瘍剤
内服	採用	トコフェロールニコチン酸エステルカプ	100mg1カプセ	トコフェロールニコチン酸	後発		
注射	採用	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL	20mg1mL1瓶	ドセタキセル水和物	後発	毒	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL	80mg4mL1瓶	ドセタキセル水和物	後発	毒	抗悪性腫瘍剤
内服	採用	ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「明治」	10mg1錠	ドネペジル塩酸塩	後発	劇	
内服	採用	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」	3mg1錠	ドネペジル塩酸塩	後発	劇	
内服	採用	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」	5mg1錠	ドネペジル塩酸塩	後発	劇	
内服	採用	ドパコール配合錠L100	1錠	レボドパ・カルビドパ水和	後発		
内服	採用	ドパストン散98.5%	98.5%1g	レボドパ			
注射	採用	ドパストン静注50mg	0.25%20mL	レボドパ			
注射	採用	ドパミン塩酸塩点滴静注液600mg/4	0.3%200mL	ドパミン塩酸塩	後発	劇	
内服	採用	トビエース錠4mg	4mg1錠	フェソテロジンフマル酸塩			

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
内服	院外	トピナ細粒10%	10%1g	トピラマート			抗てんかん剤
内服	外+限	トピナ錠100mg	100mg1錠	トピラマート			抗てんかん剤
内服	外+限	トピナ錠50mg	50mg1錠	トピラマート			抗てんかん剤
内服	採用	トフィソパム錠50mg「トーフ」	50mg1錠	トフィソパム	後発		
内服	採用	ドブスOD錠100mg	100mg1錠	ドロキシドバ			
内服	採用	ドブスOD錠200mg	200mg1錠	ドロキシドバ			
注射	採用	ドブタミン持続静注150mgシリンジ	0.3%50mL1	ドブタミン塩酸塩	後発	劇	
外用	院外	トブラシン点眼液0.3%	3mg1mL	トブラマイシン		劇	
内服	院外	トフラニール錠10mg	10mg1錠	イミプラミン塩酸塩			精神神経用剤
外用	院外	ドボベツゲル	1g	カルシボトリオール水和物・ベタメタゾン		劇	
外用	院外	ドボベツフォーム	1g	カルシボトリオール水和物・ベタメタゾン		劇	
外用	採用	ドボベツ軟膏	1g	カルシボトリオール水和物・ベタメタゾン		劇	
内服	採用	ドラール錠15	15mg1錠	クアゼパム		精3	
注射	採用	トラスツズマブBS点滴静注用150m	150mg1瓶	トラスツズマブ(遺伝子組	後発		抗悪性腫瘍剤
内服	採用	トラセミドOD錠4mg「TE」	4mg1錠	トラセミド	後発		
内服	採用	トラゼンタ錠5mg	5mg1錠	リナグリプチン			糖尿病用剤
内服	採用	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	25mg1錠	トラゾドン塩酸塩		劇	精神神経用剤
外用	採用	トラチモ配合点眼液「ニットー」	1mL	トラボプロスト・チモロー	後発		
内服	院外	トラディアンス配合錠AP	1錠	エンパグリフロジン・リナグリプチン配合剤			糖尿病用剤
内服	院外	トラディアンス配合錠BP	1錠	エンパグリフロジン・リナグリプチン配合剤			糖尿病用剤
内服	採用	トラネキサム酸錠250mg「日医工」	250mg1錠	トラネキサム酸	後発		
注射	採用	トラネキサム酸注射液1000mg「NI	10%10mL1管	トラネキサム酸	後発		
内服	採用	トラベルミン配合錠	1錠	ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロフィリン			
外用	採用	トラボプロスト点眼液0.004%「ニッ	0.004%1mL	トラボプロスト	後発		
内服	採用	トラマールOD錠25mg	25mg1錠	トラマドール塩酸塩		劇	
注射	採用	トラマール注100	100mg1管	トラマドール塩酸塩		劇	
外用	採用	トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」	0.118%1mL	トラマゾリン塩酸塩		劇	
内服	院外	ドラマミン錠50mg	50mg1錠	ジメンヒドリナート			
内服	院外	トランサミン散50%	50%1g	トラネキサム酸			
内服	採用	トリアゾラム錠0.25mg「日医工」	0.25mg1錠	トリアゾラム	後発	精3	
内服	院外	トリキュラー錠28	(28日分)1組	レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール			
内服	採用	トリクロリールシロップ10%	10%1mL	トリクロホスナトリウム		劇	
内服	採用	トリクロルメチアジド錠2mg「NIG」	2mg1錠	トリクロルメチアジド	後発		
注射	採用	トリビック	0.5mL1瓶	沈降精製百日せきジフテリア破傷風混		劇	
内服	採用	トリプタノール錠10	10mg1錠	アミトリプチリン塩酸塩			精神神経用剤
内服	院外	トルカブ錠160mg	160mg1錠	カピバセルチブ		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	院外	トルカブ錠200mg	200mg1錠	カピバセルチブ		劇	抗悪性腫瘍剤
外用	採用	トルソプト点眼液1%	1%1mL	ドルゾラミド塩酸塩			
内服	採用	トルバブタンOD錠15mg「オーツカ」	15mg1錠	トルバブタン	後発	劇	
内服	採用	トルバブタンOD錠7.5mg「オーツカ」	7.5mg1錠	トルバブタン	後発	劇	
外用	採用	ドルモロール配合点眼液「ニットー」	1mL	ドルゾラミド塩酸塩・チモ	後発		
注射 自注	採用	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	0.75mg0.5r	デュラグルチド(遺伝子組換え)		劇	糖尿病用剤
内服	採用	トレランG液75g	225mL1瓶	デンブン部分加水分解物			
注射 自注	採用	トレシーバ注 フレックスタッチ	300単位1キッ	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)		劇	膵臓ホルモン剤
内服	外+限	トレミフェン錠40mg「サワイ」	40mg1錠	トレミフェンクエン酸塩	後発	劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	トロデルビ点滴静注用200mg	200mg1瓶	サシツズマブ ギビテカン(遺伝子組換		劇	抗悪性腫瘍剤
外用	採用	トロピカミド点眼液0.4%「日点」	0.4%1mL	トロピカミド	後発		
注射	採用	ドロレブタン注射液25mg	2.5mg1mL	ドロベリドール		劇	
外用	採用	トロンビン液モチダ ソフトボトル5千	5000単位5mL	トロンビン			
内服	採用	ナウゼリンOD錠10	10mg1錠	ドンペリドン			
内服	採用	ナウゼリンドライシロップ1%	1%1g	ドンペリドン			

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイスリスク分類
外用	院外	ナウゼリン坐剤10	10mg1個	ドンペリドン			
外用	採用	ナウゼリン坐剤30	30mg1個	ドンペリドン			
外用	採用	ナウゼリン坐剤60	60mg1個	ドンペリドン			
外用	院外	ナサニール点鼻液0.2%	10mg5mL1瓶	ナファレリン酢酸塩水和物		劇	
内服	外+限	ナゼアOD錠0.1mg	0.1mg1錠	ラモセトロン塩酸塩		劇	
内服	採用	ナトリックス錠1	1mg1錠	インダパミド			
注射	採用	ナファモスタットメシル酸塩注射用10	10mg1瓶	ナファモスタットメシル酸塩		劇	
注射	採用	ナファモスタットメシル酸塩注射用15	150mg1瓶	ナファモスタットメシル酸塩		劇	
内服	採用	ナフトビジルOD錠25mg「トーワ」	25mg1錠	ナフトビジル	後発		
内服	採用	ナフトビジルOD錠75mg「トーワ」	75mg1錠	ナフトビジル	後発		
外用	採用	ナポールゲル1%	1%1g	ジクロフェナクナトリウム			
内服	採用	ナルサス錠12mg	12mg1錠	ヒドロモルフォン塩酸塩		麻 劇	
内服	採用	ナルサス錠24mg	24mg1錠	ヒドロモルフォン塩酸塩		麻 劇	
内服	採用	ナルサス錠2mg	2mg1錠	ヒドロモルフォン塩酸塩		麻 劇	
内服	採用	ナルサス錠6mg	6mg1錠	ヒドロモルフォン塩酸塩		麻 劇	
内服	院外	ナルティークOD錠75mg	75mg1錠	リメゲパント硫酸塩水和物			
内服	院外	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg	2.5μg1錠	ナルフラフィン塩酸塩	後発	劇	
注射	採用	ナルベイン注20mg	20mg2mL1管	ヒドロモルフォン塩酸塩		麻 劇	
注射	採用	ナルベイン注2mg	2mg1mL1管	ヒドロモルフォン塩酸塩		麻 劇	
内服	採用	ナルラビド錠1mg	1mg1錠	ヒドロモルフォン塩酸塩		麻 劇	
内服	採用	ナルラビド錠2mg	2mg1錠	ヒドロモルフォン塩酸塩		麻 劇	
内服	採用	ナルラビド錠4mg	4mg1錠	ヒドロモルフォン塩酸塩		麻 劇	
注射	採用	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFF」	0.2mg1mL1	ナロキソン塩酸塩		劇	
注射	採用	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「E」	10mg10mL1	ニカルジピン塩酸塩		劇	
内服	院外	ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	10%1g	ニコチン酸アミド			
内服	採用	ニコランジル錠5mg「トーワ」	5mg1錠	ニコランジル			
注射	採用	ニコランジル点滴静注用2mg「サワ」	2mg1瓶	ニコランジル	後発		
注射	採用	ニコランジル点滴静注用48mg「サワ」	48mg1瓶	ニコランジル	後発		
注射	採用	ニコリンH注射液0.5g	25%2mL1管	シチコリン			
内服	採用	ニセルゴリン錠5mg「トーワ」	5mg1錠	ニセルゴリン	後発		
外用	院外	ニゾラールクリーム2%	2%1g	ケトコナゾール			
外用	採用	ニゾラールローション2%	2%1g	ケトコナゾール			
注射	採用	ニトロプル持続静注液6mg	6mg2mL1管	ニトロプルシドナトリウム水和物		毒	
注射	採用	ニトロール注5mgシリンジ	5mg10mL1筒	硝酸イソソルビド			
注射	採用	ニトロール点滴静注100mg「バッグ」	0.05%200m	硝酸イソソルビド			
注射	採用	ニトログリセリン静注25mg/50mL	25mg50mL1	ニトログリセリン	後発	劇	
内服	採用	ニトロベン舌下錠0.3mg	0.3mg1錠	ニトログリセリン	後発	劇	
内服	採用	ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」	20mg1錠	ニフェジピン		劇	
内服	院外	ニボラジン錠3mg	3mg1錠	メキサジン			
外用	採用	ニュープロパッチ13.5mg	13.5mg1枚	ロチゴチン		劇	
外用	採用	ニュープロパッチ18mg	18mg1枚	ロチゴチン		劇	
外用	採用	ニュープロパッチ4.5mg	4.5mg1枚	ロチゴチン		劇	
外用	採用	ニュープロパッチ9mg	9mg1枚	ロチゴチン		劇	
注射	採用	ニューモバックスNPシリンジ	0.5mL1筒	肺炎球菌ワクチン		劇	
注射	採用	ニューロライト注射液第一	600MBq1筒	エチレンジシステイナーオキシテクネチウム(99mTc)			
内服	院外	ニューベコ錠300mg	300mg1錠	ダロルタミド		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	院外	ネイリンカプセル100mg	100mg1カプセル	ホスラブコナゾール L-リシンエタノール付加物			
内服	採用	ネオオラル10mgカプセル	10mg1カプセル	シクロスポリン		劇	免疫抑制剤
内服	院外	ネオオラル25mgカプセル	25mg1カプセル	シクロスポリン		劇	免疫抑制剤
内服	採用	ネオオラル50mgカプセル	50mg1カプセル	シクロスポリン		劇	免疫抑制剤
外用	院外	ネオキシテープ73.5mg	73.5mg1枚	オキシブチニン塩酸塩			

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイスリスク分類
外用	採用	ネオシネジンコーワ5%点眼液	5%1mL	フェニレフリン塩酸塩			
注射	採用	ネオシネジンコーワ注1mg	0.1%1mL1管	フェニレフリン塩酸塩		劇	不整脈用剤
外用	採用	ネオステリングリーンうがい液0.2%	1mL	ベンゼトニウム塩化物			
注射 自注	採用	ネオファーゲン静注20mL	20mL1管	グリチルリチン・グリシン	後発		
注射	採用	ネオフィリン注250mg	2.5%10mL1	アミノフィリン水和物			テオフィリン製剤
外用	採用	ネオメドロールEE軟膏	1g	フラジロマイシン硫酸塩・メチルプレドニゾロン			
内服	採用	ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	20mg1包	エソメプラゾールマグネシウム水和物			
内服	限定	ネクスバル錠200mg	200mg1錠	ソラフェニブチル硫酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	採用	ネクセトル錠180mg	180mg1錠	ベムベド酸			
内服	採用	ネシーナ錠12.5mg	12.5mg1錠	アログリブチン安息香酸塩			糖尿病用剤
内服	院外	ネシーナ錠25mg	25mg1錠	アログリブチン安息香酸塩			糖尿病用剤
外用	院外	ネパナック懸濁性点眼液0.1%	0.1%1mL	ネパフェナク			
外用	採用	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%	0.1%1g	ジフルコルトロン吉草酸エステル		劇	
内服	院外	ノアルテン錠(5mg)	5mg1錠	ノルエチステロン			
内服	採用	ノイロトロピン錠4単位	4単位1錠	ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液			
注射	採用	ノイロトロピン注射液3.6単位	3mL1管	ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液			
内服	採用	ノイロビタン配合錠	1錠	オクトチアミン・B2・B6・B12配合剤			
内服	採用	ノウリアスト錠20mg	20mg1錠	イストラデフィリン			
注射	採用	ノーベルバル静注用250mg	250mg1瓶	フェノバルビタールナトリウム		劇 精3	抗てんかん剤
内服	院外	ノックピン原末	1g	ジスルフィラム		劇	
注射	採用	ノバミン筋注5mg	0.5%1mL1管	プロクロルペラジンメシル酸塩			精神神経用剤
内服	採用	ノバミン錠5mg	5mg1錠	プロクロルペラジンマレイン酸塩			精神神経用剤
注射 自注	採用	ノボラピッド30ミックス注 フレックスペ	300単位1キッ	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	劇		膵臓ホルモン剤
注射 自注	採用	ノボリンR注フレックスペン	300単位1キッ	インスリン ヒト(遺伝子組換え)	劇		膵臓ホルモン剤
注射	採用	ノルアドリナリン注1mg	0.1%1mL1管	ノルアドレナリン		劇	
内服	採用	ノルレボ錠1.5mg	1.5mg1錠	レボノルゲストレル			
注射	採用	パーゼタ点滴静注420mg/14m	420mg14mL	ペルツズマブ(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	パーヒューザミン注	10MBq	塩酸N-イソプロピル-4-ヨードアンフェタミン(123I)			
内服	採用	ハーフジゴキシンKY錠0.125	0.125mg1錠	ジゴキシン		劇	ジギタリス製剤
内服	院外	ハーボニー配合錠	1錠	レジパスビル アセトン付加物・ソホスブビル			
内服	外+限	パーロデル錠2.5mg	2.5mg1錠	プロモクリブチンメシル酸塩		劇	
内服	採用	バイアスピリン錠100mg	100mg1錠	アスピリン	後発		血液凝固阻止剤
注射	限定	ハイカムチン注射用1.1mg	1.1mg1瓶	ノゲテカン塩酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	ハイカリックRF輸液	500mL1袋	高カリウム輸液用基本液			
内服	採用	ハイドレアカプセル500mg	500mg1カプセ	ヒドロキシカルバミド		劇	抗悪性腫瘍剤
外用	採用	ハイポエタノール液2%「ヨシダ」	10mL	チオ硫酸ナトリウム水和物	後発		
内服	採用	パキシルCR錠12.5mg	12.5mg1錠	パロキセチン塩酸塩水和物		劇	精神神経用剤
内服	採用	パキロビッドパック300	1シート	ニルマトレルビル・リトナビル		劇	
内服	採用	パキロビッドパック600	1シート	ニルマトレルビル・リトナビル		劇	
外用	院外	バクスメ一点鼻粉末剤3mg	3mg1瓶	グルカゴン		劇	
内服	採用	バクタ配合錠	1錠	スルファメキサゾール・トリメトプリム			
内服	採用	バクタ配合顆粒	1g	スルファメキサゾール・トリメトプリム			
注射	限定	バクトラミン注	5mL1管	スルファメキサゾール・トリメトプリム			
注射	採用	バクニュバンス水性懸濁注シリンジ	0.5mL1筒	沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン(無	無劇		
注射	採用	バクリタキセル注100mg/16.7m	100mg16.7mL	バクリタキセル		毒	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	バクリタキセル注30mg/5mL「NK	30mg5mL1瓶	バクリタキセル		毒	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	はしか風しん混合生ワクチン「第一三	一人分1瓶(溶解)	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン		劇	
内服 外用	採用	ハッカ油「コザカイ・M」	1mL	ハッカ油			
注射	採用	パニマイシン注射液100mg	100mg1管	ジベカシン硫酸塩		劇	
注射	採用	パパペリン塩酸塩注40mg「日医工	4%1mL1管	パパペリン塩酸塩			
注射	採用	パビースモ硝子体内注射用キット12	6mg0.05mL	ファリシマブ(遺伝子組換え)		劇	

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
内服	院外	バフセオ錠150mg	150mg1錠	バダデустット		劇	
内服	院外	バフセオ錠300mg	300mg1錠	バダデустット		劇	
注射	限定	ハプトグロビン静注2000単位「JB」	2000単位100人	ハプトグロビン		特生	
注射	採用	パム静注500mg	2. 5%20mL1	プラリドキシムヨウ化物			
内服	採用	バラクルード錠0. 5mg	0. 5mg1錠	エンテカビル水和物		劇	
内服	採用	バラシクロビル錠500mg「SPKK」	500mg1錠	バラシクロビル塩酸塩	後発		
外用	採用	バラマイシン軟膏	(BTRC250単	バシトラシン・フラジオマイシン硫酸塩			
内服	採用	バリトッパHD	99%10g	硫酸バリウム			
内服	採用	バルサルタン錠80mg「ケミファ」	80mg1錠	バルサルタン	後発		
内服	採用	バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ	5%1mL	バルプロ酸ナトリウム			抗てんかん剤
内服	院外	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日	5%1mL	バルプロ酸ナトリウム			抗てんかん剤
内服	採用	バルプロ酸ナトリウム細粒20%「EM	20%1g	バルプロ酸ナトリウム			抗てんかん剤
内服	採用	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100n	100mg1錠	バルプロ酸ナトリウム			抗てんかん剤
内服	採用	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200n	200mg1錠	バルプロ酸ナトリウム			抗てんかん剤
内服	採用	バルプロ酸ナトリウム錠200mg「DS	200mg1錠	バルプロ酸ナトリウム			抗てんかん剤
外用	採用	パルミコート200μgタービュヘイラー	22. 4mg1瓶(	ブデソニド			
外用	採用	パルミコート吸入液0. 25mg	0. 25mg2mL	ブデソニド			
内服	採用	パルモディアXR錠0. 2mg	0. 2mg1錠	ペマフィブラート			
内服	院外	パルモディアXR錠0. 4mg	0. 4mg1錠	ペマフィブラート			
外用	院外	ハルロピテープ16mg	16mg1枚	ロビニロール塩酸塩		劇	
外用	院外	ハルロピテープ24mg	24mg1枚	ロビニロール塩酸塩		劇	
外用	院外	ハルロピテープ32mg	32mg1枚	ロビニロール塩酸塩		劇	
外用	院外	ハルロピテープ40mg	40mg1枚	ロビニロール塩酸塩		劇	
外用	院外	ハルロピテープ8mg	8mg1枚	ロビニロール塩酸塩		劇	
内服	採用	パレイショデンブ「ケンエー」	10g	パレイショデンブ			
内服	採用	パロス発泡顆粒-S	1g	炭酸水素ナトリウム・酒石酸	後発		
注射	採用	パロノセトロン点滴静注バッグ0. 75	0. 75mg50m	パロノセトロン塩酸塩	後発	劇	
内服	採用	ハロペリドール錠1mg「タカタ」	1mg1錠	ハロペリドール	後発	劇	精神神経用剤
注射	採用	ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」	0. 5%1mL1管	ハロペリドール	後発	劇	精神神経用剤
内服	採用	バンコマイシン塩酸塩散0. 5g「VTR	500mg1瓶	バンコマイシン塩酸塩			
注射	採用	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.	0. 5g1瓶	バンコマイシン塩酸塩			
内服	採用	バンテチン散20%「NIG」	20%1g	バンテチン	後発		
内服	採用	パントシン錠200	200mg1錠	パントシン			
注射	採用	パントシン注5%	100mg1管	パントシン			
注射	採用	ハンブ注射用1000	1000μg1瓶	カルベリチド(遺伝子組換え)		劇	
外用	採用	ヒアルロン酸Na0. 85眼粘弾剤1%	1%0. 85mL1	精製ヒアルロン酸ナトリウム			
外用	採用	ヒアルロン酸Na点眼液0. 1%「ニッ	0. 1%5mL1瓶	精製ヒアルロン酸ナトリウム	後発		
外用	院外	ヒアレインミニ点眼液0. 1%	0. 1%0. 4mL	精製ヒアルロン酸ナトリウム			
外用	採用	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.	0. 46%20mL	オキシグルタチオン			
内服	採用	ビートルチュアブル錠250mg	250mg1錠	スクロオキシ水酸化鉄			
内服	院外	ビートルチュアブル錠500mg	500mg1錠	スクロオキシ水酸化鉄			
注射	採用	ビーフリード輸液	500mL1キット	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン			
注射	採用	ビームゲン注0. 25mL	0. 25mL1瓶	組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)		劇	
注射	採用	ビームゲン注0. 5mL	0. 5mL1瓶	組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)		劇	
外用	採用	ヒーロンV眼粘弾剤2. 3%シリンジ0	2. 3%0. 6mL	精製ヒアルロン酸ナトリウム			
注射	採用	ビラッツ点滴静注液150mg	150mg6mL1	クラゾセンタンナトリウム		劇	
内服	採用	ピオグリタゾンOD錠30mg「ケミファ	30mg1錠	ピオグリタゾン塩酸塩	後発		糖尿病用剤
内服	採用	ピオフェルミンR散	1g	耐性乳酸菌製剤	後発		
注射	採用	ピカネイト輸液	500mL1袋	重碳酸リンゲル液			
内服	採用	ピカルタミド錠80mg「NK」	80mg1錠	ピカルタミド	後発	劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	ピクシリン注射用1g	1g1瓶	アンピシリンナトリウム			

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
注射	採用	ピクシリン注射用2g	2g1瓶	アンピシリンナトリウム			
内服	採用	ビクタルビ配合錠	1錠	ビクテグラビルナトリウム・エムトリシタ	劇		抗HIV薬
内服	院外	ピコスルファートNa錠2.5mg「サワ」	2.5mg1錠	ピコスルファートナトリウム水和物			
内服	採用	ピコスルファートNa内用液0.75%「	0.75%1mL	ピコスルファートナトリウム	後発		
内服	採用	ビジクリア配合錠	1錠	リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素ナトリウム			
注射	採用	ビシバニール注射用5KE	5KE1瓶	溶連菌抽出物		劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	ビシリバクタ静注用3g	(3g)1瓶	アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム			
外用	採用	ビスコート0.5眼粘弾剤	0.5mL1筒	精製ヒアルロン酸ナトリウム	後発		
内服	外+限	ヒスロンH錠200mg	200mg1錠	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル			抗悪性腫瘍剤
外用	採用	ビソノテープ2mg	2mg1枚	ビソプロロール			不整脈用剤
外用	採用	ビソノテープ4mg	4mg1枚	ビソプロロール			不整脈用剤
外用	採用	ビソノテープ8mg	8mg1枚	ビソプロロール			不整脈用剤
内服	採用	ビソプロロールフマル酸塩錠0.625	0.625mg1錠	ビソプロロールフマル酸塩			不整脈用剤
内服	採用	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg	2.5mg1錠	ビソプロロールフマル酸塩	後発		不整脈用剤
内服	採用	ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「ト	5mg1錠	ビソプロロールフマル酸塩	後発		不整脈用剤
内服	採用	ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トー	2mg1錠	ピタバスタチンカルシウム	後発		
注射	採用	ピタメジン静注用	1瓶	リン酸チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤			
外用	採用	ビダラビン軟膏3%「SW」	3%1g	ビダラビン	後発		
内服	院外	ヒダントールF配合錠	1錠	フェニトイン・フェノバルビタール配合剤	劇 精3		抗てんかん剤
注射	採用	ヒトCRH静注用100μg「ニプロ」	100μg1瓶(溶	コルチコレリン(ヒト)			
内服	採用	ピドキサール錠10mg	10mg1錠	ピリドキサルリン酸エステル水和物			
注射	限定	ビトレシン注射液20	20単位1管	バソプレシン			
注射	採用	ビノルビン注射用30mg	30mg1瓶	ビノルビン塩酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	院外	ビバンセカプセル20mg	20mg1カプセル	リスデキサンフェタミンメシル酸塩		劇	精神神経用剤
内服	院外	ビバンセカプセル30mg	30mg1カプセル	リスデキサンフェタミンメシル酸塩		劇	精神神経用剤
内服	採用	ビビアント錠20mg	20mg1錠	バゼドキシフェン酢酸塩			
外用	採用	ヒビスコール液A1%	1%10mL	クロルヘキシジングルコン酸塩			
注射	採用	ビペラシリンNa注射用2g「NIG」	2g1瓶	ビペラシリンナトリウム			
注射	採用	ヒベルナ注25mg	2.5%1mL1管	プロメタジン塩酸塩			
外用	採用	ビマトプロスト点眼液0.03%「SEC	0.03%1mL	ビマトプロスト	後発		
外用	外+限	ピマリシン点眼液5%「センジュ」	50mg1mL	ピマリシン			
注射	採用	ビムバット点滴静注100mg	100mg10mL	ラコサミド		劇	抗てんかん剤
内服	採用	ピメノールカプセル50mg	50mg1カプセル	ピルメノール塩酸塩水和物		劇	不整脈用剤
内服	採用	ピモベンダン錠1.25mg「TE」	1.25mg1錠	ピモベンダン	後発		
注射	自注採用	ヒューマリンR注100単位/mL	100単位1mL	インスリン ヒト(遺伝子組換え)		劇	膵臓ホルモン剤
注射	自注院外	ヒューマログミックス25注ミリオベン	300単位1キッ	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)		劇	膵臓ホルモン剤
注射	自注採用	ヒューマログミックス50注ミリオベン	300単位1キッ	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)		劇	膵臓ホルモン剤
注射	自注限定	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	40mg0.4mL	アダリムマブ(遺伝子組換え)		劇	免疫抑制剤
注射	自注限定	ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL	80mg0.8mL	アダリムマブ(遺伝子組換え)		劇	免疫抑制剤
内服	採用	ピラノアOD錠20mg	20mg1錠	ピラスチン			
内服	限定	ピラフトピカプセル50mg	50mg1カプセル	エンコラフェニブ		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	限定	ピラフトピカプセル75mg	75mg1カプセル	エンコラフェニブ		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	採用	ピラマイド原末	1g	ピラジナミド			
注射	採用	ピリスコピン点滴静注50	10.55%100	イオトロクス酸メグルミン			
内服	採用	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg	25mg1カプセル	ピルシカイニド塩酸塩水和物	後発	劇	不整脈用剤
内服	採用	ビルタサ懸濁用散分包8.4g	8.4g1包	パチロマーソルビテクスカルシウム			
外用	採用	ヒルドイドクリーム0.3%	1g	ヘパリン類似物質			
外用	外+限	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	1g	ヘパリン類似物質			
外用	院外	ヒルドイドローション0.3%	1g	ヘパリン類似物質			
内服	採用	ヒルナミン錠(25mg)	25mg1錠	レボメプロマジンマレイン酸塩			精神神経用剤
外用	採用	ビレーズトリエアロスフィア120吸入	120吸入1キッ	ブデソニド・グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸塩水和物			

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
内服	外+限	ピレスパ錠200mg	200mg1錠	ピルフェニドン		劇	
外用	採用	ピレノキシシ懸濁性点眼液0.005%	0.005%5mL	ピレノキシシ	後発		
内服	院外	ビンダケルカブセル20mg	20mg1カブセル	タファミジスメグルミン		劇	
注射	採用	ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg	30.8mg2mL	ファスジル塩酸塩水和物	後発	劇	
内服	採用	ファムビル錠250mg	250mg1錠	ファムシクロビル			
内服	採用	ファモチジンD錠10mg「サワイ」	10mg1錠	ファモチジン			
内服	採用	ファモチジンD錠20mg「サワイ」	20mg1錠	ファモチジン			
注射	採用	ファモチジン静注液20mg「日医工」	20mg20mL1	ファモチジン	後発		
内服	院外	ファロム錠200mg	200mg1錠	ファロベネムナトリウム水和物			
内服	採用	フィコンパ錠2mg	2mg1錠	ペランパネル水和物			抗てんかん剤
内服	院外	フィコンパ錠4mg	4mg1錠	ペランパネル水和物			抗てんかん剤
注射	採用	フィコンパ点滴静注用2mg	2mg1瓶	ペランパネル水和物			抗てんかん剤
注射	採用	フィジオ140輸液	500mL1袋	酢酸リンゲル液(ブドウ糖加)			
注射	採用	フィジオ35輸液	500mL1袋	維持液(ブドウ糖加)			
外用	院外	フィタマクリーム1%	1%1g	タビナロフ			
注射	限定	フィフェンド200mg静注用	200mg1瓶	ポリコナゾール		劇	
外用	院外	フィブラストスプレー250	250μg1瓶(溶)	トラフェルミン(遺伝子組換え)			
外用	採用	フィブラストスプレー500	500μg1瓶(溶)	トラフェルミン(遺伝子組換え)			
注射	採用	フィブロガミンP静注用	240国際単位1	ヒト血漿由来乾燥血液凝固第XIII因子	特生		
注射 自注	採用	フィルグラスチムBS注75μgシリン	75μg0.3mL	フィルグラスチム(遺伝子後発)			
注射	採用	プールシンチ注	10MBq	人血清アルブミンジエチレントリアミン五酢酸テクネチウム(99mTc)			
内服	院外	フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「S	30mg1錠	フェキソフェナジン塩酸塩			
内服	採用	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「S	60mg1錠	フェキソフェナジン塩酸塩			
注射	採用	フェジン静注40mg	40mg2mL1管	含糖酸化鉄			
注射	採用	フェスゴ配合皮下注 IN	15mL1瓶	ペルツスマブ(遺伝子組換え)・トラスツ	劇		抗悪性腫瘍剤
注射	採用	フェスゴ配合皮下注 MA	10mL1瓶	ペルツスマブ(遺伝子組換え)・トラスツ	劇		抗悪性腫瘍剤
注射	採用	フェソロデックス筋注250mg	250mg5mL1	フルベストラント		劇	抗悪性腫瘍剤
外用	採用	フエナゾール軟膏5%	5%1g	ウフェナマート			
外用	外+限	フェノール・亜鉛華リニメント	10g	フェノール・亜鉛華リニメント			
内服	外+限	フェノバル錠30mg	30mg1錠	フェノバルビタール		劇 精3	抗てんかん剤
注射	採用	フェノバル注射液100mg	10%1mL1管	フェノバルビタール		劇 精3	抗てんかん剤
内服	採用	フェノバルビタール散10%「ホエイ」	10%1g	フェノバルビタール		劇 精3	抗てんかん剤
内服	採用	フェブキソスタット錠20mg「トーワ」	20mg1錠	フェブキソスタット	後発		
外用	採用	フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」	3%1g	フェルビナク			
外用	院外	フェルビナクローション3%「ラクール	3%1mL	フェルビナク	後発		
外用	採用	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ	1mg1枚	フェンタニルクエン酸塩		麻 劇	
外用	採用	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ	2mg1枚	フェンタニルクエン酸塩		麻 劇	
外用	採用	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ	4mg1枚	フェンタニルクエン酸塩		麻 劇	
外用	採用	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ	6mg1枚	フェンタニルクエン酸塩		麻 劇	
注射	採用	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	0.005%2mL	フェンタニルクエン酸塩		麻 劇	
外用	採用	フェントステープ0.5mg	0.5mg1枚	フェンタニルクエン酸塩		麻 劇	
内服	採用	フォシーガ錠10mg	10mg1錠	ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物			糖尿病用剤
内服	院外	フォシーガ錠5mg	5mg1錠	ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物			糖尿病用剤
内服	採用	フォスブロッグ錠250mg	250mg1錠	セベラマー塩酸塩			
内服	採用	フォゼベル錠10mg	10mg1錠	テナパノル塩酸塩			
内服	採用	フォゼベル錠20mg	20mg1錠	テナパノル塩酸塩			
内服	採用	フォゼベル錠30mg	30mg1錠	テナパノル塩酸塩			
内服	採用	フォゼベル錠5mg	5mg1錠	テナパノル塩酸塩			
内服	採用	フォリアミン錠	5mg1錠	葉酸			
内服	院外	ブシ末(調剤用)「ツムラ」	1g	ブシ		劇	
注射	採用	ブスコパン注20mg	2%1mL1管	ブチルスコポラミン臭化物		劇	

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイスル分類
内服	採用	ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「F」	10mg1錠	ブチルスコポラミン臭化物	後発		
注射	採用	ブチルスコポラミン臭化物注20mgシ	20mg1mL1筒	ブチルスコポラミン臭化物	後発	劇	
内服	採用	ブドウ糖	10g	ブドウ糖			
注射	採用	ブドウ糖注5%PL「フソー」	5%20mL1管	精製ブドウ糖			
注射	採用	ブドウ糖注50%PL「フソー」	50%20mL1管	精製ブドウ糖			
内服	採用	ブラザキサカブセル110mg	110mg1カプセル	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩			血液凝固阻止剤
内服	採用	ブラザキサカブセル75mg	75mg1カプセル	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩			血液凝固阻止剤
内服	採用	フラジール内服錠250mg	250mg1錠	メロニダゾール			
外用	採用	フラジール腔錠250mg	250mg1錠	メロニダゾール			
内服	採用	プラスグレルOD錠20mg「DSEP」	20mg1錠	プラスグレル塩酸塩	後発		血液凝固阻止剤
内服	院外	プラノバル配合錠	1錠	ノルゲステレル・エチニルエストラジオール			
外用	採用	プラノプロフェン点眼液0.1%「参天」	0.1%1mL	プラノプロフェン	後発		
内服	採用	プラバスタチンNa錠10mg「Me」	10mg1錠	プラバスタチンナトリウム	後発		
内服	採用	フラボキサート塩酸塩錠200mg「サ	200mg1錠	フラボキサート塩酸塩			
内服	採用	プラミペキソール塩酸塩OD錠0.12	0.125mg1錠	プラミペキソール塩酸塩	後発	劇	
内服	採用	プラミペキソール塩酸塩OD錠0.5m	0.5mg1錠	プラミペキソール塩酸塩	後発	劇	
注射	採用	ブラリアHI皮下注60mgシリンジ0.5	60mg0.5mL	デノスマブ(遺伝子組換え)		劇	免疫抑制剤
外用	採用	フランドルテープ40mg	40mg1枚	硝酸イソソルビド			
内服	採用	ブランルカストカプセル112.5mg「F	112.5mg1カ	ブランルカスト水和物			
内服	院外	ブリービアクト錠25mg	25mg1錠	ブリーバラセタム			抗てんかん剤
内服	院外	ブリービアクト錠50mg	50mg1錠	ブリーバラセタム			抗てんかん剤
注射	採用	ブリズバインド静注液2.5g	2.5g50mL1瓶	イダルシズマブ(遺伝子組換え)			
外用	採用	プリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%	0.1%1mL	プリモニジン酒石酸塩	後発		
内服	採用	プリモボラン錠5mg	5mg1錠	メテノロン酢酸エステル			
内服	院外	フリュザクラカプセル1mg	1mg1カプセル	フルキンチニブ		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	院外	フリュザクラカプセル5mg	5mg1カプセル	フルキンチニブ		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	採用	プリリント錠60mg	60mg1錠	チカグレロル			血液凝固阻止剤
内服	採用	プリリント錠90mg	90mg1錠	チカグレロル			血液凝固阻止剤
外用	採用	プリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サン	1%1mL	プリンゾラミド	後発		
注射	採用	プリンペラン注射液10mg	0.5%2mL1管	塩酸メクロブラミド			
注射	採用	フルービックHAシリンジ	0.5mL1キット	インフルエンザHAワクチン		劇	
外用	採用	フルオール・ゼリー歯科用2%	2%1g	フッ化ナトリウム			
外用	採用	フルオシノニドクリーム0.05%「テイ	0.05%1g	フルオシノニド	後発	劇	
注射	採用	フルオレサイト静注500mg	10%5mL1瓶	フルオレセイン	後発		
注射	採用	フルオロウラシル注1000mg「トーワ	1000mg1瓶	フルオロウラシル		劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	フルオロウラシル注250mg「トーワ」	250mg1瓶	フルオロウラシル		劇	抗悪性腫瘍剤
外用	採用	フルオロメロン点眼液0.1%「NIT」	0.1%1mL	フルオロメロン	後発		
内服	採用	フルコナゾールカプセル100mg「サ	100mg1カプセル	フルコナゾール			
外用	院外	フルタイド100ディスカス	100μg60ブリ	フルチカゾンプロピオン酸エステル			
外用	外+限	フルタイド50μgエアゾール120吸入	8.83mg10.6	フルチカゾンプロピオン酸エステル			
外用	採用	フルチカゾンフランカルボン酸エステ	3mg6g1キット	フルチカゾンフランカルボン酸	後発		
外用	採用	フルティフォーム125エアゾール120	120吸入1瓶	フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物			
注射	採用	フルマゼニル静注液0.5mg「テバ」	0.5mg5mL1	フルマゼニル	後発	劇	
注射	採用	フルマリン静注用1g	1g1瓶	フロモキシセフナトリウム			
注射	限定	ブレオ注射用15mg	15mg1瓶	ブレオマイシン塩酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	採用	プレガバリンOD錠150mg「日医工」	150mg1錠	プレガバリン	後発		
内服	採用	プレガバリンOD錠25mg「日医工」	25mg1錠	プレガバリン	後発		
内服	採用	プレガバリンOD錠75mg「日医工」	75mg1錠	プレガバリン	後発		
内服	採用	プレディニン錠50	50mg1錠	ミゾリピン			免疫抑制剤
外用	採用	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エ	0.3%1g	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル			
外用	採用	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エ	0.3%1g	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル			

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
内服	採用	ブレドニゾン散「タケダ」1%	1%1g	ブレドニゾン			免疫抑制剤
内服	採用	ブレドニゾン錠1mg(旭化成)	1mg1錠	ブレドニゾン			免疫抑制剤
外用	採用	ブレドニン眼軟膏	0.25%1g	ブレドニゾン酢酸エステル			
内服	採用	ブレドニン錠5mg	5mg1錠	ブレドニゾン			免疫抑制剤
注射	採用	ブレバナー20水性懸濁注	0.5mL1筒	沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(無劇)			
内服	院外	ブレマリン錠0.625mg	0.625mg1錠	結合型エストロゲン			
内服	院外	プレミネット配合錠HD	1錠	ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド配合剤			
内服	院外	プレミネット配合錠LD	1錠	ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド配合剤			
注射	限定	ブイメンド点滴静注用150mg	150mg1瓶	ホスアプレビタントメグルミン			
外用	採用	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	1枚	フルオレセインナトリウム			
外用	院外	ブロクトセディル坐薬	1個	ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤			
注射	採用	ブロジフ静注液200	8%2.5mL1瓶	ホスフルコナゾール			
外用	院外	フロジン外用液5%	5%1mL	カルプロニウム塩化物水	後発		
内服	採用	ブロスタール錠25	25mg1錠	クロルマジノン酢酸エステル			抗悪性腫瘍剤
注射	採用	ブロスタルモン・F注射液1000	1mg1mL1管	ジノプロスト		劇	
外用	採用	ブロスタンディン軟膏0.003%	0.003%1g	アルプロスタジル アルファデクス		劇	
内服	採用	フロセミド錠10mg「NP」	10mg1錠	フロセミド	後発		
内服	採用	フロセミド錠20mg「NP」	20mg1錠	フロセミド	後発		
内服	採用	フロセミド錠40mg「NP」	40mg1錠	フロセミド	後発		
注射	採用	フロセミド注20mg「NIG」	20mg1管	フロセミド	後発		
注射	採用	プロタノールL注0.2mg	0.02%1mL1	トイソブレナリン塩酸塩		劇	不整脈用剤
注射	採用	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチ	1%10mLバイ	プロタミン硫酸塩			
内服	採用	プロチゾラムOD錠0.25mg「テバ」	0.25mg1錠	プロチゾラム		精3	
注射	採用	プロチレリン酒石酸塩注0.5mg「NP	0.5mg1管	プロチレリン酒石酸塩水	後発		
内服	採用	プロテカジンOD錠10	10mg1錠	ラフチジン			
外用	院外	プロトピック軟膏0.03%小児用	0.03%1g	タクロリムス水和物		劇	
外用	採用	プロトピック軟膏0.1%	0.1%1g	タクロリムス水和物		劇	
内服	採用	プロナーゼMS	20000単位	プロナーゼ			
注射	採用	プロハンス静注シリンジ13mL	13mL1筒	ガドテリドール			
内服	院外	プロペシア錠0.2mg	0.2mg1錠	フィナステリド		劇	
内服	院外	プロペシア錠1mg	1mg1錠	フィナステリド		劇	
外用	採用	プロベト	10g	白色ワセリン			
内服	院外	プロベラ錠2.5mg	2.5mg1錠	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル			
注射	採用	プロボフォール静注1%20mL「マル	200mg20mL	プロボフォール		劇	
注射	採用	プロボフォール静注1%50mL「マル	500mg50mL	プロボフォール		劇	
外用	採用	ブロムフェナクNa点眼液0.1%「ニッ	0.1%1mL	ブロムフェナクナトリウム	後発		
外用	採用	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%	0.2%1mL	ブロムヘキシン塩酸塩	後発		
注射	採用	ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「	0.2%2mL1管	ブロムヘキシン塩酸塩	後発		
外用	採用	ブロメライン軟膏5万単位/g*(ジェ	50000単位1g	ブロメライン			
内服	院外	フロモックス錠100mg	100mg1錠	セフカペン ビボキシル塩酸塩水和物			
内服	採用	フロリドゲル経口用2%	2%1g	ミコナゾール			
内服	採用	フロリネフ錠0.1mg	0.1mg1錠	フルドロコルチゾン酢酸エステル		劇	免疫抑制剤
内服	外+限	ページニオ錠100mg	100mg1錠	アベマシクリブ		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	外+限	ページニオ錠150mg	150mg1錠	アベマシクリブ		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	外+限	ページニオ錠50mg	50mg1錠	アベマシクリブ		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	採用	ペオーバ錠50mg	50mg1錠	ビベグロン			
内服	院外	ペオン錠80	80mg1錠	ザルトプロフェン		劇	
外用	採用	ヘキザックAL液1%	1%10mL	クロルヘキシジングルコン酸塩			
注射	採用	ペグティビックス点滴静注100mg	100mg5mL1	パニツムマブ(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	ペグフィルグラスチムBS皮下注3.6	3.6mg0.36r	ペグフィルグラスチム(遺後発			
注射	採用	ベクルリー点滴静注用100mg	100mg1瓶	レムデシビル			

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイスル分類
内服	外+限	ベシケアOD錠2.5mg	2.5mg1錠	コハク酸ソリフェナシン			
内服	採用	ベシケアOD錠5mg	5mg1錠	コハク酸ソリフェナシン			
外用	採用	ベストロン点眼液0.5%	5mg1mL(溶解)	セフメノキシム塩酸塩			
外用	院外	ベセルナクリーム5%	5%250mg1包	イミキモド			
内服	採用	ベタニス錠50mg	50mg1錠	ミラベグロン		劇	
内服	採用	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トー	6mg1錠	ベタヒスチンメシル酸塩			
外用	院外	ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム	0.12%1g	ベタメタゾン吉草酸エステル	後発		
外用	院外	ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.1	0.12%1g	ベタメタゾン吉草酸エステル	後発		
外用	採用	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン	0.05%1g	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン	酸	劇	
外用	採用	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン	0.05%1g	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン	酸	劇	
注射	限定	ベナンバックス注射300mg	300mg1瓶	ペンタミジンイセチオン酸塩		劇	
内服	採用	ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	4mg1錠	ベニジピン塩酸塩	後発	劇	
外用	採用	ベネトリン吸入液0.5%	0.5%1mL	サルブタモール硫酸塩			
外用	採用	ベノキシール点眼液0.4%	0.4%1mL	オキシブプロカイン塩酸塩			
注射	採用	ベバシズマブBS点滴静注100mg「	100mg4mL1	ベバシズマブ(遺伝子組)	後発	劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	ベバシズマブBS点滴静注400mg「	400mg16mL	ベバシズマブ(遺伝子組)	後発	劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	ヘパティメージ注	10MBq	N-ペリドキシリン-5-メチルトリプトファンテクネチウム(99mTc)			
注射	採用	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチ	5000単位5mL	ヘパリンナトリウム			
注射	採用	ヘパリンNa透析用250単位/mLシ	5000単位20n	ヘパリンナトリウム			
外用	採用	ヘパリン類似物質ローション0.3%	1g	ヘパリン類似物質	後発		
外用	院外	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3	1g	ヘパリン類似物質	後発		
外用	採用	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3	1g	ヘパリン類似物質	後発		
外用	院外	ベピオウォッシュジェル5%	5%1g	過酸化ベンゾイル			
外用	院外	ベピオゲル2.5%	2.5%1g	過酸化ベンゾイル			
外用	院外	ベピオローション2.5%	2.5%1g	過酸化ベンゾイル			
注射	採用	ヘプタバックス-II水性懸濁注シリン	0.25mL1筒	組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由		劇	
注射	採用	ヘプタバックス-II水性懸濁注シリン	0.5mL1筒	組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由		劇	
内服	採用	ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」	50mg1錠	ベプリジル塩酸塩水和物	後発	劇	不整脈用剤
内服	採用	ベムリディ錠25mg	25mg1錠	テノホビル アラフェナミドフマル酸塩		劇	
注射	採用	ペメトレキセド点滴静注液100mg「N	100mg4mL1	ペメトレキセドナトリウム	後発	劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	ペメトレキセド点滴静注液500mg「N	500mg20mL	ペメトレキセドナトリウム	後発	劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	ペメトレキセド点滴静注液800mg「N	800mg32mL	ペメトレキセドナトリウム	後発	劇	抗悪性腫瘍剤
外用	採用	ヘモポリゾン軟膏	1g	大腸菌死菌・ヒドロコルチ	後発		
内服	採用	ベラプロストNa錠20μg「オーハラ」	20μg1錠	ベラプロストナトリウム	後発	劇	
外用	採用	ベリオドン		パラホルムアルデヒド・ジブカイン塩酸	劇		
内服	採用	ベリキューボ錠10mg	10mg1錠	ベルイシグアト			
内服	採用	ベリキューボ錠2.5mg	2.5mg1錠	ベルイシグアト			
内服	院外	ベリキューボ錠5mg	5mg1錠	ベルイシグアト			
注射	限定	ベリセート360NL腹膜透析液	1L1袋(排液用)	腹膜透析液			
注射	限定	ベリセート360NL腹膜透析液	1.5L1袋(排液)	腹膜透析液			
注射	限定	ベリセート360NL腹膜透析液	2L1袋	腹膜透析液			
注射	限定	ベリセート360NL腹膜透析液	2L1袋(排液用)	腹膜透析液			
注射	限定	ベリセート360NL腹膜透析液	3L1袋	腹膜透析液			
注射	限定	ベリセート360NL腹膜透析液	2L1袋	腹膜透析液			
注射	限定	ベリセート360NL腹膜透析液	1L1袋(排液用)	腹膜透析液			
注射	限定	ベリセート360NL腹膜透析液	1.5L1袋(排液)	腹膜透析液			
注射	限定	ベリセート360NL腹膜透析液	2L1袋(排液用)	腹膜透析液			
注射	限定	ベリセート360NL腹膜透析液	3L1袋	腹膜透析液			
注射	限定	ベリセート400NL腹膜透析液	1L1袋(排液用)	腹膜透析液			
注射	限定	ベリセート400NL腹膜透析液	1.5L1袋(排液)	腹膜透析液			
注射	限定	ベリセート400NL腹膜透析液	2L1袋	腹膜透析液			

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
注射	限定	ペリセート400NL腹膜透析液	2L1袋(排液用)	腹膜透析液			
注射	限定	ペリセート400NL腹膜透析液	3L1袋	腹膜透析液			
注射	限定	ペリセート400N腹膜透析液	2L1袋	腹膜透析液			
注射	限定	ペリセート400N腹膜透析液	1L1袋(排液用)	腹膜透析液			
注射	限定	ペリセート400N腹膜透析液	1. 5L1袋(排液用)	腹膜透析液			
注射	限定	ペリセート400N腹膜透析液	2L1袋(排液用)	腹膜透析液			
注射	限定	ペリセート400N腹膜透析液	3L1袋	腹膜透析液			
内服	採用	ペリチーム配合顆粒	1g	膵臓性消化酵素配合剤			
外用	採用	ペリプラストP コンビセット 組織接着	1mL2キット1組	フィブリノゲン加第XIII因子		特生	
外用	採用	ペリプラストP コンビセット 組織接着	3mL2キット1組	フィブリノゲン加第XIII因子		特生	
内服	採用	ベルサンチン錠25mg	25mg1錠	ジビリダモール			血液凝固阻止剤
内服	限定	ベルジピン錠10mg	10mg1錠	ニカルジピン塩酸塩			
内服	採用	ベルソムラ錠15mg	15mg1錠	スボレキサント			
内服	院外	ベルソムラ錠20mg	20mg1錠	スボレキサント			
外用	院外	ベルベゾロンF点眼・点鼻液	1mL	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩			
外用	院外	ベロテックエロゾル100	20mg10mL1	フェノテロール臭化水素酸塩			
内服	採用	ベンザリン細粒1%	1%1g	ニトラゼパム		精3	抗てんかん剤
外用	院外	ペンタサ坐剤1g	1g1個	メサラジン			
外用	院外	ペンタサ注腸1g	1g1個	メサラジン			
内服	採用	ペンタサ顆粒94%	94%1g	メサラジン			
外用	採用	ペンレステープ18mg	(18mg)30. 5	リドカイン		劇	
外用	採用	ボアラ軟膏0. 12%	0. 12%1g	デキサメタゾン吉草酸エステル			
内服	採用	ボースデル内用液10	10mg250mL	塩化マンガン四水和物			
内服	採用	ボグリボースOD錠0. 3mg「武田テ	0. 3mg1錠	ボグリボース	後発		糖尿病用剤
注射	採用	ホストイン静注750mg	750mg10mL	ホスフェニトインナトリウム水和物		劇	抗てんかん剤
外用	採用	ホスミンS耳科用3%	30mg1mL(溶	ホスホマイシンナトリウム			
内服	院外	ホスミンドライシロップ400	400mg1g	ホスホマイシンカルシウム水和物			
内服	採用	ホスミン錠250	250mg1錠	ホスホマイシンカルシウム水和物			
外用	採用	ボスミン外用液0. 1%	0. 1%1mL	アドレナリン			
注射	採用	ボスミン注1mg	0. 1%1mL1管	アドレナリン		劇	
内服	採用	ホスリボン配合顆粒	100mg1包(リ	リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム			
外用	採用	ボチシート20%	5g	亜鉛華	後発		
注射	採用	ボトックス注用50単位	50単位1瓶	A型ボツリヌス毒素		毒	
内服	院外	ボナロン経口ゼリー35mg	35mg1包	アレンドロン酸ナトリウム水和物		劇	
内服	院外	ボノサップバック400	1シート	ボノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン			
内服	院外	ボノピオンパック	1シート	ボノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・メトロニダゾール			
外用	採用	ボビシュガーバスタ軟膏	1g	精製白糖・ボビドンヨード	後発		
外用	採用	ボビドンヨードガーグル液7%「明治」	7%1mL	ボビドンヨード			
外用	採用	ボビドンヨードスクラブ液7. 5%「明治	7. 5%10mL	ボビドンヨード	後発		
外用	採用	ボビドンヨード液10%「メタル」	10%10mL	ボビドンヨード	後発		
内服	採用	ポラブレジンOD錠75mg「サワイ」	75mg1錠	ポラブレジン			
内服	採用	ポララミン錠2mg	2mg1錠	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩			
注射	採用	ポララミン注5mg	0. 5%1mL1管	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩			
内服	外+限	ポリコナゾール錠200mg「DSEP」	200mg1錠	ポリコナゾール	後発	劇	
内服	外+限	ポリコナゾール錠50mg「DSEP」	50mg1錠	ポリコナゾール	後発	劇	
内服	採用	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリ	20%25g1個	ポリスチレンスルホン酸カルシウム			
内服	採用	ポリフル細粒83. 3%	83. 3%1g	ポリカルボフィルカルシウム			
内服	院外	ボルズィ錠5mg	5mg1錠	ボルノレキサント水和物			
注射	採用	ボルベン輸液6%	6%500mL1袋	ヒドロキシエチルデンブン130000			
外用	採用	ホルマリン「ケンエー」	10mL	ホルマリン		劇	
外用	採用	ホルマリン・グアヤコールFG「ネオ」		ホルマリン・グアヤコール		劇	

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
外用	院外	ボンアルファハイローション20 μ g/	0.002%1g	タカルシトール水和物		劇	
外用	院外	ボンアルファハイ軟膏20 μ g/g	0.002%1g	タカルシトール水和物		劇	
外用	院外	ボンアルファ軟膏2 μ g/g	0.0002%1g	タカルシトール水和物		劇	
内服	採用	ポンターシロップ3.25%	3.25%1mL	メフェナム酸			
注射	採用	マーカイン注0.25%	0.25%10mL	ブビバカイン塩酸塩水和物		劇	
注射	採用	マーカイン注0.5%	0.5%10mL	ブビバカイン塩酸塩水和物		劇	
注射	採用	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	0.5%4mL1管	ブビバカイン塩酸塩水和物		劇	
注射	採用	マーカイン注脊麻用0.5%等比重	0.5%4mL1管	ブビバカイン塩酸塩水和物		劇	
内服	採用	マーズレンS配合顆粒	1g	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン			
外用	院外	マーデュオックス軟膏	1g	マキサカルシトール・ベタメタゾン酪酸エステル水和物		劇	
注射	採用	マイオビュー注シリンジ	296MBq1筒	テトロホスミンテクネチウム(99mTc)			
注射	採用	マイオビュー注シリンジ	740MBq1筒	テトロホスミンテクネチウム(99mTc)			
内服	採用	マイスタン細粒1%	1%1g	クロバザム		精3	抗てんかん剤
内服	採用	マイテラーゼ錠10mg	10mg1錠	アンペノニウム塩化物			
内服	院外	マヴィレット配合錠	1錠	グレカプレビル水和物・ビブレンタスビル			
注射	採用	マキュエイド眼注用40mg	40mg1瓶	トリアムシノロンアセトニド			
内服	採用	マグコロール散68%分包50g	68%50g1包	クエン酸マグネシウム			
内服	採用	マクサルトRPD錠10mg	10mg1錠	リザトリプタン安息香酸塩		劇	
内服	採用	マグミット錠330mg	330mg1錠	酸化マグネシウム	後発		
内服	採用	マグミット錠500mg	500mg1錠	酸化マグネシウム	後発		
内服	院外	マスーレッド錠12.5mg	12.5mg1錠	モリデュスタットナトリウム		劇	
内服	院外	マスーレッド錠25mg	25mg1錠	モリデュスタットナトリウム		劇	
内服	院外	マスーレッド錠5mg	5mg1錠	モリデュスタットナトリウム		劇	
内服	院外	マスーレッド錠75mg	75mg1錠	モリデュスタットナトリウム		劇	
内服	採用	マドパー配合錠L100	1錠	レボドパ・ベンセラジド塩酸塩			
注射	自注採用	マンジャロ皮下注10mgアテオス	10mg0.5mL	チルゼパチド		劇	糖尿病用剤
注射	自注採用	マンジャロ皮下注12.5mgアテオス	12.5mg0.5mL	チルゼパチド		劇	糖尿病用剤
注射	自注採用	マンジャロ皮下注15mgアテオス	15mg0.5mL	チルゼパチド		劇	糖尿病用剤
注射	自注採用	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	2.5mg0.5mL	チルゼパチド		劇	糖尿病用剤
注射	自注採用	マンジャロ皮下注5mgアテオス	5mg0.5mL	チルゼパチド		劇	糖尿病用剤
注射	自注採用	マンジャロ皮下注7.5mgアテオス	7.5mg0.5mL	チルゼパチド		劇	糖尿病用剤
注射	採用	マンニトールS注射液	300mL1袋	D-ソルビトール・D-マンニトール			
注射	採用	ミールビックII皮下注用	一人分1瓶(溶液)	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン		劇	
注射	採用	ミオMIBG-1123注射液	10MBq	3-ヨードベンジルグアニジン(123I)			
外用	採用	ミオコールスプレー0.3mg	0.65%7.2g	ニトログリセリン		劇	
外用	院外	ミオピン点眼液	5mL1瓶	ネオスチグミンメチル硫酸塩・無機塩類配合剤			
内服	院外	ミカトリオ配合錠	1錠	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩		劇	
注射	採用	ミカファンギンNa点滴静注用75mg	75mg1瓶	ミカファンギンナトリウム	後発	劇	
内服	院外	ミグシス錠5mg	5mg1錠	ロメリジン塩酸塩			
内服	採用	ミグリトールOD錠50mg「サワイ」	50mg1錠	ミグリトール	後発		糖尿病用剤
外用	院外	ミケルナ配合点眼液	1mL	カルテオロール塩酸塩・ラタノプロスト			
注射	採用	ミダゾラム注射液10mg「NIG」	10mg2mL1管	ミダゾラム		精3	
内服	採用	ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」	10mg1錠	ミチグリニドカルシウム水	後発		糖尿病用剤
内服	院外	ミティキュアダニ舌下錠10000JAU	10000JAU1錠	アレルゲンエキス			
内服	採用	ミティキュアダニ舌下錠3300JAU	3300JAU1錠	アレルゲンエキス			
内服	採用	ミドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」	2mg1錠	ミドリン塩酸塩	後発		
内服	外+限	ミニリンメルトOD錠120 μ g	120 μ g1錠	デスマプレシン酢酸塩水和物		劇	
内服	院外	ミニリンメルトOD錠25 μ g	25 μ g1錠	デスマプレシン酢酸塩水和物		劇	
内服	院外	ミニリンメルトOD錠50 μ g	50 μ g1錠	デスマプレシン酢酸塩水和物		劇	
内服	採用	ミニリンメルトOD錠60 μ g	60 μ g1錠	デスマプレシン酢酸塩水和物		劇	
内服	院外	ミネプロOD錠1.25mg	1.25mg1錠	エサキセレン			

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
内服	採用	ミネプロOD錠2.5mg	2.5mg1錠	エサキセロン			
内服	院外	ミネプロOD錠5mg	5mg1錠	エサキセロン			
注射	採用	ミネラミック注	2mL1管	塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤			
外用	採用	ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%	10mg0.5g1%	ミノサイクリン塩酸塩	後発		
内服	採用	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	50mg1錠	ミノサイクリン塩酸塩			
注射	採用	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100	100mg1瓶	ミノサイクリン塩酸塩			
内服	採用	ミノドロン酸錠50mg「日医工」	50mg1錠	ミノドロン酸水和物	後発	劇	
内服	採用	ミヤBM錠	1錠	酪酸菌製剤			
注射	採用	ミラクリッド注射液5万単位	50000単位1n	ウリナスタチン			
内服	採用	ミラベックスLA錠0.375mg	0.375mg1錠	プラミベキソール塩酸塩水和物		劇	
内服	採用	ミラベックスLA錠1.5mg	1.5mg1錠	プラミベキソール塩酸塩水和物		劇	
注射	採用	ミルセラ注シリンジ100μg	100μg0.3m	エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組)		劇	
注射	採用	ミルセラ注シリンジ150μg	150μg0.3m	エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組)		劇	
注射	採用	ミルセラ注シリンジ25μg	25μg0.3mL	エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組)		劇	
注射	採用	ミルセラ注シリンジ50μg	50μg0.3mL	エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組)		劇	
注射	採用	ミルセラ注シリンジ75μg	75μg0.3mL	エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組)		劇	
内服	採用	ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」	15mg1錠	ミルタザピン	後発	劇	精神神経用剤
注射	採用	ミルリノン静注液10mg「NIG」	10mg10mL1	ミルリノン	後発	劇	
外用	採用	ミレーナ52mg	1個	レボノルゲストレル			
内服	採用	ミンクリア内用散布液0.8%	20mL1筒	ーメントール			
外用	採用	ムコフィリン吸入液20%	17.62%2mL	アセチルシステイン			
内服	採用	ムコプロチン配合シロップ	1mL	鎮咳配合剤	後発		
内服	院外	メリアクトMS小児用細粒10%	100mg1g	セフジトレン ビボキシル			
注射	採用	メイロン静注7%	7%20mL1管	炭酸水素ナトリウム			
注射	採用	メイロン静注7%	7%250mL1袋	炭酸水素ナトリウム			
内服	採用	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「	50mg1カプセル	メキシレチン塩酸塩	後発	劇	不整脈用剤
内服	限定	メクトビ錠15mg	15mg1錠	ビニメチニブ		劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	メコバラミン注500μg「NP」	0.5mg1管	メコバラミン	後発		
外用	院外	メサデルムクリーム0.1%	0.1%1g	デキサメタゾンプロピオン酸エステル		劇	
内服	採用	メサラジン錠500mg「ケミファ」	500mg1錠	メサラジン	後発		
内服	採用	メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	400mg1錠	メサラジン	後発		
内服	採用	メジコン配合シロップ	10mL	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物・クレゾールスルホン酸カリ			
内服	採用	メスチノン錠60mg	60mg1錠	ピリドスチグミン臭化物		劇	
注射	限定	メソトレキセート点滴静注液200mg	200mg8mL1	メソトレキセート		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	採用	メチコパール錠500μg	0.5mg1錠	メコバラミン	後発		
内服	院外	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠0	0.125mg1錠	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩		劇	
内服	採用	メチルジゴキシン錠0.1mg「NIG」	0.1mg1錠	メチルジゴキシン	後発	劇	ジギタリス製剤
内服	採用	メクロプラミド錠5mg「NIG」	5mg1錠	メクロプラミド	後発		
内服	採用	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「D	250mg1錠	メトホルミン塩酸塩		劇	糖尿病用剤
内服	採用	メドロール錠4mg	4mg1錠	メチルプレドニゾロン			免疫抑制剤
外用	院外	メノエイドコンビパッチ	1枚	エストラジオール・酢酸ノルエチステロン			
外用	採用	メブチンエア―10μg吸入100回	0.0143%5m	プロカテロール塩酸塩水和物			
内服	採用	メブチンミニ錠25μg	0.025mg1錠	プロカテロール塩酸塩水和物			
外用	採用	メブチン吸入液ユニット0.3mL	0.01%0.3m	プロカテロール塩酸塩水和物			
内服	採用	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「明治	20mg1錠	メマンチン塩酸塩	後発	劇	
内服	採用	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「明治」	5mg1錠	メマンチン塩酸塩	後発	劇	
内服	院外	メラトベル顆粒小児用0.2%	0.2%1g	メラトニン			
内服	採用	メルカゾール錠5mg	5mg1錠	チアマゾール			
注射	限定	メルカゾール注10mg	10mg1管	チアマゾール			
注射	採用	メロペネム点滴静注用1g「NP」	1g1瓶	メロペネム水和物			
注射	採用	メンクアッドフィ筋注	0.5mL1瓶	4価髄膜炎菌ワクチン(破傷風トキソイ		劇	

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
外用	院外	モイゼルト軟膏1%	1%1g	ジファミラスト			
内服	院外	モービック錠10mg	10mg1錠	メロキシカム			
外用	採用	モキシフロキサシン点眼液0.5%「サ	0.5%1mL	モキシフロキサシン塩酸	後発		
内服	採用	モサブリドクエン酸塩錠5mg「ケミフ	5mg1錠	モサブリドクエン酸塩水和物			
注射	採用	モノヴァー静注500mg	500mg5mL1	デルイソマルトース第二鉄			
内服	採用	モビコール配合内用剤HD	13.7046g1包	マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム			
内服	院外	モビコール配合内用剤LD	6.8523g1包	マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム			
内服	採用	モビブレップ配合内用剤	1袋	ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合剤			
外用	採用	モメタゾン点鼻液50μg「ニットー」5	5mg10g1瓶	モメタゾンフランカルボン	後発		
注射	採用	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオ	1%1mL1管	モルヒネ塩酸塩水和物		麻 劇	
注射	採用	モルヒネ塩酸塩注射液200mg「シオ	4%5mL1管	モルヒネ塩酸塩水和物		麻 劇	
内服	採用	モンテルカストOD錠10mg「タカタ	10mg1錠	モンテルカストナトリウム	後発		
内服	院外	ヤーズフレックス配合錠	1錠	ドロスピレノン・エチニルエストラジオール	ベータデクス		
内服	院外	ヤーズ配合錠	1錠	ドロスピレノン・エチニルエストラジオール	ベータデクス		
注射	限定	ヤーボイ点滴静注液50mg	50mg10mL1	イピリムマブ(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍剤
外用	院外	ヤクバンテープ60mg	15cm×14cm	フルルビプロフェン			
内服	院外	ユーエフティE配合顆粒T100	100mg1包(テ	テガフル・ウラシル		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	院外	ユーエフティE配合顆粒T150	150mg1包(テ	テガフル・ウラシル		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	院外	ユーエフティE配合顆粒T200	200mg1包(テ	テガフル・ウラシル		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	院外	ユーゼル錠25mg	25mg1錠	ホリナートカルシウム水和物			抗悪性腫瘍剤
内服	院外	ユーロジン2mg錠	2mg1錠	エスタゾラム		精3	
注射	採用	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4	4g1瓶	滅菌調整タルク			抗悪性腫瘍剤
内服	採用	ユベラ錠50mg	50mg1錠	トコフェロール酢酸エステル			
外用	採用	ユベラ軟膏	1g	トコフェロール・ビタミンA油			
内服	採用	ユリス錠1mg	1mg1錠	ドチヌラド			
内服	院外	ユリノーム錠50mg	50mg1錠	ベンズプロマロン		劇	
内服	採用	ヨウ化カリウム「コザカイ・M」	1g	ヨウ化カリウム		劇	
内服	院外	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	50mg1丸	ヨウ化カリウム			
内服	院外	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	1錠	ヨクイニンエキス			
注射 自注	院外	ライゾデグ配合注 フレックスタッチ	300単位1キッ	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)	劇		膵臓ホルモン剤
内服	採用	ラクツロースシロップ65%「タカタ」	65%1mL	ラクツロース			
外用	院外	ラクティオンパップ70mg	10cm×14cm	インドメタシン			
注射	採用	ラクテック注	500mL1袋	乳酸リンゲル液			
内服	採用	ラグノスNF経口ゼリー分包12g	54.167%12	ラクツロース	後発		
外用	院外	ラクリミン点眼液0.05%	0.05%5mL1	オキシプロカイン塩酸塩			
内服	採用	ラゲブリオ錠400mg	400mg1錠	モルヌピラビル		劇	
内服	採用	ラコールNF配合経腸用液	10mL	経腸成分栄養剤			
内服	採用	ラコサミド錠100mg「タカタ」	100mg1錠	ラコサミド	後発	劇	抗てんかん剤
内服	採用	ラコサミド錠50mg「タカタ」	50mg1錠	ラコサミド	後発	劇	抗てんかん剤
内服	院外	ラジレス錠150mg	150mg1錠	アリスキレンフマル酸塩			
注射	採用	ラストット注100mg/5mL	100mg5mL1	エトボシド		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	採用	ラスビック錠75mg	75mg1錠	ラスクフロキサシン塩酸塩			
注射	採用	ラスビック点滴静注キット150mg	150mg1キット	ラスクフロキサシン塩酸塩		劇	
外用	採用	ラタチモ配合点眼液「ニットー」	1mL	ラタノプロスト・チモロー	後発		
外用	採用	ラタノプロスト点眼液0.005%「SE	0.005%1mL	ラタノプロスト	後発		
内服	採用	ラックビー微粒N	1%1g	ビフィズス菌製剤			
注射	採用	ラニビズマブBS硝子体内注射用キッ	0.5mg0.05r	ラニビズマブ(遺伝子組換	後発	劇	
注射	採用	ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg	300mg60mL	ペラミビル水和物			
内服	採用	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「	10mg1錠	ラベプラゾールナトリウム	後発		
内服	院外	ラベプラゾールナトリウム錠5mg「ケ	5mg1錠	ラベプラゾールナトリウム	後発		
内服	院外	ラマトロバン錠75mg「KO」	75mg1錠	ラマトロバン	後発		

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
内服	外+限	ラミクタール錠100mg	100mg1錠	ラモトリギン		劇	抗てんかん剤
内服	外+限	ラミクタール錠25mg	25mg1錠	ラモトリギン		劇	抗てんかん剤
内服	院外	ラミクタール錠小児用2mg	2mg1錠	ラモトリギン		劇	抗てんかん剤
内服	院外	ラミクタール錠小児用5mg	5mg1錠	ラモトリギン		劇	抗てんかん剤
注射	採用	ランジオロール塩酸塩点滴静注用15	150mg1瓶	ランジオロール塩酸塩	後発	劇	不整脈用剤
内服	採用	ランソプラゾールOD錠15mg「トロー	15mg1錠	ランソプラゾール	後発		
注射	自注採用	ランタスXR注ソロスター	450単位1キッ	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	劇		膵臓ホルモン剤
注射	自注採用	ランタス注100単位/mL	100単位1mL	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	劇		膵臓ホルモン剤
注射	採用	ランマークHI皮下注120mgシリンジ	120mg1mL1	デノスマブ(遺伝子組換え)	劇		抗悪性腫瘍剤
内服	採用	リアルダ錠1200mg	1200mg1錠	メサラジン			
内服	採用	リーバクト配合経口ゼリー	20g1個	イソロイシン・ロイシン・バリン			
内服	採用	リーバクト配合顆粒	4. 15g1包	イソロイシン・ロイシン・バリン			
内服	採用	リウマトレックスカプセル2mg	2mg1カプセル	メトトレキサート		劇	免疫抑制剤
内服	採用	リオナ錠250mg	250mg1錠	クエン酸第二鉄水和物			
内服	採用	リクシアナOD錠15mg	15mg1錠	エドキサバントシル酸塩水和物			血液凝固阻止剤
内服	院外	リクシアナOD錠30mg	30mg1錠	エドキサバントシル酸塩水和物			血液凝固阻止剤
内服	採用	リクシアナOD錠60mg	60mg1錠	エドキサバントシル酸塩水和物			血液凝固阻止剤
注射	採用	リクラスト点滴静注液5mg	5mg100mL1	ゾレドロン酸水和物	劇		
注射	採用	リコモジュリン点滴静注用12800	12800単位1瓶	トロンボモデュリン アルファ(遺伝子組換え)			
内服	採用	リザベンカプセル100mg	100mg1カプセル	トラニラスト			
内服	院外	リスパダール細粒1%	1%1g	リスペリドン		劇	精神神経用剤
内服	採用	リスペリドンOD錠0. 5mg「サワイ」	0. 5mg1錠	リスペリドン		劇	精神神経用剤
内服	採用	リスペリドンOD錠1mg「サワイ」	1mg1錠	リスペリドン		劇	精神神経用剤
内服	採用	リズミック錠10mg	10mg1錠	アメジニウムメチル硫酸塩			
内服	採用	リセドロン酸Na錠17. 5mg「サワイ」	17. 5mg1錠	リセドロン酸ナトリウム水	後発	劇	
注射	限定	リツキシマン点滴静注100mg	100mg10mL	リツキシマブ(遺伝子組換え)			抗悪性腫瘍剤
注射	限定	リツキシマン点滴静注500mg	500mg50mL	リツキシマブ(遺伝子組換え)			抗悪性腫瘍剤
外用	採用	リティンパ耳科用250μgセット	1セット	トラフェルミン(遺伝子組換え)			
外用	採用	リドカインテープ18mg「YP」	(18mg)30. 5	リドカイン		劇	
内服	採用	リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」	2%1mL	リドカイン塩酸塩	後発	劇	
注射	採用	リドカイン塩酸塩注0. 5%「日新」	0. 5%10mL1	リドカイン塩酸塩	後発	劇	
注射	採用	リドカイン塩酸塩注2%「日新」	2%5mL1管	リドカイン塩酸塩	後発	劇	
注射	採用	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ	2%5mL1筒	リドカイン塩酸塩		劇	不整脈用剤
注射	限定	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」	1%200mL1袋	リドカイン	後発	劇	不整脈用剤
外用	院外	リドメックスコーワローション0. 3%	0. 3%1g	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル			
外用	採用	リナパス消毒液0. 2%	0. 2%10mL	ベンザルコニウム塩化物			
内服	採用	リネゾリド錠600mg「明治」	600mg1錠	リネゾリド	後発		
注射	採用	リネゾリド点滴静注液600mg「明治	600mg300m	リネゾリド	後発		
内服	採用	リバーロキサバンOD錠10mg「バイ	10mg1錠	リバーロキサバン	後発		血液凝固阻止剤
内服	採用	リバーロキサバンOD錠15mg「バイ	15mg1錠	リバーロキサバン	後発		血液凝固阻止剤
内服	採用	リパクレオンカプセル150mg	150mg1カプセル	パンクレリパーゼ			
外用	採用	リバスタッチパッチ13. 5mg	13. 5mg1枚	リバスタチグミン		劇	
外用	採用	リバスタッチパッチ18mg	18mg1枚	リバスタチグミン		劇	
外用	採用	リバスタッチパッチ4. 5mg	4. 5mg1枚	リバスタチグミン		劇	
外用	採用	リバスタッチパッチ9mg	9mg1枚	リバスタチグミン		劇	
内服	採用	リバゼブ配合錠HD	1錠	ピタバスタチンカルシウム水和物・エゼチミブ配合剤			
内服	院外	リバゼブ配合錠LD	1錠	ピタバスタチンカルシウム水和物・エゼチミブ配合剤			
注射	採用	リビオドール480注10mL	10mL1管	ヨード化ケシ油脂脂肪酸エチルエステル			
内服	採用	リビディル錠80mg	80mg1錠	フェノフィブラート			
内服	採用	リファンピシカプセル150mg「サン	150mg1カプセル	リファンピシン			
内服	採用	リフキシマ錠200mg	200mg1錠	リファキシミン			

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
内服	外+限	リベルサス錠14mg	14mg1錠	セマグルチド(遺伝子組換え)		劇	糖尿病用剤
内服	採用	リベルサス錠3mg	3mg1錠	セマグルチド(遺伝子組換え)		劇	糖尿病用剤
内服	採用	リベルサス錠7mg	7mg1錠	セマグルチド(遺伝子組換え)		劇	糖尿病用剤
外用	院外	リボスチン点眼液0.025%	0.025%1mL	レボカバステン塩酸塩			
外用	院外	リボスチン点鼻液0.025mg112噴	0.025%15m	レボカバステン塩酸塩			
内服	採用	リボトリール細粒0.1%	0.1%1g	クロナゼパム		精3	抗てんかん剤
内服	採用	リボトリール錠0.5mg	0.5mg1錠	クロナゼパム		精3	抗てんかん剤
内服	採用	リマチル錠100mg	100mg1錠	ブシラミン		劇	
内服	採用	リマプロストアルファデクス錠5μg「A」	5μg1錠	リマプロスト アルファデクス	後発		
注射	採用	リメタゾン静注2.5mg	2.5mg1mL1	デキサメタゾンパルミチン酸エステル		劇	免疫抑制剤
注射	採用	リユープリンPRO注射用キット22.5	22.5mg1筒	リユープロレリン酢酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	リユープリン注射用1.88mg	1.88mg1瓶(10mL)	リユープロレリン酢酸塩		劇	
注射	採用	リユープロレリン酢酸塩SR注射用キット	11.25mg1筒	リユープロレリン酢酸塩	後発	劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	リユープロレリン酢酸塩注射用キット	1.88mg1筒	リユープロレリン酢酸塩	後発	劇	
注射	採用	リユープロレリン酢酸塩注射用キット	3.75mg1筒	リユープロレリン酢酸塩	後発	劇	抗悪性腫瘍剤
内服	外+限	リルゾール錠50mg「AA」	50mg1錠	リルゾール	後発		
外用	院外	リレンザ	5mg1ブリスター	ザナミビル水和物			
内服	院外	リンヴォック錠15mg	15mg1錠	ウパダシチニブ水和物		劇	免疫抑制剤
内服	院外	リンヴォック錠30mg	30mg1錠	ウパダシチニブ水和物		劇	免疫抑制剤
内服	院外	リンヴォック錠45mg	45mg1錠	ウパダシチニブ水和物		劇	免疫抑制剤
内服	院外	リンヴォック錠7.5mg	7.5mg1錠	ウパダシチニブ水和物		劇	免疫抑制剤
内服	採用	リンゼス錠0.25mg	0.25mg1錠	リナクロチド			
内服	院外	リンデロンシロップ0.01%	0.01%1mL	ベタメタゾン			免疫抑制剤
外用	院外	リンデロン坐剤0.5mg	0.5mg1個	ベタメタゾン			免疫抑制剤
内服	採用	リンデロン錠0.5mg	0.5mg1錠	ベタメタゾン			免疫抑制剤
注射	採用	リンデロン注4mg(0.4%)	4mg1管	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム			免疫抑制剤
外用	限定	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	0.1%1mL	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム			
内服	採用	リンラキサー錠250mg	250mg1錠	クロルフェネシンカルバミン酸エステル			
注射	採用	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	0.5モル20mL	リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリウム水和物			
外用	院外	ルコナック爪外用液5%	5%1g	ルリコナゾール			
内服	院外	ルセフィ錠2.5mg	2.5mg1錠	ルセオグリフロジン水和物			糖尿病用剤
注射	採用	ルセンティス硝子体内注射用キット1	0.5mg0.05mL	ラニビズマブ(遺伝子組換え)		劇	
内服	院外	ルナベル配合錠LD	1錠	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール			
内服	院外	ルナベル配合錠ULD	1錠	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール			
内服	採用	ルパフィン錠10mg	10mg1錠	ルパタジンフマル酸塩			
内服	院外	ルボックス錠25	25mg1錠	フルボキサミンマレイン酸塩			精神神経用剤
注射 自注	採用	ルムジェブ注ミリオペン	300単位1キット	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)		劇	膵臓ホルモン剤
外用	採用	ルリコンクリーム1%	1%1g	ルリコナゾール			
内服	採用	レキサルティOD錠0.5mg	0.5mg1錠	ブレクスピプラゾール		劇	精神神経用剤
内服	院外	レキサルティOD錠1mg	1mg1錠	ブレクスピプラゾール		劇	精神神経用剤
内服	院外	レキサルティOD錠2mg	2mg1錠	ブレクスピプラゾール		劇	精神神経用剤
内服	採用	レキップCR錠2mg	2mg1錠	ロビニロール塩酸塩		劇	
内服	院外	レキップCR錠8mg	8mg1錠	ロビニロール塩酸塩		劇	
内服	採用	レクサプロ錠10mg	10mg1錠	エスシタロプラムシュウ酸塩		劇	精神神経用剤
外用	院外	レクタブル2mg注腸フォーム14回	48mg30.8g1	ブデソニド			免疫抑制剤
内服	院外	レクチゾール錠25mg	25mg1錠	ジアフェニルスルホン			
内服	院外	レグパラ錠25mg	25mg1錠	シナカルセット塩酸塩			
注射	採用	レクビオ皮下注300mgシリンジ	300mg1.5mL	インクリシランナトリウム			
注射	採用	レケンビ点滴静注200mg	200mg2mL1	レカネマブ(遺伝子組換え)		劇	
注射	採用	レケンビ点滴静注500mg	500mg5mL1	レカネマブ(遺伝子組換え)		劇	
内服	院外	レザルタス配合錠HD	1錠	オルメサルタン メドキシミル・アゼルニジピン配合剤			

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
外用	採用	レスタミンコーワクリーム1%	1%10g	ジフェンヒドラミン			
内服	採用	レスタミンコーワ錠10mg	10mg1錠	ジフェンヒドラミン塩酸塩			
内服	採用	レスブレン錠30mg	30mg1錠	エブラジノン塩酸塩			
内服	限定	レットヴィモ錠40mg	40mg1錠	セルペルカチニブ		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	限定	レットヴィモ錠80mg	80mg1錠	セルペルカチニブ		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	採用	レトロゾール錠2.5mg「NK」	2.5mg1錠	レトロゾール	後発	劇	抗悪性腫瘍剤
注射 自注	採用	レパーサ皮下注140mgペン	140mg1mL1	エボロクマブ(遺伝子組換え)			
内服	採用	レバグリニド錠0.25mg「サワイ」	0.25mg1錠	レバグリニド	後発	劇	糖尿病用剤
内服	院外	レバグリニド錠0.5mg「サワイ」	0.5mg1錠	レバグリニド	後発	劇	糖尿病用剤
外用	採用	レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」	2%5mL1瓶	レバミピド	後発		
内服	採用	レバミピド錠100mg「オーツカ」	100mg1錠	レバミピド			
注射	採用	レペタン注0.3mg	0.3mg1管	ブプレノルフィン塩酸塩		劇 精2	
内服	採用	レベチラセタムDS50%「サワイ」	50%1g	レベチラセタム	後発		抗てんかん剤
内服	採用	レベチラセタム錠250mg「サワイ」	250mg1錠	レベチラセタム	後発		抗てんかん剤
内服	採用	レベチラセタム錠500mg「サワイ」	500mg1錠	レベチラセタム	後発		抗てんかん剤
注射	採用	レベチラセタム点滴静注500mg「ア	500mg5mL1	レベチラセタム	後発		抗てんかん剤
注射 自注	院外	レベミル注 フレックスペン	300単位1キッ	インスリン デテムル(遺伝子組換え)		劇	膵臓ホルモン剤
内服	採用	レボチロキシンNa錠25μg「サンド」	25μg1錠	レボチロキシンナトリウム水和物		劇	
内服	採用	レボチロキシンNa錠50μg「サンド」	50μg1錠	レボチロキシンナトリウム水和物		劇	
内服	採用	レボフロキサシン錠500mg「DSEP	500mg1錠(レ	レボフロキサシン水和物	後発		
外用	採用	レボフロキサシン点眼液1.5%「ニッ	1.5%1mL	レボフロキサシン水和物	後発		
注射	採用	レボフロキサシン点滴静注バッグ50	500mg100m	レボフロキサシン水和物	後発		
注射	採用	レボホリナート点滴静注用100mg「	100mg1瓶	レボホリナートカルシウム水和物			抗悪性腫瘍剤
注射	採用	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤ	25mg1瓶	レボホリナートカルシウム水和物			抗悪性腫瘍剤
内服	院外	レボレード錠12.5mg	12.5mg1錠	エルトロンボパグ オラミン		劇	
内服	院外	レボレード錠25mg	25mg1錠	エルトロンボパグ オラミン		劇	
注射	限定	レミケード点滴静注用100	100mg1瓶	インフリキシマブ(遺伝子組換え)		劇	免疫抑制剤
注射	採用	レミフェンタニル静注用2mg「第一三	2mg1瓶	レミフェンタニル塩酸塩	後発	麻 劇	
外用	採用	レルベア100エリブタ30吸入用	30吸入1キッ	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル			
外用	採用	レルベア200エリブタ30吸入用	30吸入1キッ	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル			
内服	院外	レルミナ錠40mg	40mg1錠	レルゴリクス		劇	
内服	院外	レンビマカプセル4mg	4mg1カプセル	レンパチニブメシル酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	採用	ロカルトロールカプセル0.25	0.25μg1カプ	カルシトリオール		劇	
内服	院外	ロキシスロマイシン錠150mg「サワ	150mg1錠	ロキシスロマイシン	後発		
外用	採用	ロキソプロフェンナトリウムテープ10	10cm×14cm	ロキソプロフェンナトリウム水和物			
外用	採用	ロキソプロフェンナトリウムテープ50	7cm×10cm1	ロキソプロフェンナトリウム水和物			
内服	採用	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	60mg1錠	ロキソプロフェンナトリウ	後発		
注射	採用	ロクロニウム臭化物静注液50mg/	50mg5mL1瓶	ロクロニウム臭化物		毒	
内服	採用	ロケルマ懸濁用散分包10g	10g1包	ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物			
内服	採用	ロケルマ懸濁用散分包5g	5g1包	ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物			
外用	採用	ロコアテープ	10cm×14cm	エスフルルビプロフェン・ハッカ油		劇	
外用	採用	ロコイドクリーム0.1%	0.1%1g	ヒドロコルチゾン酪酸エステル			
外用	採用	ロコイド軟膏0.1%	0.1%1g	ヒドロコルチゾン酪酸エステル			
内服	採用	ロサルタンK錠50mg「VTRS」	50mg1錠	ロサルタンカリウム	後発		
内服	院外	ロソーゼット配合錠HD	1錠	エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤			
内服	院外	ロソーゼット配合錠LD	1錠	エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤			
内服	採用	ロスバスタチンOD錠2.5mg「ケミフ	2.5mg1錠	ロスバスタチンカルシウ	後発		
内服	採用	ロスバスタチンOD錠5mg「ケミファ	5mg1錠	ロスバスタチンカルシウ	後発		
注射	限定	ロゼウス静注液10mg	10mg1mL1瓶	ビノレルビン酒石酸塩	後発	毒	抗悪性腫瘍剤
注射	限定	ロゼウス静注液40mg	40mg4mL1瓶	ビノレルビン酒石酸塩	後発	毒	抗悪性腫瘍剤
外用	採用	ロゼックスゲル0.75%	0.75%1g	メトロニダゾール			

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイスル分類
内服	採用	ロゼレム錠8mg	8mg1錠	ラメルテオン			
内服	採用	ロタテック内用液	2mL1本	5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン	劇		
内服	採用	ロタリックス内用液	1. 5mL1本	経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン	劇		
外用	採用	ロナセンテープ20mg	20mg1枚	ブロナンセリン	劇		精神神経用剤
注射	採用	ロピオン静注50mg	50mg5mL1管	フルルビプロフェン アキセチル	劇		
注射	採用	ロピバカイン塩酸塩0. 2%注バッグ20. 2%100mL	0. 2%100mL	ロピバカイン塩酸塩水和	後発	劇	
注射	採用	ロピバカイン塩酸塩0. 75%注150. 75%20mL	0. 75%20mL	ロピバカイン塩酸塩水和	後発	劇	
内服	採用	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG	1mg1カプセル	ロペラミド塩酸塩	後発		
内服	院外	ロルカム錠4mg	4mg1錠	ロルノキシカム		劇	
内服	院外	ロンゲス錠10mg	10mg1錠	リシノプリル水和物			
内服	院外	ロンゲス錠5mg	5mg1錠	リシノプリル水和物			
内服	採用	ロンサーフ配合錠T15	15mg1錠(トリ)	トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合錠	劇		抗悪性腫瘍剤
内服	採用	ロンサーフ配合錠T20	20mg1錠(トリ)	トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合錠	劇		抗悪性腫瘍剤
内服	採用	ワーファリン錠0. 5mg	0. 5mg1錠	ワルファリンカリウム			血液凝固阻止剤
内服	採用	ワーファリン錠1mg	1mg1錠	ワルファリンカリウム			血液凝固阻止剤
内服	院外	ワーファリン錠5mg	5mg1錠	ワルファリンカリウム			血液凝固阻止剤
注射	採用	ワゴスチグミン注0. 5mg	0. 05%1mL1	ネオスチグミンメチル硫酸塩		劇	
外用	採用	ワコビタル坐剤50	50mg1個	フェノバルビタルナトリウム		劇 精3	抗てんかん剤
内服	採用	ワソラン錠40mg	40mg1錠	ベラパミル塩酸塩			不整脈用剤
注射	採用	ワソラン静注5mg	0. 25%2mL1	ベラパミル塩酸塩		劇	不整脈用剤
内服	採用	ワントラム錠100mg	100mg1錠	トラマドール塩酸塩		劇	
注射	採用	エフェドリン「ナガサ」注射液40mg	4%1mL1管	エフェドリン塩酸塩		劇	
外用	採用	亜鉛華デンブ「コザカイ・M」	10g	亜鉛華デンブ			
外用	採用	亜鉛華軟膏「ヨシダ」	10g	亜鉛華			
内服	採用	一硝酸イソソルビド錠20mg「トーフ	20mg1錠	一硝酸イソソルビド			
注射	採用	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)	(一般診断用・1	精製ツベルクリン		劇	
外用	採用	液化亜酸化窒素＊(日本エア・リキ	1g	亜酸化窒素			
外用	採用	液状フェノール「ケンエー」	10mL	フェノール		劇	
注射	採用	塩化インジウム(111In)注＊(日本)	1患者当たり	塩化インジウム(111In)			
内服	採用	塩化カリウム	10g	塩化カリウム			
注射	採用	塩化タリウム(201Tl)注NMP	10MBq	塩化タリウム(201Tl)			
注射	採用	塩化タリウム-Tl201注射液	10MBq	塩化タリウム(201Tl)			
内服 外用	採用	塩化ナトリウム「オーツカ」	10g	塩化ナトリウム			
注射	採用	塩化ナトリウム注10%「フソー」	10%20mL1管	塩化ナトリウム			
注射	採用	乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)	一人分1管(溶解	乾燥BCGワクチン		劇	
注射	採用	乾燥HBグロブリン筋注用1000単位	1000単位5mL	乾燥抗HBs人免疫グロブリン		特生	
注射	採用	乾燥HBグロブリン筋注用200単位	200単位1mL	乾燥抗HBs人免疫グロブリン		特生	
注射	採用	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	一人分1瓶(溶解	乾燥弱毒生水痘ワクチン		劇	
注射	採用	乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」	一人分1瓶(溶解	乾燥弱毒生風しんワクチン		劇	
注射	採用	乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」	一人分1瓶(溶解	乾燥弱毒生麻しんワクチン		劇	
注射	採用	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチ	一人分1瓶(溶解	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン		劇	
外用	採用	逆性石ケン液0. 05「ヨシダ」	0. 05%10mL	ベンザルコニウム塩化物			
外用	採用	逆性石ケン液10「ヨシダ」	10%10mL	ベンザルコニウム塩化物			
外用	採用	吸水クリーム「ニッコー」	10g	吸水クリーム			
注射	採用	献血アルブミン5%静注12. 5g/25	5%250mL1瓶	人血清アルブミン			特生
注射	採用	献血ヴェノグロブリンIH10%静注10	10g100mL1瓶	ポリエチレングリコール処理人免疫グ		特生	
注射	採用	献血ヴェノグロブリンIH10%静注2. 2. 5g25mL1	2. 5g25mL1瓶	ポリエチレングリコール処理人免疫グ		特生	
注射	採用	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g	5g50mL1瓶	ポリエチレングリコール処理人免疫グ		特生	
注射	採用	献血グロベニン-I静注用5000mg	5g100mL1瓶	乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫		特生	
注射	採用	献血ベニロン-I静注用5000mg	5g100mL1瓶	乾燥スルホ化人免疫グロブリン		特生	
注射	採用	抗Dグロブリン筋注用1000倍「ニチ	1000倍1瓶(溶解	乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン		特生	

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
外用 注射	採用	歯科用シタネストーオクタプレシナ	1. 8mL1管	プロピトカイン塩酸塩・フェリプレシン		劇	
外用	採用	歯科用ホルムクレゾール「村上」	1mL	ホルマリン・クレゾール		劇	
内服	採用	重質酸化マグネシウム「ケンエー」	10g	酸化マグネシウム			
内服	採用	小児用ムコソルバンDS1. 5%	1. 5%1g	アンブロキシオール塩酸塩			
外用	採用	硝酸銀「VTRS」原末	1g	硝酸銀		劇	
外用	採用	新レシカルボン坐剤	1個	炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム			
注射	採用	水溶性ハイドロコト注射液100n	100mg2mL1	ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム			免疫抑制剤
注射	採用	水溶性プレドニン20mg	20mg1管	プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム			免疫抑制剤
注射	採用	生食注シリンジ「NP」	20mL1筒	生理食塩液			
注射	採用	生食注シリンジ「オーツカ」10mL	10mL1筒	生理食塩液			
注射	採用	生理食塩液	20mL1管	生理食塩液			
注射	採用	生理食塩液	500mL1袋	生理食塩液			
注射	採用	生理食塩液「NP」	5mL1管	生理食塩液			
注射	採用	生理食塩液PL「フソー」	1L1瓶	生理食塩液			
注射	採用	生理食塩液PL「フソー」	2L1袋	生理食塩液			
注射	採用	生理食塩液バッグ「フソー」	1L1袋	生理食塩液			
注射	採用	赤十字アルブミン25%静注12. 5g	25%50mL1瓶	人血清アルブミン		特生	
注射	採用	大塚蒸留水	100mL1瓶	注射用水			
注射	採用	大塚生食注	20mL1管	生理食塩液			
注射	採用	大塚生食注	100mL1瓶	生理食塩液			
注射	採用	大塚生食注	500mL1瓶	生理食塩液			
注射	採用	大塚生食注	1L1瓶	生理食塩液			
注射	採用	大塚生食注	500mL1袋	生理食塩液			
注射	採用	大塚生食注	50mL1瓶	生理食塩液			
注射	採用	大塚生食注	250mL1袋	生理食塩液			
注射	採用	大塚生食注2ポート100mL	100mL1キット	生理食塩液			
注射	採用	大塚生食注2ポート50mL	50mL1キット	生理食塩液			
注射	採用	大塚糖液10%	10%500mL1	精製ブドウ糖			
注射	採用	大塚糖液5%	5%100mL1瓶	精製ブドウ糖			
注射	採用	大塚糖液5%	5%250mL1袋	精製ブドウ糖			
注射	採用	大塚糖液5%	5%50mL1瓶	精製ブドウ糖			
注射	採用	大塚糖液50%	50%200mL1	精製ブドウ糖			
内服	採用	単シロップ	10mL	単シロップ			
注射	採用	炭酸水素Na静注1. 26%バッグ「フ	1. 26%1L1袋	炭酸水素ナトリウム			
内服	採用	炭酸水素ナトリウム「ケンエー」	10g	炭酸水素ナトリウム			
内服	採用	炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTR	500mg1錠	炭酸水素ナトリウム	後発		
注射	採用	注射用GHRP科研100	100μg1瓶	ブラルモレリン塩酸塩			
注射 自注	採用	注射用HCG5000単位「F」	5000単位1管	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン			
注射	限定	注射用イホマイド1g	1g1瓶	イホスファミド		劇	抗悪性腫瘍剤
注射	限定	注射用エラスポール100	100mg1瓶	シベラタットナトリウム水和物			
注射	採用	注射用エンドキサン100mg	100mg1瓶	シクロホスファミド水和物		劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	注射用エンドキサン500mg	500mg1瓶	シクロホスファミド水和物		劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	注射用ペニシリンGカリウム100万単	100万単位1瓶	ベンジルペニシリンカリウム			
注射	限定	注射用メトレキセート50mg	50mg1瓶	メトレキセート		劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	注射用水「フソー」	5mL1管	注射用水			
注射	採用	注射用水PL「フソー」	20mL1管	注射用水			
注射	採用	注射用水PL「フソー」	1L1瓶	注射用水			
注射	採用	注射用水バッグ「フソー」	1L1袋	注射用水			
内服	採用	調剤用パンピタン末	1g	レチノール・カルシフェロール配合剤			
内服	採用	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和	500mg1錠	沈降炭酸カルシウム	後発		
注射	採用	沈降破傷風トキソイド「生研」	0. 5mL1瓶	沈降破傷風トキソイド		劇	

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	表示用 一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
注射	採用	低分子デキストランL注	250mL1袋	乳酸リンゲル液(デキストラン40加)			
注射	採用	動注用アイエーコール100mg	100mg1瓶	シスプラチン		毒	抗悪性腫瘍剤
外用	採用	日点アトロピン点眼液1%	1%5mL1瓶	アトロピン硫酸塩水和物		劇	
内服	採用	乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原	10g	乳酸カルシウム水和物			
外用	採用	尿素クリーム20%「SUN」	20%1g	尿素	後発		
外用	採用	白色ワセリン「ケンエー」	10g	白色ワセリン			
外用	採用	複方ヨード・グリセリン	10mL	複方ヨード・グリセリン			
内服	院外	本草八味丸料エキス顆粒-M	1g	八味丸エキス		劇	
外用	採用	無水エタノール「東海」	10mL	無水エタノール			
注射	採用	無水エタノール注「フソー」	5mL1管	無水エタノール			
内服	採用	薬用炭	1g	薬用炭			
外用	採用	流動パラフィン「ヨシダ」	10mL	流動パラフィン			
注射	採用	硫酸Mg補正液1mEq/mL	0.5モル20mL	硫酸マグネシウム水和物			